Danmarks geologiske Undersøgelse.

II. Række. Nr. 19.

En østjydsk Israndslinje

og dens

Indflydelse paa Vandløbene.

Af

Poul Harder.

With an English Summary of the Contents.

Hertil et Atlas med 21 Tavler og 4 Kort.

Kjøbenhavn.

I Kommission hos C. A. Reitzel.

Fr. Bagges Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

1908.

Pris: 6 Kr.

Fortegnelse over Danmarks geologiske Undersøgelser Skrifter.

I. Række.

Beskrivelser til Geologisk Kort over Danmark i Maalestok 1:100000.

Nr. 1.	K. RØRDAM. Kortbladene Helsingør og Hillerød. 1893.....	Pris. 2,00 Kr.
- 2.	N. V. USSING og VICTOR MADSEN. Kortbladet Hindsholm. 1897	— 2,00 -
- 3.	A. JESSEN. Kortbladene Skagen, Hirshals, Frederikshavn, Hjøring og Løkken. 1899	— 6,00 -
- 4.	A. JESSEN. Kortbladene Læsø og Anholt. 1897.	— 1,50 -
- 5.	VICTOR MADSEN. Kortbladet Samsø. 1897.....	— 1,50 -
- 6.	K. RØRDAM. Kortbladene København og Roskilde. 1899	— 4,00 -
- 7.	VICTOR MADSEN. Kortbladet Bogense. 1900.....	— 2,00 -
- 8.	K. RØRDAM og V. MILTHERS. Kortbladene Sejro, Nykjøbing, Kalundborg og Holbæk. 1900	— 5,00 -
- 9.	VICTOR MADSEN. Kortbladet Nyborg. 1902.....	— 4,50 -
- 10.	A. JESSEN. Kortbladene Aalborg og Nibe (nordlige Del). 1905	— 4,50 -
- 12.	A. JESSEN. Kortbladet Skamlingsbanke. 1907..	— 2,00 -

II. Række.

Afhandlinger om specielle, videnskabelige og praktiske Emner.

Nr. 1.	K. RØRDAM. Undersøgelse af mesozoiske Lerarter og Kaolin paa Bornholm i geologisk og teknisk Henseende. 1890	Pris 1,25 Kr.
--------	--	---------------

Danmarks geologiske Undersøgelse.

II. Række. Nr. 19.

En østjydske Israndslinje

og dens

Indflydelse paa Vandløbene.

Af

Poul Harder.

With an English Summary of the Contents.

Hertil et Atlas med 21 Tavler og 4 Kort.

Kjøbenhavn.

I Kommission hos C. A. Reitzel.

Fr. Bagges Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

1908.

Forord.

Materialet til den foreliggende Afhandling er indvundet ved Undersøgelser i Terrainet i Somrene 1902—1905. I Hovedsagen har Arbejdsgangen været den, at der er begyndt længst imod Nordøst, og derfra er Undersøgelserne efterhaanden udstrakt videre og videre imod Sydvest, dog med stadige Revisionsture tilbage i det tidligere undersøgte Terrain.

Da Profiler, stærkt stenede Overflader o. s. v. i Løbet af kort Tid kan forandres ret betydeligt, skal følgende mere detaljerede Oplysninger om Tidspunktet for Iagttagelserne i de forskellige Egne her anføres. I 1902 var kun den sydlige Del af Grenaa Halvøen Genstand for Undersøgelse, men i 1903 udstraktes denne saa langt imod Sydvest som til Aarhus Dalen, samtidig med at der foretoges supplerende Arbejder i Grenaa Halvøen, saaledes at Undersøgelsen af Strækningen fra Aarhus Dalen til Grenaa bragtes til en foreløbig Afslutning. Foruden forskellige Oversigtsture foretoges i 1904 en Undersøgelse af Terrainet nærmest Vest og Nord for Grenaa, og derefter paabegyndtes Arbejdet i Egnen Nordvest for Horsens. I 1905 underkastedes først Lilleaa Dalen en mere indgaaende Bearbejdelse, men største Delen af Somren anvendtes dog til at gennemføre den det foregaaende Aar paabegyndte Undersøgelse af Horsens Egnen samt Terrainet nærmest Nord herfor.

Den endelige Udarbejdelse af den foreliggende Afhandling paabegyndtes i Efteraaret 1905, men forskellige andre Arbejder bevirkede Afbrydelser, saa at Udgivelsen desværre er bleven betydelig forsinket.

Jeg benytter her Lejligheden til at nævne, at der i September iaar er udkommet et nyt Arbejde af USSING „Om Floddale og Randmoræner i Jylland“ (Vidensk. Selsk. Overs. 1907. Nr. 4, S. 161—213). Det slutter sig nær til den samme Forfatters tidligere Publikationer

IV

og omhandler i Hovedsagen Forholdene i den mellemste og nordlige Del af Jydland. Der er desuden heri ganske kort berørt enkelte af den foreliggende Undersøgelses Resultater. Da mit Arbejde paa det nævnte Tidspunkt var saa godt som afsluttet, har det dog desværre ikke været muligt i det at tage Hensyn til USSING's Afhandling.

Det foreliggende Arbejde paabegyndtes i Anledning af en i December 1901 af Universitetet stillet Prisopgave, og Undersøgelserne var derfor de første to Aar af rent privat Art. Den senere Del af Arbejdet er derimod udført for Danmarks geologiske Undersøgelse. For den smukke Maade, hvorpaa Afhandlingen er bleven udstyret med Illustrationsmateriale, skylder jeg Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse min bedste Tak. Ligeledes maa det være mig tilladt her at takke Hr. Generalmajor LOUIS LE MAIRE for det store Arbejde, han har lagt i Udarbejdelsen af det topografiske Grundlag for de medfølgende Kortblade samt for den varme Interesse, hvormed han stadig har fulgt mit Arbejde.

Kjøbenhavn i Oktober 1907.

Poul Harder.

INDHOLD.

	Side
I. Indledning.....	1
A. Undersøgelsens Opgave.....	1
B. Literaturoversigt.....	4
1. Udenlandske Undersøgelser.....	5
Alperne.....	5
Nordtyskland.....	6
Nordamerika.....	8
2. Danske Undersøgelser.....	9
Ældre Literatur.....	9
Danmarks geologiske Undersøgelse's Kortlægning.....	11
Andre Undersøgelser.....	17
C. Arbejdsmetode.....	19
II. Horsens Fjord Gletscheren.....	25
A. Almindelige Bemærkninger.....	25
1. Højdeforholdene omkring Horsens Fjord.....	26
2. Oversigt over Israndsdannelser.....	28
Moræner.....	29
Smeltevandsdannelser.....	31
B. Morænedannelser.....	33
1. Bjerger Herred Isen.....	33
Israndslinjen fra Engom til Rimmerslund.....	33
Israndslinjen fra Rimmerslund til Nord for Løsning.....	35
2. Bygholm Lavningens Istunge.....	38
Israndslinjen fra Nord for Løsning til Nord for Krollerup..	38
Skjelhøj-Bavnehøj Randmorænevold.....	41
Israndslinjen i Ullum Kær.....	44
Randmorænedannelser langs med Bygholm Lavningens Nord-	45
side.....	45
Terrainforholdenes Indflydelse paa Isens Udbredelse.....	49
3. Hansted Lavningens Istunge.....	59
Randmorænerne SSØ. for Nim.....	51
Israndslinjen ved Nim.....	53
Israndslinjen for Enden af Hansted Lavningen.....	55
Isens Omformning af det oprindelige Terrain.....	61

VI

4. Isen i Egnen Nord for Horsens.....	63
Israndslinjen paa Ejer Bavnehøj Partiets Sydside	64
Israndslinjen paa Elbjerg Højdepartiets Nordside.....	67
Isens Udbredelse over Elbjerg Højdepartiet og derved betingede Dannelser	69
C. Smeltevandsskæbener	72
1. Smeltevandet fra Bjerge Herred Isen.....	73
Engom Dalen.....	73
Løsning Hedesletten	74
2. Forbindelsen imellem Løsning Hedesletten og Gudena Dalen ..	77
Krollerup-Ullum Dalen	77
Ullum Kær	79
3. Gudena Dalen mellem Aale og Vestbirk og dens Tilløb	80
Gudena Dalen mellem Aale og Vestbirk	80
Tilløb fra Isranden.....	83
4. Smeltevandet fra den nordlige Del af Hansted Lavningens Istunge samt Gudena Dalen mellem Vestbirk og Gudensø	86
Smeltevandet fra den nordlige Del af Hansted Lavningens Istunge	86
Gudena Dalen fra Vestbirk til Vest for Mossø	87
Terrassen ved Vestenden af Mossø... ..	91
D. Udviklingen af de nuværende Vandløb i Horsens Egnen.....	92
III. Indlandsisen i Aarhus Egnen	95
A. Almindelige Bemærkninger	95
1. Højdeforholdene i den mellemste Del af Østjylland.....	95
2. Oversigt over Israndsskæbener.....	99
Moræner	100
Smeltevandsskæbener.....	102
B. Morænedannelser	103
1. Isen Sydøst for Skanderborg	103
Sammenstødet mellem Horsens Fjord Gletscheren og Isen nordfor	103
Hylke Randmorænen	104
Randmorænestrøget Nordøst for Skaarup	105
2. Isen Nordøst og Nord for Skanderborg.....	106
Israndslinjen fra Fruering til Mesing.....	106
Israndslinjen fra Mesing til Aarhus Dalen	108
3. Isen Vest for Aarhus	110
Israndslinjen fra Aarhus Dalen til Framlev.....	111
Israndslinjen fra Framlev til Mundelstrup	114
4. Isen Nord for Aarhus	116
Israndslinjen fra Mundelstrup til Søften.....	116
Israndslinjen fra Søften til Hestehave.....	118
C. Smeltevandsskæbener	121
1. Smeltevandet fra Skanderborg Egnen	121
Terrasselandskabet omkring Skanderborg Sø	121
Forbindelsen med Gudena Dalen	123
2. Aarhus Dalen.....	125
3. Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg.....	127
Smeltevandssøen	127
Søens Tilløb	131
Søens Afløb	132

VII

4. Den nedre Gudena Dal	134
Gudena Dalen mellem Gudensø og Silkeborg.....	134
Gudena Dalen nedenfor Silkeborg.....	136
5. Lilleaa Dalen	138
Lilleaa Dalen mellem Søften og Lerbjerg.....	139
Smeltevandssøen ved Lerbjerg.....	146
Lilleaa Dalens nederste Del	148
6. Sammenfattende Bemærkninger om den senglaciale Gudena og dens Tilløb	150
Smeltevandsaflejringernes Højdeforhold	150
Vandstandens Højde i den tilstødende Del af Havet.....	154
D. Udviklingen af de nuværende Vandløb.....	154
IV. Indlandsisen i Grenaa Halvøen.....	159
A. Almindelige Bemærkninger	159
1. Højdeforholdene i Grenaa Halvøen.....	159
2. Oversigt over Israndsdannelser	162
Moræner	163
Smeltevandsdannelser.....	165
B. Morænedannelser	166
1. Kalvø Vigs Istunge.....	166
Morænelandskabet.....	167
Vosnæs Gaard - Kalvø Buens Randmoræner.....	169
Egens Buens Randmoræner	172
Agri Buens Randmoræner.....	172
2. Æbeltoft Vigs Istunge.....	173
Sammenstødet imellem Morænebuerne i Mols.....	174
Dannelsen af de kedelformede Huller i Randmorænelandskabet	176
Æbeltoft Vig Buens nordlige og østlige Del.....	179
3. Kattegats Isen	180
Gratbjerg Randmorænerne	180
De sydøstligste Randmoræner	181
4. Den yderste Israndslinje	182
Hedeslettens Sydgrænse Nord for Æbeltoft Vig.....	182
Fortsættelse af Hedeslettens Sydgrænse imod Vest.....	184
Fortsættelse af Hedeslettens Sydgrænse imod Øst.....	185
Sandsynlig Israndslinje langs med Grenaa Halvøens Østkyst	186
C. Smeltevandsdannelser	187
1. Smeltevandsgruset i Hoed Egnen	188
Grusets Beskaffenhed og Udbredelse	188
Grusets Lejringsforhold	190
2. Første Terrasse	191
Udbredelse	191
Højdeforhold og Overfladeform	193
Den yderste Israndslinjes Fortsættelse nordpaa.....	194
3. Anden Terrasse	197
Gennembruddet af Hoed-Hallendrup Dalen	197
Smeltevandet fra den sydlige Isrand	198
Smeltevandet fra Gletscherporten	200
Hoed-Hallendrup Dalen.....	202
4. Nordligere Smeltevandsdannelser	204
Smeltevandsgruset ved Kirial.....	204
Israndens Stilling	207

VIII

5. Fortsættelse af Første Terrasse imod Nordvest	209
Udbredelse	210
Overfladeform	211
Højdeforhold	212
Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen	213
6. Yngre Smeltevandsdannelser i Egnen Syd for Ryom Gaard ...	214
Hovedtrækkene i Udviklingen	214
Afløb imod Nordvest	216
Afløb igennem Kolindsund	217
Jordfaldshuller	218
Smeltevandsaflejringer bagved den yderste Israndslinje	218
7. Smeltevandssøen i Rosenholm Lavningen	219
D. Udviklingen af Grenaa Halvøens nuværende Vandløb	221
V. Slutning	223

Trykfejl og Rettelser	228
-----------------------------	-----

Summary of the Contents.

I. Introduction	230
A. The purpose of the investigations	230
B. Summary of the literature	232
C. Method of the investigations	234
II. The Horsens Fjord Glacier	236
A. General remarks	236
B. Moraine formations	237
C. Glacier-river formations	239
D. The development of the present water-courses in the Horsens district	241
III. The inland-ice in the Aarhus district	242
A. General remarks	242
B. Moraine formations	244
C. Glacier-river formations	247
D. The development of the present water-courses	249
IV. The inland-ice in the Grenaa Peninsula	251
A. General remarks	251
B. Moraine formations	252
C. Glacier-river formations	255
D. The development of the present water-courses in the Grenaa Peninsula	256
V. Conclusion	257

Explanation of the Plates	261
---------------------------------	-----

I. Indledning.

A. Undersøgelsens Opgave.

Der gives lige saa mange Maader at se paa, som der gives iagttagende Mennesker, og dette gælder ikke mindst, naar det drejer sig om Betragtningen af Landskaber. For nogle spiller Farverne, eller maaske Afvekslingen mellem Lys og Skygge, den væsentligste Rolle, medens det for andre er Formen og Linjerne i Landskabet, der er det afgørende. Paa nogle Mennesker virker det storslaaede i et Bjerglandskab med en forunderlig Magt, men andre føler sig mere tiltrukne af et aabent og smilende Landskabs Idyl. Endelig gives der dem, for hvem Betingelsen for den fulde Nydelse af et Landskab er Forstaaelsen af, hvorledes det er blevet til, hvilke Kræfter, der har virket, og hvorledes de har arbejdet og udformet den nuværende Jordoverflade, saa Resultatet er blevet det, man nu ser for sig. Det er derfor ikke underligt, at Læren herom, den dynamiske Geologi, i lange Tider har interesseret mange, ogsaa udenfor de egentlige Faggeologers snævre Kreds.

Det er naturligt, at Interessen for geologiske Spørgsmaal først maatte udvikle sig i Bjerglande, hvor Jordskorpens forskellige Lag er lette at iagttage, og hvor de mange Faktorer, som er medvirkende ved Jordoverfladens stadige Omformning, er meget mere iøjnefaldende end i et Sletteland som Danmark. Geologien var derfor i lang Tid en Videnskab, som kun fandt faa Dyrkere her hjemme, og hvad specielt Studiet af de nuværende Overfladeformer angaar, da blev det først muligt igennem Istidsteorien at naa frem til virkelig Forstaaelse af de Ting, som i landskabelig Henseende spiller den største Rolle i vort Land.

Efterhaanden er Kendskabet til Nutidens Gletschere bleven udvidet, og ved sammenlignende Undersøgelser i de Lande, der tidligere har været isdækkede, er man naaet frem til større Klarhed over Isens Natur og dens Evne til at omforme det Land, den tog i sin Besiddelse; man har derved faaet Midler til Forstaaelsen af mange Forhold, som tidligere maatte staa som uløste Gaader eller give Anledning til fantastiske Forklaringer. Ogsaa her hjemme sporer man denne Fremgang, og der er i de senere Aar fremkommet Bidrag til Forstaaelsen af Overfladeformen i flere af Landets Egne. Men der er endnu en lang Vej frem, og der kræves adskillige Detailundersøgelser, inden man paa alle Punkter kan følge den geografiske Udvikling af Landet.

Den foreliggende Afhandling er et Forsøg paa indenfor en begrænset Egn at fastslaa nogle Enkeltheder i denne Udvikling. Det er navnlig Vandløbsforholdene, der skal tages op til Behandling, og Hovedvægten skal lægges paa en Undersøgelse af de Ting, som har betinget det ofte ejendommelige Forløb af de nuværende Vandløb. Der bliver dog herved Lejlighed til desuden at komme ind paa en Række Forhold, som ikke direkte berører Fordelingen af Vandløbene, men det er mit Haab, at Undersøgelsen herved vil kunne bidrage til Forstaaelsen af en Del Terrainformer, som giver den betragtede Egn dens Præg, medens det paa den anden Side ikke kan ventes, at Løsningen af denne specielle Opgave vil kaste Lys over alle de Spørgsmaal, der angaar Udviklingen af det undersøgte Terrain. Men kan det blot lykkes at klarlægge et enkelt Afsnit af dettes Udviklingshistorie, da er allerede meget naaet, og kan der herved bidrages til at vække Interessen for Studiet af Landets Overfladeformer og anspore til yderligere Arbejder i den Retning, da har denne Undersøgelse ikke været forgæves.

Paa en ejendommelig og meget iøjnefaldende Maade løber Gudenaa fra Egnen Nord for Vejle i nordlig Retning parallelt med Kysten; først noget Sydøst for Viborg bøjer den imod Øst for igennem Randers Fjord at naa ud til den nordlige Del af Kattegat. Dens store og bugtede Dal gennemskærer saaledes hele det østjydske Højland, og den danner med sine forskellige, større og mindre Forgreninger et meget væsentligt Led af Terrainet.

Ved sit Løb fra Syd til Nord afvander Gudenaa et Omraade, der er langstrakt i samme Retning, og som ligger noget indenfor Jydlands Østkyst. Landet nærmest langs med denne huser derimod ingen større Vandløb, men Afvandingen sker igennem en Række smaa Aar, der er nogenlunde jævnt fordelte paa hele Strækningen.

Der strækker sig altsaa igennem det østlige Jydland et vigtigt Vand-skel, som danner Grænsen imellem Gudenaas Vandomraade og det østligere Terrain, der afvandes direkte til Kattegat, paa lignende Maade som Jydlands Hovedvandskel, Skellet imellem Tilløb til Vesterhavet og til Kattegat, danner den vestlige Begrænsning for Gudenaas Omraade. Det førstnævnte af disse Vandskel viser den samme Ejendommelighed som Gudenaas selv, nemlig at det løber nogenlunde parallelt med Kysten og kun i ringe Afstand fra den. Som det fremgaar af Højdekortet Tavle I, Fig. 1, hvorpaa dette Vandskel er angivet som en mørk Linje, overskrærer det flere store Dalstrøg, der strækker sig fra de mere centrale Dele af Landet ud til Kysten, og som man skulde synes maatte være de naturligste Veje for Vandløbene.

Noget af det samme, som er Tilfældet i Østjylland, gentager sig, om end i mindre Maalestok, i den sydlige Del af Grenaa Halvøen. Det er saaledes iøjnefaldende, at f. Eks. Terrainen Nord for Kalvø Vig med Undtagelse af den nærmeste Strækning langs med Kysten afvandes dels til Randers Fjord og dels igennem Kolindsund til Kattegat ved Grenaa, medens ingen nævneværdige Vandløb søger til Sydkysten.

Saa vel de skildrede, ejendommelige Vandløbsforhold som den betydelige Størrelse af Gudenaas Dalen og lignende Dannelser i Grenaa Halvøen viser hen til, at der her har været andre og større Kræfter i Virksomhed end i Nutiden. Man maa søge tilbage til Slutningen af Istiden, da Indlandsisen endnu dækkede den sydøstlige Del af Jydland, og store Smeltevandfloder fra dens Rand banede sig Vej ud imod Havet og nedskar sig Dale til en saadan Dybde, at Vandløbene siden er vedblevet at følge dem. Paa Kortet Fig. 2 paa Tavle I er der med en sort Linje angivet Grænsen for Isens Udbredelse paa et vist, sent Tidspunkt af Istiden, og der er tillige med blaat skitseret de væsentligste af de dermed samtidige Smeltevandfloder. En Sammenligning med det foregaaende Kort vil vise, at der ikke blot er den største Overensstemmelse mellem de nuværende Vandløb og de gamle Gletscherfloder, men at tillige Israndslinjen¹⁾ og det ovenfor nævnte Vandskel er meget nær sammenfaldende. Det fremgaar heraf med stor Tydelighed, at Forholdene, som de nu er, ikke blot i de store Træk men ogsaa i mange Enkeltheder er betingede af Udviklingen i hin fjerne Tid, og man kan derfor vente igennem Studiet af de Israndsaflejringer og Smeltevandsdannelser, som knytter sig til

¹⁾ For Grenaa Halvøens Vedkommende er der angivet den Stilling, Isranden har haft i det sidste Afsnit af de derværende Smeltevandsdannelsers Udviklingsperiode (sammenlign Tavle V), fordi det maatte blive denne, som i væsentligst Grad fik Indflydelse paa Fordelingen af de nuværende Vandløb.

den angivne Stilling af Isranden, at kunne begrunde Fordelingen af de nuværende Vandløb.

Det er denne specielle Opgave, som det skal blive forsøgt at løse i det følgende. Arbejdet skal derfor gaa ud paa i Enkelthederne at følge de Spor, som Isranden har efterladt sig, og herigennem at bestemme dens Beliggenhed, og dertil skal slutte sig en Undersøgelse af de Dannelser, som skyldes de fra Isen kommende Smeltevandsfloder. Desuden kan der blive Anledning til en Betragtning af enkelte Forandringer i Vandløbsforholdene paa Grund af Erosion i den postglaciale Tid.

B. Literaturoversigt.

Undersøgelser af den i det foregaaende antydede Art maa naturligvis i høj Grad støtte sig til Literaturangivelser. Grundlaget maa først og fremmest være Kendskabet til Nutidsgletschernes Virke-maade¹⁾; men mere end et Udgangspunkt kan dette Kendskab paa den anden Side heller ikke være, thi det mægtige Isdække, som i Istiden udbredte sig over det nordevropæiske Lavland, kom til at virke under Forhold, der var vidt forskellige fra alt, hvad man kender fra Nutidens Gletschere, og man finder i Lavlandets Moræne-dannelser en Variation i de store Træk og en Nuancering i Enkelthederne, som er ganske ukendt fra Nutidsdannelser. Ogsaa for Smeltevandsaflejringernes Vedkommende føler man Savnet af Sammenligningsmateriale; thi kun faa Steder finder man i Nutiden Gletschere, der naar ned paa Lavland, saa at Smeltevandsfloderne kommer til at virke under Forhold, som minder om Istidens, og Kendskabet hertil er endnu kun mangelfuldt.

Vejen fremad til Forstaaelse af alle de Fænomener, der knytter sig til Isens tidligere Udbredelse over Nordevropa, er saaledes baade lang og besværlig, og der er endnu mange Punkter, hvor man foreløbig staar uforstaaende. Efterhaanden er det dog ved fortsatte, sammenlignende Undersøgelser i de tidligere isdækkede Lande lykkedes at skaffe nogenlunde Klarhed over visse Landskabsformer, hvis Oprindelse staar i Forbindelse med Indlandsisens Rand, og da det netop er disse Ting, som i denne Sammenhæng interesserer mest,

¹⁾ Der kan her henvises til følgende Haandbøger:

HEIM, ALBERT. 1885. Handbuch der Gletscherkunde.

RUSSELL, ISRAEL C. 1901. Glaciers of North America.

HESS, HANS. 1904. Die Gletscher.

kunde en kort Oversigt over, hvad man hidtil har naaet paa dette Omraade, maaske her være paa sin Plads.

I det nærmest følgende skal der først fremdrages nogle enkelte Punkter, som angaar Udviklingen af Kendskabet til Istidsdannelserne i de Lande, hvorfra dette Kendskab i Hovedsagen har bredt sig, og der skal dernæst blive gjort Rede for de Resultater, som man hidtil har naaet ved Undersøgelser af danske Terrainformer.

1. Udenlandske Undersøgelser.

Alperne. Som bekendt stammer Teorien om Istiden fra Alperne; her var Sammenligningen mellem Nutidens Gletscheraflejringer og de gamle Morænedannelser nærliggende, og allerede i den første Halvdel af forrige Aarhundrede kastede man sig med Iver over Studiet af de Fænomener, som knytter sig til Gletschernes tidligere større Udbredelse, medens de samme Ideer først langt senere trængte igennem i Nordevropa. Det fører dog for vidt her at komme ind paa Istidsteoriens Historie¹⁾; der skal kun nævnes nogle enkelte Punkter vedrørende Udviklingen i Alperne.

Det er naturligt, at man, saa længe Opgaven var at bevise Isens tidligere større Udbredelse, navnlig studerede de Ting, som paa iøjnefaldende Maade støttede Antagelsen deraf, og det var navnlig gamle Morænedannelser, løse Blokke, Skurestriber og lignende Fænomener, som fangede Interessen. Efterhaanden som Kendskabet hertil blev større, traadte nye Opgaver i Forgrunden som f. Eks. Istidsdannelsernes Udbredelse og indbyrdes Aldersforhold samt Isens Omformning af Overfladen saavel ved Erosion i Alperne som ved Aflejring af Materiale ude i Alpeforlandet. Enkelthederne i disse Studier har dog ikke saa stor Betydning for Sammenligningen med de nordevropæiske Dannelser, da disse i meget adskiller sig fra Alpeforlandets Istidsaflejringer, en Ting, som staar i Forbindelse med den væsentlig forskellige Karakter af Isdækket de to Steder.

Der er dog et enkelt Forhold, som fortjener at fremdrages, fordi det maaske kan give et Vink om, paa hvilke Punkter man særligt bør have sin Opmærksomhed rettet ved Undersøgelser her i Danmark. Det er det store Fremskridt, som betegnes ved, at man for Alpeforlandets Vedkommende lagde Hovedvægten over paa Studiet af Smeltevandsaflejringerne foran Isranden. Dette skete allerede i Midten

¹⁾ Der kan angaaende denne henvises til:

PENCK, ALBRECHT. 1882. Die Vergletscherung der Deutschen Alpen. Kapitel I.

af Firserne gennem Undersøgelser af PENCK og andre¹⁾, og af gennemgribende Betydning blev DU PASQUIER's Arbejde over de fluvio-glaciale Aflejringer i Nordschweiz²⁾. I den Tid, som er forløbet siden da, har man arbejdet videre i samme Spor, og hvor store Resultater, man er naaet til, turde bedst fremgaa af PENCK og BRÜCKNER's ovenfor citerede, monumentale Værk: Die Alpen im Eiszeitalter.

Nordtyskland. Et andet af de Centre, hvorfra Læren om Istiden har bredt sig, er den skandinaviske Halvø. Ogsaa dér er dog Istidsdannelserne saa forskellige fra, hvad der kendes her i Danmark, at en Sammenligning er lidet lønnende, selv om en Paavirkning, navnlig fra Sverige, naturligvis paa mange Punkter kan spores i de danske, kvartærgeologiske Arbejder. Størst Betydning for os har det faaet, at Istidsteorien paa Grundlag af svenske Undersøgelser vandt Terrain i Nordtyskland, idet TORELL i 1875 dér gjorde sig til Talsmand for den³⁾. Dette gav Stødet til en lang Række Undersøgelser, som for os har den største Betydning, da Forholdene i Danmark viser en iøjnefaldende Lighed med det nordtyske Lavland, saa at man her hjemme kan drage Fordel af de Erfaringer, der er gjorte ved Undersøgelserne i Nordtyskland.

Hvad specielt angaar de Landskabsformer, som maa tænkes dannede ved Randen af Indlandsisen, da har man for Nordtysklands Vedkommende en rig Literatur, der i Hovedsagen handler om Randmorænedannelser. I en Række Arbejder⁴⁾ har nordtyske Geologer behandlet dette Æmne, og man har nu et fyldigt Kendskab til de mange forskelligartede Moræneaflejringer, som er karakteristiske for Israndszonen.

Til at begynde med var det kun voldformede Sammenhobninger af Morænegrus eller Strøg med usædvanlig Rigdom paa store Sten,

¹⁾ Se herom i PENCK, ALBRECHT und BRÜCKNER EDUARD. 1901—1907 (ikke afsluttet). Die Alpen im Eiszeitalter. S. 4—5.

²⁾ PASQUIER, LÉON DU. 1891. Ueber die fluvioglacialen Ablagerungen der Nordschweiz. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lief. XXXI.

³⁾ Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. XXVII, S. 961.

⁴⁾ Udførlige Literaturfortegnelser findes i følgende Bøger:

GOTTSCHÉ, C. 1897. Die Endmoränen und das marine Diluvium Schleswig-Holstein's. Theil I. Die Endmoränen. Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg. Bd. XIII. Særtryk S. 2—3.

BERENDT, G., KEILHACK, K., SCHRÖDER, H. und WAHNSCHAFTE, F. 1899. Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Glacialgeologie in Norddeutschland erläutert an einigen Beispielen. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1897. S. 111—112.

WAHNSCHAFTE, FELIX. 1901. Die Ursachen der Oberflächengestaltung des Norddeutschen Flachlandes. 2. Aufl. S. 136 o. f.

som fangede Opmærksomheden, og dette er i Virkeligheden meget naturligt, da disse Dannelser spiller en meget væsentlig Rolle blandt Israndsaflejringer i Lavlandene. Men snart lærte man ogsaa i andre Terrainformer at se Randmorænedannelser¹⁾, og Udviklingen er gaaet videre i denne Retning, saa at man nu lægger Hovedvægten paa Overfladeformen og endog ofte taler om et Randmorænelandskab. Dette maa dog ikke forveksles med en anden Landskabstype, det som Regel mere udstrakte Morænelandskab, og der kan maaske være Grund til at fremhæve, at de tyske Geologer skelner skarpt imellem Randmoræne og Morænelandskab („Endmoräne“ og „Grundmoränen-landschaft“), da en saadan Adskillelse sikkert ogsaa vil kunne gennemføres paa mange Steder i Danmark. Angaaende denne Opfattelse af Isens Randaflejringer kan henvises til en skarp Definition af de nævnte Terrainformer og en klar Begrundelse af deres Adskillelse, som lejlighedsvis er fremsat af GAGEL i et for nylig udkommet Arbejde²⁾.

Medens Israndens Moræneaflejringer i Nordtyskland saaledes maa siges for mange Egenes Vedkommende at være forholdsvis godt kendte, er dette derimod ikke i nær saa høj Grad Tilfældet med de Dannelser, som skyldes de fra Isranden kommende, store Smeltevandsfloder. Thi skønt man allerede fra gammel Tid kendte de mægtige Dale, som med øst-vestlig Retning gennemskærer det nordtyske Lavland³⁾, og skønt BERENDT allerede i 1879 udtalte, at disse var dannede af Smeltevandet foran Randen af den tilbagevigende Indlandsis og i den Orden, hvori de forekommer fra Syd til Nord⁴⁾, varede det dog længe, inden man tog Smeltevandsdannelserne op til mere indgaaende Behandling, og det er egentlig kun KEILHACK's Arbejder over dette Æmne, som har nogen Betydning. I en Del mindre Afhandlinger⁵⁾ og i et enkelt større og meget interessant Arbejde⁶⁾ har denne

¹⁾ Se f. Eks. SCHRÖDER, HENRY. 1889. Ueber Durchragungs-Züge und -Zonen in der Uckermark und in Ostpreussen. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1888. S. 166—211.

²⁾ GAGEL, C. 1905. Geologische Notizen von der Insel Fehmarn und aus Wagrien. Jahrbuch d. königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1905. Bd. XXVI, H. 2, S. 263—269.

³⁾ GIRARD, H. 1855. Die norddeutsche Ebene insbesondere zwischen Elbe und Weichsel geologisch dargestellt. S. 7—15.

⁴⁾ BERENDT, G. 1879. Gletschertheorie oder Drifttheorie in Norddeutschland? Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. XXXI. S. 17—18.

⁵⁾ En udførlig Literaturfortegnelse findes i:

WAHNSCHAFTE, FELIX. 1901. Die Ursachen der Oberflächengestaltung des Norddeutschen Flachlandes. 2. Aufl. S. 176.

⁶⁾ KEILHACK, K. 1899. Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises und die hydrographische Entwicklung des pommerschen Küstengebietes. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1898. S. 90—152.

Forfatter paavist den nære Forbindelse, der er imellem de forskellige Randmorænestrøg og de udenfor liggende Smeltevandsdannelser. Specielt for Pommerns Vedkommende er der givet en udførlig Skildring af de forskellige Smeltevandsdannelser, og der findes heri adskillige Iagttagelser og nye Betragtningssmaader, som i høj Grad kan komme til Nytte ved Vurderingen af lignende Forhold i Danmark.

KEILHACK's Undersøgelser maa dog for en stor Del opfattes som Oversigtsarbejder, saa at man ikke kan vente, at fremtidige Detailundersøgelser paa alle Punkter vil bekræfte hans Anskuelser, og Kritiken er heller ikke udebleven¹⁾; men paa den anden Side er hele den Maade, hvorpaa Spørgsmaalet om Israndsdannelserne er behandlet, og navnlig Betragtningen af Randmoræner og Smeltevandsdannelser under ét, af saa stor Betydning, at KEILHACK's Arbejder maa betegnes som et meget væsentlig Fremskridt.

Nordamerika. Der findes endnu et stort Omraade, hvor Istidsaflejringer danner Overfladen i et udstrakt Lavland, nemlig i Nordamerika. Allerede nu findes der en meget betydelig Literatur om de nordamerikanske Forhold, og i Virkeligheden er man dér paa mange Omraader naaet langt frem i Studiet af Istidsdannelserne, ja paa adskillige Punkter sporer man endog i den europæiske Literatur en Paavirkning fra Amerika.

Naar Kvartærgeologien i Nordamerika har gjort saa betydelige Fremskridt, staar dette i Forbindelse med det mægtige Opsving, som hele den dynamiske Geologi har faaet gennem de amerikanske Geologers Arbejde. Paa en ofte selvstændig Maade og med en klar Opfattelse af, hvad der er det væsentlige, betragtes de forskellige Fænomener, og de forklares ud fra almindelige fysiske Principper under Sammenligning med, hvad man kan se foregaa i Nutiden. Specielt for Istidsdannelsernes Vedkommende har saaledes Gletscherundersøgelser i arktiske Egne — Alaska og Nordgrønland — faaet en væsentlig Betydning, og det kan fremhæves, at Amerikanerne paa Grundlag heraf har været i Stand til at tyde mange Enkeltheder i de tidligere isdækkede Egenes Overfladeforhold.

Hvad angaar de Dannelser, som maa tænkes opstaaede ved Randen af den nordamerikanske Indlandsis, da findes der en Række til-

¹⁾ MAAS, G. 1901. Ueber Endmoränen in Westpreussen und angrenzenden Gebieten. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1900. S. 103 og 143—147.

MAAS, G. 1904. Zur Entwicklungsgeschichte des sog. Thorn-Eberswalder Haupttales Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 56. Bd. Briefliche Mitteilungen, S. 40—49.

dels meget udførlige Arbejder over dette Æmne; det fører dog for vidt her at komme ind paa de talrige Specialafhandlinger, og der skal kun henvises til den Oversigt, som er givet af CHAMBERLIN og SALISBURY i den for nylig udkomne Haandbog i Geologi¹⁾, hvori ogsaa den væsentligste Literatur findes angivet.

2. Danske Undersøgelser.

Ældre Literatur. Kendskabet til Israndsdannelserne i Danmark har udviklet sig paa lignende Maade som i Nordtyskland. Ogsaa herhjemme kendte man, inden Istidsteorien var indført, nogle af de Dannelser, som paa iøjnefaldende Maade vidner om Istidens mægtige Smeltevandfloder, idet DALGAS træffende havde karakteriseret de midtjydske Hedesletter og endog fremstillet dem kartografisk paa Grundlag af egne Iagttagelser²⁾. Senere har ERSLEV, som dog kunde støtte sig til Generalstabens Opmaaling, henledet Opmærksomheden paa de betydelige Dalstrøg, der navnlig findes i den nordøstlige Del af Jydland³⁾. De nævnte Dannelsers sande Natur er dog først senere bleven erkendt, og det er egentlig kun i den allersidste Tid, at man har taget Spørgsmaalet om Smeltevandflodernes Virksomhed op til indgaaende Behandling (se herom S. 18).

JOHNSTRUP er den første, som paa Grundlag af de forskellige Moræneaflejrings Udbredelse i Jydland mente at kunne angive en Grænse for Indlandsisens Udbredelse paa et vist Tidspunkt. Han saa i det østjydske (og nordvestjydske) Moræneler („Rullestensler“) en sammenhængende Bundmoræne, afsat inde under Isen, og opfattede „det bakkede Rullestenssands Bælte“ som en Israndsaflejring („uhyre stor uregelmæssig Endemoræne“) langs med Morænelerets Yderrand og dannet under Medvirkning af Smeltevandet. Som Resultat af en yderligere Slæmning betragtede han „Hedesandet“, der danner Overfladen paa „Hedesletterne“⁴⁾.

¹⁾ CHAMBERLIN, THOMAS C. and SALISBURY, ROLLIN D. 1906. Geology. Vol. III. S. 358—382.

²⁾ DALGAS, E. 1866. En Oversigt over Hederne i Jylland.

DALGAS, E. 1867—1868. Geographiske Billeder fra Heden. I—II.

³⁾ ERSLEV, ED. 1886. Jylland. S. 27 o. f.

⁴⁾ JOHNSTRUP. 1875. De geognostiske Forhold i Jylland. Tidsskrift for Landøkonomi. 4. Række. 9. Bd. S. 479—485.

JOHNSTRUP. 1877. Jyllands geognostiske Forhold. Beretning om den 13. danske Landmandsforsamling i Viborg 1875, S. 167—169.

De fremsatte Anskuelser er i noget forkortet Form og ubetydeligt ændrede gentagne i:

JOHNSTRUP, FR. 1885. Oversigt over Danmarks geognostiske Beskaffenhed. FALBE-

Paa Grund af disse Anskuelser er JOHNSTRUP's Arbejde ofte bleven nævnt i den senere Literatur og fremhævet som den første Angivelse af en Randmoræne i det nordevropæiske Lavland. Dette er dog kun for saa vidt berettiget, som JOHNSTRUP's Antagelse i de store Træk falder sammen med den nuværende Opfattelse. Thi rent bortset fra, at det er tvivlsomt, om et kuperet Bælte af „Rullestenssand“ lader sig følge igennem Jydland, er det nuværende Begreb „Randmoræne“ meget skarpere afgrænset end hos JOHNSTRUP, og det lader sig ikke anvende paa det bakkede Midtjylland som Helhed. Dertil kommer, at hele den Maade, hvorpaa JOHNSTRUP betragtede de nævnte Dannelser, i meget adskiller sig fra Nutidens. Vel opfattede han Moræneleret som en Bundmoræne, men om de Dannelser, som han tænkte sig afsatte udenfor selve Indlandsisen, turde han f. Eks. ikke afgøre, om de var „afsatte over eller under Havets Niveau“¹⁾, og flere Udtalelser tyder paa, at han nærmest hældede til den sidstnævnte Anskuelse.

Noget helt andet er det, at JOHNSTRUP's Teori i det store og hele maa anses for at være rigtig, idet man maa gaa ud fra, at Isranden paa et vist Tidspunkt har opholdt sig i længere Tid i Midtjylland, og det fortjener at fremhæves, at JOHNSTRUP angiver, at Grænsen for Isens Udbredelse løber ud til Vesterhavet. Dette sidste Forhold, som ved senere Undersøgelser er bleven fuldt ud bekræftet, har USSING i sin Afhandling om de jyske Hedesletter omtalt udførligt²⁾, og jeg skal derfor ikke her komme nærmere ind derpaa men nøjes med at henvise til USSING's Arbejde.

Desværre fortsatte JOHNSTRUP ikke disse Undersøgelser, og i en længere Aarrække fremkom der intet nyt paa dette Omraade — i alle Tilfælde ikke fra Geologernes Side. Saa meget mærkeligere er det i en populær Bog fra 1879 af Lærer A. JACOBSEN³⁾ at træffe en klar og tydelig Angivelse af en Randmoræne paa Sjælland. Han skriver saaledes: „Isen har ogsaa afsat Moræner her i Landet; en saadan findes f. Ex. ved Landevejen mellem Skelskør og Sorø. Den begynder som en langstrakt Bakkerække syd for Tystrup Sø og fortsættes uden om Enden af Søen. Ved den dybe Gennemskæring til Landevejen har man god Lejlighed til at iagttage, hvorledes mindre, afrundede Stene saa at sige udgjøre Hovedbestanddelen af

HANSEN, V. og SCHARLING, WILL. Danmarks Statistik. Første Bind. (Særtryk heraf udkom dog allerede i 1882 under Titlen: »Oversigt over de geognostiske Forhold i Danmark.«)

¹⁾ Anf. Steder henholdsvis S. 484, 169 og 68.

²⁾ USSING. N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2. S. 107—113.

³⁾ JACOBSEN, A. 1879. Naturens Bog.

Underlaget, og skjønt der hvert Aar samles store Masser fra Overfladen, er denne dog saa belagt med Smaastene, at man maa undres over, hvorledes Sæden kan voxe der. — Den langstrakte Tystrup-Bavelse Sø selv, omgiven af de høje Bakker, er maaske ogsaa et Vidnesbyrd om Isen, som nok har pløjet denne Fordybning i Jorden¹⁾.

Danmarks geologiske Undersøgelse's Kortlægning. I Aaret 1888 paaibegyndtes den systematiske geologiske Undersøgelse af Danmark. Da Udførelsen af dette store Arbejde krævede en større Stab af Geologer, end der hidtil havde været Brug for, og da Arbejdet tillige gav disse rig Lejlighed til Studier i Marken, var det at vente, at der nu maatte oprinde lysere Dage for Kvartærgeologien her hjemme. Naar Resultaterne i Retning af Israndsstudier og Undersøgelser over Smeltevandsafløb alligevel kun har været forholdsvis smaa, maa Grunden for en Del søges i den Omstændighed, at Arbejdet paaibegyndtes paa Øerne og i Vendsyssel, hvor Forholdene synes at være mindre gunstige for saadanne Undersøgelser, idet Smeltevandsdannelser kun forekommer sparsomt, og Vanskelighederne ved paa Grundlag af Morænedannelser at bestemme Israndens Stilling under Afsmeltningen synes at være store. Dog finder man ved Gennemlæsning af de i Aarenes Løb offentliggjorte Arbejder hist og her Udtalelser, der angaar de her omhandlede Forhold, men disse Udtalelser er dog ofte saa forsigtige og holdt i en saa ubestemt Form, at det er vanskeligt at danne sig en Mening om, hvorledes vedkommende Forfatter har tænkt sig Forholdene i den senglaciale Tid. Endvidere har man for de undersøgte Egenes Vedkommende de detaillerede geologiske Kort, der i Forbindelse med Terrainkort danner et fortrinligt Grundlag for videregaende Undersøgelser af Forhold som de her betragtede.

Den geologiske Kortlægning af Landet paaibegyndtes paa Sjælland. I den første Kortbladsbeskrivelse²⁾, der udkom, findes kun lidet, som har Interesse i denne Sammenhæng. Det kan nævnes, at RØRDAM her beskriver et „Erosionsbelte“ i Egnen mellem Frederiksværk og Helsingør; han fremhæver i dette navnlig Egnen omkring Frederiksborg, Bakkedraget langs med Roskilde Fjord forbi Frederiksværk samt Terrainet omkring Gurre Sø, og han udtaler, at Isranden maa „en lang Tid have været omtrent stationær paa disse Steder“, en Antagelse, som han væsentlig støtter paa den kuperede Overflade-

¹⁾ Anf. St. S. 155.

²⁾ RØRDAM, K. 1893. De geologiske Forhold i det nordøstlige Sjælland. Beskrivelse til Kaartbladene »Helsingør« og »Hillerød«. D. G. U. I R. Nr. 1.

form („Morænelandskabet“). Han mener, — øjensynlig paavirket af nordtyske Geologer¹⁾ — at denne Landskabsform er opstaaet ved „en storartet Erosion“ af Smeltevandets under Isens Afsmeltning²⁾. Endvidere omtales fra den sydlige Del af Kortbladsomraadet nogle „gamle Erosionsdale“, hvis Dannelse ogsaa sættes i Forbindelse med Smeltevandets, uden at det dog forsøges at udrede de nærmere Omstændigheder herved³⁾. I Tilslutning hertil kan nævnes Angivelsen af senglaciale „Gruslag, som forekommer i Bunden og langs Siderne af de større Aadale“⁴⁾.

Til RØRDAM's Udtalelser om Forholdene i det nordøstlige Sjælland kan føjes nogle af MILTHERS lejlighedsvis fremsatte Bemærkninger i en Afhandling om det senglaciale Ler i Allerød Teglværksgrav. MILTHERS udtaler sig heri noget bestemt mere end RØRDAM og tyder det Bakkedrag, som strækker sig fra Kagerup Station forbi Hilderød til 3—4 Km. SSØ. for denne By, som en Israndsdannelse⁵⁾.

De næste sjælandske Kortblade, der udkom, var Kjøbenhavn og Roskilde. I Beskrivelsen hertil findes intet om de Fænomener, der her beskæftiger os; kun gentages Angivelsen af „Aagrus“ langs alle større og de fleste mindre Vandløb⁶⁾.

I Beskrivelsen til de sidst udkomne sjælandske Kortblade derimod giver MILTHERS en smuk og udførlig Beskrivelse af nogle Israndsfænomener i det nordvestlige Sjælland⁷⁾. Han skildrer, hvorledes Isefjordsbækkenets vestlige Rand omgives af Højdedrag og Partier af typisk Morænelandskab, der slutter sig i store Buer til Indbugtningerne i Fjordbassinet. Paa Yderranden af det højtliggende Morænelandskab findes Rækker af Randmorænebakker, der med nogle Afbrydelser kan følges fra Egnen Vest for Nykjøbing til Bjergsted Bakker Vest for Skarridsø, og som han skildrer udførligt. Udenfor Randmorænerne angiver han, at der oftest findes „mere eller mindre udprægede Flader med Sand og Grus“. Afløbsforholdene har været ganske simple, idet Terrainet falder udad. Desværre ligger største Parten af det udenfor liggende Terrain nu under Havet, saa det har ikke været muligt at følge Smeltevandets Vej videre fremad.

¹⁾ Smlg. anf. St. S. 66.

²⁾ Anf. St. S. 60—61.

³⁾ Anf. St. S. 61—63.

⁴⁾ Anf. St. S. 5.

⁵⁾ HARTZ, N. og MILTHERS, V. 1901. Det senglaciale Ler i Allerød Teglværksgrav. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening Nr. 8. S. 40.

⁶⁾ RØRDAM, K. 1899. Beskrivelse til Kaartbladene Kjøbenhavn og Roskilde. D. G. U. I R. Nr. 6. S. 58.

⁷⁾ RØRDAM, K. og MILTHERS, V. 1900. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladene Sejro, Nykjøbing, Kalundborg og Holbæk. D. G. U. I R. Nr. 8. S. 69—81.

Længere end til Egnen Vest for Skarriidsø har MILTHERS ikke fulgt de omtalte Randmorænebakker, men paa en Kortskitse i anden Udgave af Danmarks Geologi har USSING antydnet en Fortsættelse af dem imod VNV. henimod Kalundborg, og han meddeler desuden, at der mellem Jyderup og Kalundborg findes en lille Hedeslette foran Isranden ¹⁾).

Angaaende Forholdene under Isens videre Afsmeltning i Egnen omkring Skarriidsø giver MILTHERS i den ovenfor nævnte Kortbladsbeskrivelse nogle yderligere Oplysninger ²⁾). Den Dal, hvis vestlige Del nu gennemløbes af den ubetydelige Bregninge Aa, og som ligger i Forlængelse af Halleby Aa's øvre Løb, skildres som anselig, paa flere Steder 3—400 M. bred. Den afvandes nu af Bregninge Aa mod Vest og et Tilløb til Halleby Aa mod Øst, medens Halleby Aa nu løber sydpaa gennem Lille Aamose og Tissø. MILTHERS tyder disse Forhold smukt og sandsynligt ved at antage, at det er de betydelige Mængder Smeltevand, som maa formodes at have fulgt Halleby Aa, der har udgravet den nævnte Dal, medens det nuværende Afløb gennem Tissø har været spærret. Denne Spærring iværksattes af Is, saaledes at Tissø og Lille Aamose samt det nærmeste Terrain herom udgjorde en isdæmmet Sø med Vandspejlet indtil 10 M. over den nuværende Havoverflade ³⁾) og Afløb gennem den nuværende Bregninge Aa's Dal. Den Is, der har dæmmet op, mener MILTHERS, er „en betydelig Istunge, der fra Syd paa et forholdsvis sent Tidspunkt af Afsmeltningen trængte sig op igennem Storebeltbassinets.“ Han antager, „at dens Rand paa Sjællandssiden har haft Retningen NV—SØ“.

Ved den geologiske Kortlægning af Fyn har man ikke fundet saa udprægede Israndsdannelser som de ovenfor omtalte, men der findes dog ogsaa her Bakkeformer, som maa tænkes opstaaede ved Isranden i Isens Afsmeltningsperiode. Det mest udprægede Strøg af saadanne Bakker er beskrevet fra Hindsholm og den sydlige Del af Samsø. Det har en Retning i det hele og store fra Nord—Syd og danner en svag, imod Vest konveks Bue; det bestaar af afrundede, langstrakte Sand- og Grusbakker. I Kortbladsbeskrivelserne udtales det, at disse Bakker kunne være dannede „ved Isranden eller i Is-Kløfter i dennes Nærhed“. Der gøres desuden opmærksom paa de Forstyrrelser, som næsten allevegne ses i Lagstillingen, og Bakke-

¹⁾ USSING, N. V. 1904. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. Anden Udgave S. 267—268.

²⁾ Anf. St. S. 81—83.

³⁾ Denne Højde er Højden af nogle flade Grusaflejringer langs Østsiden af Tissø, og den svarer godt til Højden af Dalbunden i Bregninge Aa's Dal (anf. St. S. 82—83).

dragene sammenlignes med „Durchragungszüge“¹⁾. I Sammenhæng hermed er det værd at lægge Mærke til, at øvre lagdelt Diluvialsand (senglacialt Ferskvandssand) findes som Overfladedannelse over forholdsvist betydelige Arealer paa det sydlige Samsø²⁾.

I Beskrivelsen til Kortbladet Bogenfore Madsen foreslaar Madsen at indføre Betegnelsen „Tværbakke“ for det tyske „Durchragung“ og samtidig at udvide Betydningen af dette Ord noget. Det karakteristiske for en Tværbakke skal da være, at den „har samme Længderetning som Landisens Rand“³⁾. Som saadanne „Tværbakker“ tyder han en Række Bakker med Retning Nordvest—Sydøst og andre noget længere østpaa med Retningen NNV.—SSØ. I Forbindelse hermed har det Interesse, at der i det samme Arbejde gøres opmærksom paa det ejendommelige i Forløbet af en stor Mængde af Aadalene indenfor Kortbladsområdet, idet disse Dale løbe parallelt i Retningen Nordvest—Sydøst⁴⁾.

Den næste iagttagelse, der fremkom, er publiceret i Ussing's Danmarks Geologi. Her omtales kort „de ret iøjnefaldende, i NV—SØ langstrakte, smalle Sandsletter mellem Odense og Kerteminde“⁵⁾. De samme Sandsletter behandles noget udførligere af Madsen i Beskrivelsen til Kortbladet Nyborg⁶⁾, og S. 91 skriver han: „De betydelige Forekomster af senglacialt Sand og Grus mellem Nyborg Fjord og Odense Fjord maa antages at skyldes, at Isranden i lang Tid holdt sig saa temmelig stillestaaende i disse Egne, den Gang da Isen havde sin største Udbredelse under det sidste Ismaksimum paa Kortbladet Nyborgs Omraade“, og de sættes herved i Forbindelse med den S. 28 (samt 30, 32 og 83) omtalte Isrand gennem disse Egne i Retningen Nordvest—Sydøst. Smeltevandets skal altsaa have løbet parallelt med Isranden og under dennes Tilbagerykning have afsat den ene langstrakte Sandslette bagved den anden. Desuden omtales flere mindre Forekomster af senglacialt Sand, hvoraf en Del slutter sig til Aasene.

Om selve Isen paa Kortbladet Nyborgs Omraade antager Madsen, at den, efter først at have trukket sig tilbage fra disse Egne, atter er rykket frem fra Nordøst „under et nyt, mindre Ismaksimum“ om-

¹⁾ USSING, N. V. og MADSEN, VICTOR. 1897. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Hindsholm. D. G. U. I R. Nr. 2, S. 29—30.

MADSEN, VICTOR. 1897. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Samsø. D. G. U. I R. Nr. 5. S. 47.

²⁾ I R. Nr. 2. S. 32—33 og I R. Nr. 5. S. 49.

³⁾ MADSEN, VICTOR. 1900. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Bogenfore. D. G. U. I R. Nr. 7. Fodnote S. 45—46.

⁴⁾ Anf. St. S. 3—4.

⁵⁾ USSING, N. V. 1899. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. S. 203—204.

⁶⁾ MADSEN, VICTOR. 1902. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Nyborg. D. G. U. I R. Nr. 9. S. 88—91.

trent til en Linje fra Sydenden af Odense Fjord imod Sydøst til Storebelt ca. 2 Mil Syd for Nyborg ¹⁾). Denne Antagelse støtter han dels paa Resultater af Stentællinger i Morænerne ²⁾ og dels paa Forekomster af Morænegrus og Morænesand i visse bestemte Strøg ³⁾ samt paa Tilstedeværelsen af en Del Tværbakker ⁴⁾).

Foruden disse Tværbakker i Egnen Nord, Nordvest og Vest for Nyborg omtales ogsaa i samme Beskrivelse et andet Omraade, hvor der findes en Del af disse Bakker, nemlig Egnen omkring Kverndrup. Disse sidste sættes i et senere Arbejde ⁵⁾ i Forbindelse med en Isrand, der har staaet Nordøst og Øst for en stor, isdækket Sø. Tværbakkerne findes hovedsagelig Nordøst for denne Sø; længere imod Syd karakteriseres Isranden ved „ofte langstrakte, rygformede Bakker, som have saa temmelig nord-sydlig Retning, og som sikkert bør opfattes som Randmoræner.“ Lignende Dannelser angives at findes flere Steder paa den sydlige Skraaning af de høje Bakker Syd for Søen samt i Omegnen af Højerupgaard Huse ⁶⁾). Afløbsforholdene for Smeltevand har været meget ejendommelige, idet der har dannet sig en stor, isdækket Sø med forskellig Udstrækning til forskellige Tider. Det fører dog for vidt her at komme ind paa disse saa specielle Forhold.

Hvad sluttelig Jylland angaar, da er det kun en forholdsvis ringe Del af denne Landsdel, som hidtil er bleven geologisk kortlagt, nemlig Vendsyssel og et mindre Parti længst imod Sydøst. Om Forholdene i Vendsyssel foreligger der to Arbejder af JESSEN. I det første, der omhandler største Delen af Vendsyssel, skriver han ⁷⁾, at ingen Randmorænedannelser findes „typisk udviklet i Vendsyssel, men flere Ting, bl. a. Bakkeformerne, give dog enkelte Fingerpeg om Israndens Beliggenhed under Afsmeltningen.“ Som et „endemoræneagtigt Fænomen“ tyder han nogle „betydelige Samlinger af store Sten“, men disse yder dog ikke tilstrækkelige, faste Holdepunkter til Bestemmelse af Israndens Beliggenhed. Mere giver selve Terrainformerne. JESSEN beskriver f. Eks. fra flere Steder — saaledes i Allerup Bakker og ved Storskov — Bakkeformer, som han tyder som Randmoræner; disse Bakker slutter sig til et stort Højdedrag, om hvilket han skriver: „Hele det smalle og betydelige Højdedrag fra Pajhede Skov imod S.

¹⁾ Anf. St. S. 28.

²⁾ Anf. St. S. 51.

³⁾ Anf. St. S. 30 og 32.

⁴⁾ Anf. St. S. 83.

⁵⁾ MADSEN, VICTOR. 1903. Om den glaciale, isdækkede Sø ved Stenstrup paa Fyn. D. G. U. II R. Nr. 14. S. 52—53.

⁶⁾ Anf. St. S. 51.

⁷⁾ JESSEN, A. 1899. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladene Skagen, Hirshals, Frederikshavn, Hjøring og Løkken. D. G. U. I R. Nr. 3. S. 153—156.

og SSØ. til Storskov taget under ét viser ogsaa en saa iøjnefaldende og selvstændig Overfladeform og Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne, at det næppe er overdrevent at sætte hele Bakkekammens Eksistens i Forbindelse med Randen af en stor Indlandsis, som i lang Tid har ligget her“.

I den senere udkomne Beskrivelse til den nordlige Del af Kortbladene Aalborg og Nibe¹⁾ omtales ligeledes Terrainformer, som maa sættes i Forbindelse med Isranden. I den vestlige Del af Kortbladsomraadet findes mellem Brovst og Brathjerg en Række udprægede Bakkerygge, der maa tænkes dannede langs med Isranden²⁾, og længere imod Øst finder man i den nordlige Del af Vester Hassing Bakkeø samt i Hammer Bakker ligeledes Randmorænedannelser³⁾. For denne Tydning af Bakkeformerne taler ikke blot selve Bakkerne, men ogsaa en Del karakteristiske, men dog som Regel temmelig smaa, senglaciale Smeltevandsdale, der slutter sig nøje til Randmorænerne, og som er beskrevne i Forbindelse med disse og desuden udførligere omtalte i et særskilt Afsnit⁴⁾. I det samme Arbejde⁵⁾ giver JESSEN en samlet Beskrivelse af, hvorledes man maa tænke sig, at Isens videre Afsmeltning er foregaaet i den øvrige Del af Vendsyssel, idet han lægger Fordelingen af Højdedragene til Grund for disse Betragtninger; da de nævnte Forhold kun var kort berørte i den tidligere Kortbladsbeskrivelse, danner disse Meddelelser et væsentlig Tillæg til denne. Først angives det, at den Isrand, som betegnes ved de høje Bakkekamme Dronninglund Storskov og Allerup Bakker, har fortsat sig i nordlig Retning omtrent til Sindal og herfra videre imod Nordvest i en ny Bue ud imod Hirshals. Bagved denne Israndslinje findes andre, som viser, at den nordlige Del af Isen har trukket sig hurtigere tilbage end den sydlige. Medens Isranden saaledes imod Syd endnu laa ved Allerup Bakker, har den paa et vist Tidspunkt staaet langs med en Linje over Øster Vraa og Tolne til Eskjær. Et senere Stadium betegnes af en mindre Bakkerække fra Albæk imod NNV., og svarende hertil synes der ogsaa imod Nord at være to Trin, et ældre langs med Bakkekammen fra Hørby imod Nord og et yngre imod Nordøst til Flade. Endelig angives den sidste Israndslinje af et Bakkedrag imellem Sæbygaard Skov og Bangsbo, og det er muligt, at denne Linje bør trækkes videre over Hirsholmene. Til Slutning skal det endnu nævnes, at JESSEN

¹⁾ JESSEN, A. 1905. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladene Aalborg og Nibe (nordlige Del). D. G. U. I R. Nr. 10.

²⁾ Anf. St. S. 43 og 79.

³⁾ Anf. St. S. 41—42 og 79.

⁴⁾ Anf. St. S. 89—94.

⁵⁾ Anf. St. S. 79—81.

ogsaa tager Spørgsmaalet om de beskrevne Dannelsers Alder i Forhold til andre jydske Moræneaflejringer op til Behandling¹⁾, men det vilde føre for vidt her at komme ind paa denne Side af Undersøgelsen.

Naar Vendsyssel undtages, er det kun meget lidt af Jydland, der hidtil er geologisk kortlagt, og udgivet er kun Kortbladet Skamlingsbanke, hvis jydske Del ikke omfatter mere end ca. 3 Maalebordsblade. Ogsaa i Beskrivelsen hertil giver JESSEN nogle Oplysninger om Israndsdannelser²⁾. Det vigtigste Randmorænestrøg findes ved Kortbladets Vestgrænse, men da det for en stor Del ligger udenfor denne, og da tillige de samtidige, betydelige Smeltevandsdannelser kun findes paa det tilstødende Kortblad, opsættes den nærmere Beskrivelse til et senere Arbejde. Desuden tyder JESSEN selve Skamlingsbanke Ryggen som en Randmoræne, og endvidere mener han paa Grundlag af Overfladeformerne og den forskellige Udvikling af Aadalene at kunne angive to mellemliggende, men mindre væsentlige Stillinger af Isranden.

Andre Undersøgelser. Som det vil være fremgaaet af det foregaaende, er der ved den hidtil foretagne geologiske Kortlægning her i Danmark fremskaffet Oplysninger om Israndens Beliggenhed i forskellige Egne af Landet under Isens Afsmeltningsperiode, idet en Del Bakkeformer er blevne erkendte som Israndens Moræneaflejringer. Derimod findes der ingen betydelige Smeltevandsdannelser i det undersøgte Omraade, saa at de Oplysninger, som Kortbladsbeskrivelserne indeholder om saadanne Dannelser, kun er sparsomme. Dog er der i den senere Tid fra anden Side fremkommet væsentlige Bidrag til Kendskabet om disse Ting, idet USSING har taget de midtjydske Smeltevandsdannelser op til Undersøgelse, og det ikke blot for at studere deres Natur, men ogsaa for ved Hjælp af dem at fastslaa Israndens Beliggenhed til forskellige Tider under Afsmeltningen.

Som man ser, viser Udviklingen her hjemme ogsaa paa dette Punkt en vis Lighed med, hvad der var Tilfældet i Nordtyskland, og Ligheden bliver endnu mere iøjnefaldende, hvis man sammenligner USSING's Undersøgelser med de tidligere omtalte Arbejder af KEILHACK. Thi ligesom igennem disse kastes der ogsaa ved hine Lys over væsentlige Afsnit af Landets Dannelseshistorie, og der aabnes gennem de anvendte Betragtningssmaader Muligheder for ved fremtidige Undersøgelser at naa til langt sikrere Resultater, end Studiet af Randmo-

¹⁾ .Anf. St. S. 81—88.

²⁾ JESSEN, A. 1907. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Skamlingsbanke. D. G. U. I R. Nr. 12. S. 63—71.

Danmarks geologiske Undersøgelse II R. Nr. 19.

ræner alene kan ventes at give. En kort Oversigt over USSING's Undersøgelser kan maaske derfor være paa sin Plads her, selv om der naturligvis ikke kan blive Tale om at komme ind paa Enkelt-hederne deri.

I et Arbejde om de jydske Hedesletter¹⁾ underkaster USSING disse en nøjere Undersøgelse, og han opfatter dem som dannede foran Isranden under en længere Stilstandsperiode samt giver et Kort over hele Indlandsisens Udbredelse paa dette Tidspunkt („det baltiske Stadium“²⁾). Særligt indgaaende behandles Karup Hedesletten³⁾, hvorved Rigtigheden af JOHNSTRUP's Antagelse, at den midtjydske Isrand har bøjet imod Vest til Vesterhavet, bevises. Om selve Hedesletten meddeles det, at den opbygges af en Række sammenflydende „Aflejningskegler“ med Toppunkter i den østlige Israndslinje, og at den fortsætter sig i en enkelt Flodslette vestpaa forbi Holstebro til Vesterhavet. Smeltevandsfloder, som forlod Isranden ved Kegletoppunkterne, har opbygget Sletten ved Aflejring af Materiale paa deres Vej fra den østlige Isrand til Vesterhavet. Naar Smeltevandsfloderne søgte denne Vej ud og ikke, som den nuværende Skive Aa, løb nordpaa til Limfjorden, var det fordi Indlandsisen selv spærrede for Afløb ad denne kortere Vej til Havet, idet den ogsaa dækkede det forholdsvis lave Terrain umiddelbart Nord for Hedesletten. Paa et senere Tidspunkt ophævedes dog denne Isspærring og Smeltevandet søgte nu den nævnte Vej ud. Dette gav Anledning til Udformningen af det store Karup Dalsystem i selve Hedesletten og Aflejringen af Hjelmhede Terrassen Nord for denne.

I det samme Arbejde kommer USSING lejlighedsvis ind paa Betragtninger af forskellige specielle Landskabsformer. Af særlig Interesse er Paavisningen af de i Morænelandskabet forekommende lange Søer og Sørækker, som peger hen imod de omtalte Kegletoppunkter og saaledes antyder en betydelig subglacial Erosion af de samme Floder, som opbyggede Hedesletten⁴⁾. Endvidere er der Grund til at fremhæve Beskrivelsen af „Jordfaldshullerne“ ved Flyndersø og Tydningen af denne ejendommelige Terrainform⁵⁾. Da de nævnte, iøjnefaldende Huller findes nedsænkede i en ellers plan Terrasseflade, maa de være opstaaede efter dennes Dannelse, og USSING paaviser nærmere, at „Jordfaldene“ maa sættes i Forbindelse med senere Bortsmelten af isolerede Ispartier, som efterlodes, da Isen smeltede af,

¹⁾ USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2.

²⁾ Anf. St. S. 114—121.

³⁾ Anf. St. S. 121—145.

⁴⁾ Anf. St. S. 133.

⁵⁾ Anf. St. S. 145—152.

og begravedes i Sandet paa det Tidspunkt, da Smeltevandet fik Afløb over Hjelmhede.

I anden Udgave af Danmarks Geologi¹⁾ beskæftiger USSING sig atter med de her omhandlede Fænomener. I en Oversigt over Istidsdannelseernes Overfladeformer²⁾ skildres de forskellige Landskabstyper, og Beskrivelsen af flere specielle Terrainformer har en ikke ringe Interesse; det kan eksempelvis fremdrages, at de ovenfor nævnte, subglaciale Dale her omtales udførligere og benævnes „Fjorddale“³⁾. Derefter gengives i forkortet Form de i Afhandlingen om Hedesletterne offentliggjorte Anskuelser⁴⁾, og paa Grundlag af nyere Undersøgelser, væsentlig over yngre Smeltevandsdannelser, tilføjes en samlet Fremstilling af Isens videre Bortsmelten i Viborg Egnen⁵⁾. Foruden de to ældre, ovenfor omtalte Smeltevandsafløb forbi Holstebro og over Hjelmhede angives her to yngre Afløbsveje for Smeltevandet, nemlig Falborg Dalen og Skalsaa Dalen, der begge paa en Maade forbinder den nordlige Del af Gudena Dalen med Limfjorden. Endvidere antydes det, at den senglaciale Gudena paa et senere Tidspunkt fik sit nuværende Udløb igennem Randers Fjord. Foruden Beskrivelsen af selve Smeltevandsdalene gøres der ogsaa Rede for Israndens omtrentlige Beliggenhed paa de forskellige Tidspunkter, og det nævnes, at der findes smukke Randmorænedannelser i Egnen Vest og Syd for Hobro.

C. Arbejdsmetode.

Igennem det foregaaende vil man have faaet Indtrykket af, at Undersøgelser som de her omhandlede maa bygges paa Kendskab dels til Jordbundsbeskaffenheden og dels til Terrainforholdene i den paagældende Egn. Hvad det første Punkt angaar, da foreligger der hidtil kun over en mindre Del af Landet saa detaillerede Jordbunds-kort, som kræves til saadant Brug, og man er derfor, navnlig for Jydlands Vedkommende, henvist til selv at skaffe sig et Overblik over Jordbundsforholdene og Oplysningen om de enkelte Jordarters

¹⁾ USSING, N. V. 1904. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. 2den Udg. Iøvrigt var en lignende, men betydeligt mere kortfattet Fremstilling allerede Aaret før givet af den samme Forfatter i en Artikel: »Geologi og Overfladeforhold« i TRAP, J. P. 1903. Kongeriget Danmark, 3die Udg. Bd. 1. S. 5—22.

²⁾ Anf. St. S. 229—250.

³⁾ Anf. St. S. 246—248. Sammenlign ogsaa S. 257—258.

⁴⁾ Anf. St. S. 250—263.

⁵⁾ Anf. St. S. 263—267.

Udbredelse ved at færdes ude i Terrainet. Hvad derimod Terrainforholdene angaar, da har man i Generalstabens fortrinlige Kort et Grundlag, der i høj Grad egner sig til et Studium hjemme, og som ude i Marken kan hjælpe væsentlig til at give Overblik, medens paa den anden Side naturligvis ikke alle Enkeltheder kan komme lige tydeligt frem paa Kortet, saa at man ogsaa for Terrainformernes Vedkommende kan have væsentligt Udbytte af Markarbejdet.

Ved Undersøgelsen af det i de følgende Kapitler beskrevne Terrain har Generalstabens Kort¹⁾ — saavel Maalebordsbladene i 1:20000 med 5 Fods Horizontalkurver som Atlasbladene i 1:40000 med 10 Fods Kurver — været benyttede. Gangen i Arbejdet har været følgende. Inden Undersøgelsen af en Egn paabegyndtes i Marken, underkastedes Kortene over denne et nøje Studium, idet der udarbejdedes Højdekort efter den af K. J. V. STEENSTRUP beskrevne Metode²⁾. Herved opnaar man ikke blot at fremskaffe et Kort, som foruden at vise en Mængde Enkeltheder giver en glimrende Oversigt over Højdeforholdene over store Arealer, men tillige kommer man saa nøje ind i Terrainet, at man bogstavelig talt genkender hver Bakke og Lavning, naar man senere færdes ude i Marken.

Selv om et Studium af Kortene ofte kan røbe de væsentligste Træk af en Egns Overfladegeologi, er dette dog ikke altid Tilfældet, og man maa derfor tage den Hjælp med, som Kendskabet til Jordbundsforholdene byder. Men dette Kendskab bør ikke alene være en Støtte; først gennem det kan man naa frem til fuld Forstaaelse af Terrainbygningen, idet mange Enkeltheder kun fremgaar af en Undersøgelse af Jordbundsforholdene. Der er derfor i det foreliggende Arbejde lagt stor Vægt ogsaa paa denne Side af Sagen.

Ved Arbejdet i Marken er der altid benyttet Maalebordsblade, dels paa Grund af deres større Maalestoksforhold, og dels fordi 5 Fods Kurverne giver flere Enkeltheder i Overfladeformen. Samtlige Iagttagelser er med Signaturer indførte paa Kortene, og ved den senere Udarbejdelse af den foreliggende Afhandling har disse Kort i Forbindelse med Dagbogsoptegnelser dannet Grundlaget, idet dog

¹⁾ Samtlige de i det følgende angivne Højder er direkte laante fra disse Kort, og dette er Grunden til, at Højdeangivelserne er udtrykte i dansk Maal (Fod), medens der iøvrigt er benyttet Metersystemet. Der er dog overalt, hvor en Højde er angivet i Fod, i en Parentes tilføjet den tilsvarende Værdi i Meter.

²⁾ STEENSTRUP, K. J. V. 1896. Beretning om de i Vendsyssel foretagne geologiske Undersøgelser i Tidsrummet Maj 1889—Maj 1895. Oversigt over de af Danmarks geologiske Undersøgelse indtil Foraaret 1895 udførte Arbejder. D. G. U. III R. Nr. 1. S. 45—47. — Det har i denne Sammenhæng ingen Betydning, at der hertil anvendtes Atlasblade, og at Farveskalaen var en noget anden end den af STEENSTRUP benyttede.

ogsaa her de ovenfor nævnte Terrainkort har været til betydelig Nytte.

Der kunde maaske endnu være Anledning til at komme lidt nærmere ind paa de mere geologiske Betragtningssmaader, som maa lægges til Grund for den følgende Terrainbeskrivelse. Det kan da straks fremhæves, at de Dannelser, som her kommer i Betragtning, falder i to væsentlig forskellige Grupper, nemlig saadanne, som er direkte aflejrede af Indlandsisen, og andre, der skyldes de fra Isranden kommende Smeltevandssfloder.

De Morænedannelser, som er opstaaede ved Isranden, er som Regel lette at kende og kan derfor ofte benyttes til Bestemmelse af dennes tidligere Beliggenhed. Mest iøjnefaldende er Randmorænerne, der danner langstrakte Bakker med samme Længderetning som Isranden. De kan variere meget i Størrelse, fra ubetydelige, voldformede Forhøjninger i Terrainet til store, imponerende Bakkerygge. De maa tænkes dannede umiddelbart ved Isens Rand og i Hovedsagen foran denne, men i Enkelthederne kan Dannelsesmaaden naturligvis ikke altid have været den samme. Ofte kan man af en Randmorænes Form og Bygning slutte sig til de nærmere Omstændigheder, hvorunder den er opstaaet. Man maa saaledes tænke sig, at de lange, regelmæssige, men som Regel kun lave og smalle Randmorænevolde er dannede ved direkte Aflejring af Morænemateriale ved Isranden; de bestaar nemlig som Regel af usorterede Jordarter med udpræget Morænekarakter. Det kan tillige fremhæves, at Rigdommen paa Sten er meget karakteristisk, saa at disse Volde ofte opbygges af typisk Morænegrus; man træffer dog ogsaa Steder, hvor Materialet er noget mere afrullet, og herved dannes der en Overgang til saadanne Randmorænebakker, hvis sorterede og regelmæssigt afsatte Materiale antyder, at de maa være dannede under Medvirkning af det lokale Smeltevand, som har skyllet Sand og Grus ned fra Isranden. En anden og mere iøjnefaldende Form af Randmoræner maa skyldes Oppresning af ældre Dannelser eller Sammenskubning af løst Materiale paa Steder, hvor Isranden afvekslende er smeltet tilbage og har gjort smaa Fremstød. Saadanne Randmoræner har ofte en betydelig Størrelse og en noget mindre regelmæssig Form. I Følge deres Dannelsesmaade er ingen enkelt Jordart karakteristisk for dem; ikke sjældent bestaar de af sorteret Materiale som fluvioglacialt Grus og Sand, men iøvrigt kan man i dem træffe de forskellige Dannelser i uregelmæssig Lejrning.

Medens den første af de skildrede Randmorænetyper oftest kun er til Stede som en enkelt Vold, er det ikke ualmindeligt, at man

træffer den sidstnævnte Form i Bakkestrøg, hvor den ene store Randmorænebakke ligger bagved den anden, saa at forholdsvis betydelige Arealer kan dækkes af disse Dannelser, og man kan være berettiget til at tale om et Randmorænelandskab.

Foruden de egentlige Randmoræner er ogsaa Morænelandskabet en Dannelse, der er karakteristisk for Israndszonen, og som derved har en ikke ringe Betydning til Bestemmelse af Israndens Beliggenhed paa Steder, hvor der ikke er bleven dannet nogen Randmoræne. Morænelandskabet maa i Modsætning til Randmorænen tænkes i Hovedsagen at være opstaaet inde under Isens Randparti. Det bestaar i sin mest udprægede Form af et stærkt kuperet og uregelmæssigt formet Terrain med talrige større og mindre Lavninger og Huller imellem Bakkerne. Ofte danner det som Helhed store Højdedrag med en Længdeudstrækning parallel med Isranden, medens de enkelte Bakker i det ikke har nogen bestemt Længderetning. Det er almindeligt, at Jordbunden i Morænelandskabet overvejende bestaar af Moræneler, men iøvrigt kan Jordbundsbeskaffenheden være meget vekslende, og man træffer ogsaa udpræget sandede Strækninger.

Der skal endnu nævnes en Landskabsform, som staar Morænelandskabet meget nær, og hvis Betydning er en ganske lignende. Paa store Strækninger i det undersøgte Terrain finder man nemlig Israndszonen karakteriseret ved et ejendommeligt smaatoppet og uroligt formet Terrain, der nærmest er at ligne med en Formindskelse af det typiske Morænelandskab. Ikke blot ude i Terrainet træder den smaaakuperede Overfladeform tydeligt frem, men ogsaa paa Kortene er den iøjnefaldende ved Horizontalkurvernes uregelmæssige Forløb i mange smaa Bugter ind og ud, saa at det ofte er vanskeligt med Øjet at følge den samme Kurve over en længere Strækning. Som et smukt Eksempel paa et Omraade med denne Overfladeform kan nævnes Egnen langs med Vestsiden af Kalvø Vig, og et Terrainkort herover findes gengivet i Fig. 1 paa Tavle II. Kortet er en formindsket, fotografisk Gengivelse af et af de tidligere omtalte Arbejdskort (en Del af Atlasblad Spøring); Grænselinjerne imellem de mørkeste og de lyseste Bælter betegner 40 Fods Kurverne, og ved de mellemiggende lysere Toner er 10 Fods Kurverne antydede. Paa dette Kort er der tegnet en mørk Linje, hvis Retning er omtrent VSV.—ØNØ. Den betegner Grænsen imellem to Omraader af væsentlig forskellig Karakter. Imod Nordvest findes et Terrain med store, regelmæssigt og roligt formede Bakkedrag, medens den sydøstlige Del har en iøjnefaldende smaaakuperet Overflade. Man ser tillige, at denne ikke staar i Forbindelse med Fordelingen af Højdepartierne, ja disse fortsætter sig endog fra det ene Omraade ind i det andet.

Det skildrede, smaaakuperede Terrain bestaar saa godt som altid

overvejende af Moræneler, og det maa derfor være opstaaet inde under Isen. Det fremgaar tillige af det ovenfor sagte, at det er dannet paa Steder, hvor Tilførslen af Morænemateriale kun har været ringe, idet denne Overfladeform aldrig er knyttet til selvstændige Højdedrag. Naar nu Indlandsisen ikke ved sin Bevægelse har kunnet udtvære og afglatte de smaa Ujævnheder, hvori denne forholdsvis lidet mægtige Morænedannelse aflejredes, maa det ligge i, at Isbevægelsen har været minimal, og man forstaar derfor, at den skildrede Overfladeform kan være almindelig i Israndszonen. Denne Antagelse bekræftes af de foretagne Undersøgelser, idet man træffer den smaa-kuperede Terrainoverflade paa Steder, hvor man af andre Grunde maa antage, at Isranden har opholdt sig, og almindeligvis kun, hvor denne har skudt sig frem over forholdsvis højtliggende Terrain, saa at Isens Mægtighed i Randzonen har været ringe og Tilførslen af Materiale derfor ubetydelig.

Af det foregaaende vil det være fremgaaet, at den sidst beskrevne Terrainform har en ikke ringe Betydning, selv om den kun spiller en underordnet Rolle i landskabelig Henseende. Naar den her er bleven særlig udførligt omtalt, er Grunden den, at denne karakteristiske og meget sigende Landskabstype hidtil kun har været lidet paaagtet.

Der staar endnu tilbage at omtale den anden store Gruppe af Dannelser, som har Betydning for den foreliggende Undersøgelse, nemlig Smeltevandsdannelserne. Gennem et Studium af dem kan man bestemme de Veje, Smeltevandet har fulgt, og desuden har disse Dannelser Betydning ved, at ogsaa de kan give væsentlige Oplysninger om Israndens Beliggenhed og i mange Tilfælde bevise Sammenhørigheden af adskilte Randmorænepartier. Den følgende Detailbeskrivelse vil frembyde adskillige Eksempler paa disse Forhold.

De Aflejringer, som skyldes Smeltevandet, er i første Række præget heraf, idet de udelukkende bestaaer af vandsorteret og rullet Materiale, og desuden udmærker de sig ved flade og regelmæssige Overfladeformer. Det maa dog siges, at ogsaa disse Dannelser i Enkelthederne kan være underkastede betydelige Variationer. Paa Steder, hvor Smeltevandet har samlet sig i Bassiner og dannet Søer, er Sedimentet som Regel meget finkornet og kan ofte endog være fedt, stenfrit Ler. Desuden udmærker disse Aflejringer sig ved vandret forløbende Grænser, og ofte har de ogsaa tydelige Kystdannelser. En anden og almindeligere Gruppe af Smeltevandsdannelser skyldes derimod Flodernes Virksomhed. I det hurtigt strømmende Vand kunde kun det grovere Materiale bundfældes, og Istidens Flodaflejringer bestaar derfor udelukkende af Grus og Sand; paa Steder, hvor store Smeltevandsfloder strømmede ud fra Isranden, kan der endog være

dannet mægtige Lag af meget groft rullet Grus. I Modsætning til de ovenfor nævnte Sødannelser viser Flodaflejringerne altid en hældende Overflade med Fald i den Retning, Vandet er løbet. Det kan endnu nævnes, at de Dannelser, som skyldes Smeltevandsfloderne, kan adskilles i to Typer: Hedesletter og Smeltevandsdale. Det afhænger dog udelukkende af de lokale Forhold, om det fra Isranden kommende Smeltevand blot har aflejret Materiale og derved dannet Hedesletter, eller om det tillige har givet Anledning til Daldannelse for at skaffe Smeltevandet Afløb.

II. Horsens Fjord Gletscheren.

A. Almindelige Bemærkninger.

Paa et vist, sent Tidspunkt af Istiden laa Isen endnu som et sammenhængende og alt indhyllende Dække over de danske Øer og strakte sig frem til de sydøstligste Dele af Jydland. Medens Højdepartierne her kun skjultes under et forholdsvis tyndt Islag, skød mægtige Isstrømme sig ind igennem de sydlige af de østjydske Fjordlavninger og naaede gennem dem et godt Stykke ind i Landet, og næsten overalt bærer de vel afrundede og afglattede, ofte morænedækkede Fjordsider Vidnesbyrd om Isens Virksomhed. Et Par saadanne udprægede gamle Gletscherlejer er de to dalagtige Lavninger, hvori Horsens Fjord og Vejle Fjord findes, og som begge fortsætter sig et Stykke længere vestpaa end Fjordene i dem. Gennem dem har Isen kunnet flyde let og uhindret, og de har derfor betinget en Udbuen af Isranden i Terrainet Vest for dem. I Modsætning hertil har det temmelig høje Bjerge Herred hæmmet Isbevægelsen, saa at Isranden imellem de to Fjordlavninger har befundet sig et Stykke østligere, og det samme har været Tilfældet med det høje Terrain Nord for Horsens Fjord.

Enkelthederne vedrørende Vejle Fjord Gletscheren er endnu saa godt som ukendte, men det tør haabes, at der i en nær Fremtid vil blive kastet Lys ogsaa over denne interessante Egns Dannelseshistorie, idet Danmarks geologiske Undersøgelse i Somren 1904 har paabegyndt den geologiske Kortlægning af Kortbladene Fredericia og Bække, for hvilke Nordgrænsen dannes af en Linje i Øst—Vest ca. 11 Km. Nord for Vejle.

Hvad derimod Horsens Fjord Gletscheren angaar, skal der i det følgende blive gjort et Forsøg paa at skildre denne Istunge — dels

dens Afhængighed af Højdeforholdene, der giver sig til Kende ved Isens Begrænsning imod Vest, og dels dens Randmoræner og Smeltvandsaflejringer, der den Dag idag er let kendelige i Terrainet, og som muliggør Bestemmelsen af Isens Udbredelse i hine fjerne Tider og Studiet af dens ejendommelige Afvandingsforhold, der for en stor Del har været bestemmende for Udviklingen ogsaa af de nuværende Vandløbssystemer.

1. Højdeforholdene omkring Horsens Fjord.

I en Længde af omtrent 20 Km. strækker Horsens Fjord sig fra Jydlands Østkyst ind i Landet. I Modsætning til Vejle Fjord er den forholdsvis bred, men ikke videre dyb, og Højlandet paa begge Sider falder jævnt ned imod Kysten.

Imod Syd begrænses Horsens Fjord af Bjerge Herred, og Terrainet stiger langsomt og regelmæssigt fra Kysten sydpaa. Det er gennemgaaende højest noget nærmere ved Vejle Fjord end ved Horsens Fjord, men Højderne er ikke særlig store, og det er kun smaa Arealer, der ligger mere end 300 Fod (94 M.) over Havet. Ved Tohøje naas 317 Fod (99 M.), og Trollemose Bakke noget Øst herfor er 349 Fod (110 M.) høj. Halvøens højeste Punkt ligger dog noget nærmere Horsens Fjord, idet Toppen af den isolerede Bakkeknude Bjergelide er 385 Fod (121 M.) over Havet.

Imod Vest forgrener Fjordlavningen sig, idet den dels fortsættes direkte vestpaa i en flad, jævnt stigende Lavning, der afvandes af Bygholm Aa, og dels udsender en dalagtig Forgrening, der gaar fra Nordstrand -- den næsten helt lukkede Vig Nordøst for Horsens -- først i vestlig, derefter i nordvestlig Retning, og som gennemløbes af Store Hansted Aa. Længst imod Vest skilles de to Grene af et trekantet Højdeparti, hvis Hjørner markeres af Landsbyerne Nim og Hornum samt den fra det østligere Terrain overalt synlige Tamdrup Kirke. Her findes ret betydelige Højder; Nim Bavnehøj er 336 Fod (105 M.), ved Hvirring naar Gilhøje 323 Fod (101 M.), og Bavnehøj Vest for Tamdrup Kirke er 334 Fod (105 M.) høj. Dette Højdepartis Nordvestgrænse dannes af Gudena Dalen. Længere østpaa ligger der ikke noget saa udpræget Højdedrag imellem de to Lavninger, men Adskillelsen imellem dem er dog skarp derved, at den nordlige Gren er betydeligt dybere end den sydlige.

Karakteren af de to nævnte, langstrakte Lavninger er væsentlig forskellig. Hvad først „Bygholm Lavningen“ angaar, da fremtræder denne ikke som nogen dyb og skarpt markeret Rende men tværtimod som en ganske flad og bred, kileformet udløbende Fortsættelse

imod Vest af den egentlige Horsens Fjord. Den strækker sig, medens Højden stiger jævnt til en halvandet Hundrede Fod, ind imod det store, tørvefyldte Ullum Kær, fra hvilket den kun adskilles ved et ubetydeligt Højdedrag. Lavningens dybeste Del ligger temmelig nordligt, og her har Bygholm Aa udgravet sin smalle og skarpt-skaarne Erosionsrende. Imod Nord begrænses Lavningens vestlige Ende af det ovenfor omtalte Nim Højdeparti; Stigningen op imod dette er ikke stærk, gennemsnitlig omkring 1:40. Imod Syd og Sydvest er Stigningen endnu mindre. Fra Lavningens Vestende hæver Terrainet sig næsten uafbrudt, om end langsomt, imod Sydvest op imod Højlandet Nord for Vejle.

I Modsætning til dette ganske flade og forholdsvis højtliggende, imod Øst aabne Bækken, der paa Øjet næsten gør Indtryk af en Slette, fremtræder „Hansted Lavningen“ som en smal, men dybt nedskaaren, dalagtig Rende med stejle Skraaninger og flad, tildels tørvefyldt Bund. Godt 10 Km. Nordvest for Horsens afbrydes den pludseligt af et ca. 3 Km. bredt Højdedrag, hvis højeste Punkt det 346 Fod (109 M.) høje Møgelbjerg er. Dette Højdedrag forbinder Nim Højdepartiet med det Nordøst for Lavningen liggende høje Land og skiller saaledes denne fra Gudena Dalen, der paa Strækningen fra Vestbirk imod NNV. op til Østenden af Salten Langsø synes at danne den oprindelige Fortsættelse af Hansted Lavningen.

Imod Nord begrænses Fjordlavningen af et paa sine Steder endog meget højt Terrain og adskilles ved det fra de store Lavninger, hvori Mossø og Skanderborg Sø ligger. Længst imod Vest er Stigningen fra Hansted Lavningen imod Nordøst og fra Nordstrand imod Nord temmelig stærk op til et nogenlunde fladt Areal af 200—250 Fods (63—78 M.) Højde. Imod Nord falder dette Plateau lidt, saaledes at der opstaar en flad og ikke særligt iøjnefaldende, omtrent i Øst-Vest eller ØSØ.—VNV. langstrakt Sænkning. Denne peger hen imod en lille Smeltevandsdal ved Østbirk og adskiller det nævnte fladere Terrain fra Danmarks mægtigste Højdeparti, Ejer Bavnehøj Partiet, Syd for Østenden af Mossø, og et om end mindre højt Omraade, Elbjerg Partiet, Syd for Skanderborg Sø.

Stort og mægtigt hæver Ejer Bavnehøj Partiet sig med sine langstrakte, rolige Former — imponerende ikke blot ved sin Højde, men ogsaa ved Størrelsen af det højtliggende Areal. Betydelige Strækninger ligger her mere end 400 Fod (126 M.) over Havet, og adskillige Bakker er over 500 Fod (157 M.) høje. Selve Ejer Bavnehøj, Danmarks højeste Punkt, naar 547 Fod (172 M.). Øst herfor og kun adskilt herfra ved den smalle Tepstrup Lavning ligger det andet, noget lavere og mere uroligt kuperede Elbjerg Højdeparti, hvis højeste Punkt det 439 Fod (138 M.) høje Elbjerg er. I Tilslutning

til dette strækker der sig imod ØSØ. et henimod 300 Fod (94 M.) højt Bakkedrag, der dog ikke er særlig skarpt adskilt fra det nordfor liggende, omtrent lige saa høje Terrain. De højeste Punkter findes her i Bjergene, 325 Fod (102 M.), og noget Øst herfor Møgelbjerg, 323 Fod (101 M.). Ved sin Retning imod ØSØ. nærmer dette Højdedrag sig Østenden af Horsens Fjord, og det falder direkte, om end ikke særlig stærkt, ned imod den, idet den ovenfor omtalte Sænkning og det Syd for denne liggende, flade Højland ikke fortsættes saa langt imod Øst.

2. Oversigt over Israndsdannelser.

Ind igennem Horsens Fjord Lavningen og dens ovenfor skildrede to Forgreninger imod Vest og Nordvest flød Isen, og den naaede gennem dem saa langt vestpaa som til den nuværende Gudena Dal. Endnu betydeligt længere imod Vest maa Vejle Fjord Gletscheren antages at være trængt frem. Det høje Land imellem de to Fjorde dannede derimod en saa væsentlig Hindring mod Isbevægelsen, at Isens Vestgrænse imellem de to Fjord-Isstrømme befandt sig saa østligt som det Sted, hvor nu Jernbanen mellem Vejle og Horsens passerer Højlandet. Og op over det endog meget høje Terrain Nord for Horsens Fjord naaede Isen ikke engang saa langt imod Vest.

Langs sin Rand har denne Is aflejret Randmoræner, der passerer tværs over Bjerge Herred Højlandet, og som derefter kan følges i to store Buer udenom de to imod Vest og Nordvest vendte Forgreninger af Horsens Fjord Lavningen samt op over det høje Terrain Nord for Horsens. Udenfor Isranden tumlede Smeltevandet afsted afsættende sine Sand- og Grusmasser og paa Steder nedskærende sig store Dale. Derved opstod et helt System af Smeltevandsdannelser, der nu omgiver Randmorænerne imod Vest, og som er meget iøjnefaldende i Terrainet.

Men inden jeg gaar over til den detaillerede Beskrivelse af alle disse interessante Dannelser, skal jeg for Overskuelighedens Skyld først give en kort Oversigt over Forløbet af de Randmoræner, der er dannede langs med Isranden imellem de to Fjordgletschere og foran Horsens Fjord Gletscheren samt over de dertil hørende Smeltevandsaflejringer. Naar der her medtages de Israndsdannelser, som slutter sig til Bjerge Herred Isen, er Grunden den, at der er kommen betydelige Mængder af Smeltevand netop fra denne Del af Isranden, ja endog fra et saa sydligt Punkt som Hjørnet mellem Vejle Fjord Gletscheren og Bjerge Herred Isen, og at de Grus- og Sandaflejringer,

som dette Smeltevand har afsat, sammen med de nordligere Terrasser danner et sammenhængende Hele, der angiver den „senglaciale Gudenaas“ øvre Løb.

Moræner. Som lange, regelmæssige Volde, der oftest bestaar af stærkt stenet Materiale, lader Randmorænerne sig følge over store Strækninger. Andre Steder opløser de sig i mere isolerede Bakker, opbyggede af groft Morænegrus, og atter andre Steder afløses disse af et stærkt kuperet og uregelmæssigt formet Morænelandskab med meget vekslende Jordbundsforhold. Selv om den førstnævnte Form er den almindeligste i det her betragtede Terrain, spiller den landskabeligt set dog kun en underordnet Rolle, idet Morænevoldenes Højde over Omgivelserne som Regel kun er ringe. Men rent teoretisk frembyder Randmorænerne, selv om de er nok saa uanselige, stor Interesse, idet de sætter den arbejdende Geolog i Stand til saa at sige Skridt for Skridt at følge den gamle Isrand.

Ved Landsbyen Engom 2 Km. VNV. for Davgaard Station og kun godt 3 Km. Nord for Vejle Fjord maa man sætte Grænsen imellem Vejle Fjord Gletscheren og Bjerge Herred Isen. Fra dette Punkt har Isranden staaet imod NNØ. til lidt Nord for Hedensted, uden at den dog har efterladt sig nogen egentlig Randmoræne. En saadan træffer man først lidt Nord for Hedensted. I en Længde af godt $3\frac{1}{2}$ Km. løber der her en udpræget Randmoræne, der som en enkelt, næsten uafbrudt Vold med Retning i omtrent Syd—Nord kan følges fra Landsbyen Rimmerslund til lidt Nord for Løsning, og som danner Østgrænsen for en lille Hedeslette. Nord for Løsning Station bøjer Israndslinjen skarpt imod Vest, idet Bjerge Herred Isen her er stødt til Bygholm Lavningens Istunge.

Israndslinjen fortsættes fra dette Punkt udenom Bygholm Lavningen i en Kurve, der ligesom selve Lavningen løber kileformet og temmelig spidst til imod Vest. Den betegnes næsten hele Vejen af en enkelt, voldformet Moræne, der med kun uvæsentlige Afbrydelser strækker sig først næsten retlinjet imod Nordvest i en Længde af omtrent 12 Km. norden om Ullum ud til Gudenaas for derefter med en brat Bøjning at antage næsten vest-østlig Retning og løbe tilbage langs med Nordsiden af Lavningen hen imod Tamdrup Kirke. 2 Km. VNV. for denne danner Israndslinjen en skarp Vinkel paa mindre end 90° , og de Moræner, der er afsatte af Hansted Lavningens Istunge, tager her deres Begyndelse.

Fra det nævnte Punkt strækker Morænedannelserne sig i en stor Bue udenom Hansted Lavningen, først imod NNV. over Nim, derfra videre langs med Gudenaas Dalen i nordøstlig Retning forbi Vestbirk

og herfra videre imod Sydøst, Syd om Østbirk. Medens det sydligste Stykke af denne Bue i Karakteren ligner de ovenfor omtalte Randmoræner, er det Parti, der ligger for Enden af Hansted Lavningen, nærmest at opfatte som et stærkt kuperet Morænelandskab uden nogen egentlig Randmorænevold.

Fra Egnen Sydøst for Østbirk har Israndslinjen fortsat sig imod ØNØ. støttende sig til Sydsiden af Ejer Bavnehøj Partiet, indtil den ved dettes Østende har overskredet Højdedraget for at fortsættes paa Nordsiden af Elbjerg Højdepartiet. Her har Isranden svinget langsom tog derved antaget en Retning i Vest—Øst til henimod Hylke

Fig. 1. Oversigtskort over Israndslinje og Smeltevandsfloder i Horsens Egnen.
1 : 500000.

Station, hvor den er stødt sammen med Randen af den Is, der uafhængig af Horsens Fjord Lavningen var trængt frem til disse Egne over det temmelig høje Terrain Vest for Odder. Langs med denne Nordgrænse for Horsens Fjord Gletscheren findes der ingen egentlige Randmoræner, men forskellige andre Forhold tillader dog en nogenlunde sikker Bestemmelse af Israndens Beliggenhed ogsaa paa denne Strækning.

Betragter man den her angivne Israndslinje under ét, er dens Udbuen udenom de to vestlige Forgreninger af Fjordlavningen det mest iøjnefaldende. Den Maade, hvorpaa Randmorænerne saa at sige omkredser disse, viser tydeligt, hvor nøje Israndslinjens Form er betinget af Højdeforholdene, og i hvor høj Grad de nævnte

Lavninger har begunstiget Isens Fremtrængen imod Vest og Nordvest, samt hvor meget Højdepartierne har hæmmet Isbevægelsen. Man faar gennem dette Forhold et godt Begreb om den Betydning, som de oprindelige Terrainforhold har haft for Isens Udbredelse i dens Randomraade.

Smeltevandsdannelser. Paa den i det foregaaende skildrede, lange Israndsstrækning er der flere Steder strømmet Smeltevandsfloder ud fra Isen. Men overalt østpaa laa den mægtige Ismasse og spærrede Vejen til Kattegat; imod Vest dannede det store, midtjydske Højdeparti en lige saa uovervindelig Hindring for Afløb til Vesterhavet, og endelig imod Syd dæmmede Vejle Fjord Gletscheren op for Smeltevandet. Dette blev saaledes tvunget til at søge sig Vej nordpaa langs med Isranden for gennem Gudenaa Dalen at naa Havet. Man finder derfor udenfor Randmorænerne, og i det hele og store langs med dem, Smeltevandsdannelser, hvis Tilstedeværelse bekræfter den allerede paa Grundlag af Morænedannelserne fremsatte Opfattelse af Israndens Stilling, og som paa flere Punkter kan tjene til Vejledning ved Bestemmelsen af denne, hvor Randmorænerne kun er smaa og utydelige eller helt mangler. Stor Betydning har disse Smeltevandsdannelser ogsaa ved at levere et uomstødeligt Bevis for den hele Israndslinjes Sammenhørighed og altsaa Samtidighed, idet alle Grusaflejringerne, der er dannede af Tilløbene fra de forskellige Punkter af denne Linje, forener sig til én sammenhængende Flodaflejring, der fortsætter sig som en Terrasse nordpaa gennem Gudenaa Dalen.

Men ikke blot som Middel til at bestemme Isens Udbredelse har disse Smeltevandsdannelser Interesse; ogsaa for deres egen Skyld fortjener de at studeres. Thi Smeltevandet har ikke været indskrænket til blot at virke ved at aflejre Grus og Sand foran Isranden, men det har tillige nedgravet sig ofte brede og dybe Dale og derved bidraget sit til den geografiske Udvikling af det her omhandlede Terrain. Disse Dales Dybde i Forbindelse med den Omstændighed, at Randmorænerne efter Isens Bortsmelten delvis har kunnet overtage Ismassens Rolle som Hindring for Afløb til Horsens Fjord, har betinget, at de nuværende Vandløb for en meget stor Del endnu følger de samme Veje som de gamle Gletscherfloder, og man finder derfor gennem Studiet af de Dannelser, som skyldes Smeltevandet, Forklaringen saavel paa mange mærkelige Enkeltheder i dette Terrains Vandløbsforhold som paa det ejendommelige i, at Egnen Vest for Horsens afvandes til det *nordlige* Kattegat, nemlig gennem Gudenaa til Randers Fjord.

I store Træk er Fordelingen af Smeltevandsdannelserne udenfor Isranden følgende. Omtrent midt imellem Vejle og Horsens og umiddelbart Vest for Banelinjen mellem Hedensted og Løsning findes der en smukt udviklet, om end kun ganske lille Hedeslette, d. v. s. et fladt, af Smeltevandet tilsandet Areal, hvis oprindelige Overflade har ligget lavere. Denne Flade, som passende kan kaldes Løsning Hedesletten, har en aflang Form og er langstrakt i Retningen Syd—Nord. Hovedmængden af det Smeltevand, der har dannet Sletten, er kommet fra Isranden langs med dennes Østgrænse; men et Tilløb har den dog ogsaa modtaget fra Sydvest gennem en lille Smeltevandsdal, der kommer fra det Sted, hvor Randen af Bjerge Herred Isen maa antages at have stødt sammen med Vejle Fjord Gletscherens Nordrand. Efter Landsbyen Engom, som ligger i Dalens sydlige Ende, kan den passende benævnes Engom Dalen.

Fra Hedeslettens Nordvesthjørne skete Afløbet, og Vandet er herfra løbet imod Nordvest. Det har nedskaaret sig en dalagtig, flad Rende — Krollerup-Ullum Dalen — langs med den Randmoræne, der betegner Sydvestgrænsen for Bygholm Lavningens Istunge. Straks Nordvest for Ullum munder dette Løb ud i den store Lavning Ullum Kær. Smeltevandet har ikke kunnet naa at fylde hele dette udstrakte Bassin med sit medførte Materiale, og der har derfor her været en stor Sø, som er vedbleven at eksistere ind i den postglaciale Tid, indtil den efterhaanden udfyldtes af Tørv.

Fra denne Søs nordlige Hjørne fortsatte Vandet sin Vej, men nu i nordøstlig Retning, og udgravede den store og brede Dal, der strækker sig fra Aale til Vestbirk, og som nu gennemløbes af Gudena. Ca. 5 Km. nedad denne modtog Floden et betydeligt Tilløb fra ØSØ. I Hjørnet mellem de to sammenstødende Istunger findes nemlig atter et Punkt, hvor et større Vandløb har forladt Isranden; det har nedskaaret sig en smuk Dal tværs igennem Nim Højdepartiet for gennem den at naa Gudena Dalen.

I Nærheden af Vestbirk naaede Smeltevandet den Del af Gudena's Dal, der ligger i Forlængelsen af Hansted Lavningen, og som strækker sig imod NNV. op til Terrainet imellem Salten Langsø og Mossø tværs igennem det høje Land Syd for disse to Søer. Ved sin betydelige Bredde, sine høje og stejle Dalsider og sine smukke Terrasser er dette Stykke af Gudena Dalen et af Danmarks mest imponerende Dalstrøg. Men det har heller ikke blot tjent til Bortledning af det Vand, der ad den ovenfor skildrede Vej naaede hertil; ved selve Vestbirk maa man antage, at endog betydelige Vandmasser har forladt Isranden for at strømme nordpaa gennem Dalen, og endnu et Tilløb har denne faaet igennem den lille Østbirk Dal, en Smeltevandsdal, der løber langs med Nordøstranden af Hansted Lav-

ningens Istunge, og som er dannet af Vand, der er kommet ud fra Isen ca. 1 Km. Sydøst for Østbirk.

Efter denne orienterende Oversigt over de Israndsdannelser, der slutter sig til Horsens Fjords store Lavning, skal jeg nu gaa over til en mere indgaaende Beskrivelse af Jordbundsforholdene og Overfladeformen i det paagældende Terrain og derigennem give Begrundelsen af den fremsatte Anskuelse og et mere detailleret Billede af de forskellige, interessante Dannelser.

B. Morænedannelser.

1. Bjerge Herred Isen.

Israndslinjen fra Engom til Rimmerslund. Det er allerede nævnt, at der langs med Isranden Vest for Bjerge Herred ikke overalt er bleven dannet en Randmoræne, og at kun den nordlige Halvdel af Israndslinjen markeres af en udpræget Morænevold. Stillingen af Isranden længere imod Syd lader sig dog omtrentlig angive, idet man, som det vil fremgaa af det følgende, ikke staar ganske uden Midler til Bestemmelsen af den, til Trods for Manglen paa Randmorænedannelser.

Det sydligste, sikre Punkt af Israndslinjen og tillige det Punkt, som man maa sætte som Grænsen mellem Bjerge Herred Isens Vestrand og Vejle Fjord Gletscherens Nordrand ligger ved Landsbyen Engom. At det forholder sig saaledes fremgaar ikke blot med al ønskelig Tydelighed af Terrainforholdene, men Jordbundens Beskaffenhed peger i samme Retning.

Landsbyen Engom ligger i den sydligste Ende af en kort, men forholdsvis bred Dal, der ved sin flade og grusede Dalbund fremtræder som en typisk Smeltevandsdal. Den gennembryder det sydøstlige Hjørne af et udstrakt Højdeparti Nord for Vejle og munder ud i Løsning Hedesletten. Dalen fortsættes ikke længere sydpaa end til Engom og adskilles kun ved et lavt og temmelig ubetydeligt Højdedrag fra Skraaningen ned imod Vejle Fjord. Imellem Engom og dette Højdedrag strækker der sig en flad, dalagtig Lavning, men denne har en helt anden Karakter end Engom Dalen og kan absolut ikke opfattes som en Fortsættelse af denne ogsaa af den Grund, at dens Bund falder imod Sydvest. Ved Engom har man derfor et

Punkt af Israndslinjen, der er tilkendegivet ved, at der her er kommet en Smeltevandssflod ud fra Isen. Og at man tillige her staar overfor det Sted, hvor den nordfra kommende Isrand bøjede om for at antage en vestlig eller maaske endog nordvestlig Retning, fremgaar af den Omstændighed, at Vandet fra Engom er løbet imod Nord. Hvis den nordfra kommende Isrand havde fortsat sig imod Syd eller Sydvest, havde Smeltevandet nemlig ikke behøvet at nedgrave Engom Dalen og at søge nordpaa gennem den, men det kunde have fulgt Terrainets Fald og have løbet langs med Isranden til den vestlige Del af Vejle Fjord Lavningen, der under disse Forhold vilde have været isfri.

Ogsaa Jordbundsforholdene i Egnen omkring Engom bekræfter de her fremsatte Anskuelser. Medens det højere liggende Terrain paa begge Sider af Dalen bestaar af Moræneler, findes der i den flade Dalbund rullet Grus, som ned imod Engom viser Overgang til Morænegrus og derved røber, at det er dannet i umiddelbar Nærhed af Isranden. Lige i Nordkanten af Engom By iagttoges saaledes i to smaa Grusgave, som begge var ca. 2 M. dybe, groft Grus, der nærmest maa betegnes som Morænegrus, hvis Materiale dog er noget rullet, og hvori der kan findes en Antydning af en vandret Lagdeling. Gruset er temmelig groft, idet Stenene gennemgaaende er 1—2 Dcm. i Diameter og enkelte endnu betydeligt større.

Det næste udprægede Punkt af Israndslinjen træffer man først godt 5 Km. længere imod NNØ. ved Landsbyen Rimmerslund $1\frac{1}{2}$ Km. NNØ. for Hedensted Station, idet den smukke Torpshøje Randmoræne her tager sin Begyndelse. At Isranden har staaet langs med denne Randmoræne og samtidig ved Engom, fremgaar af, at Engom Dalens Bund gaar fuldstændig jævnt over i Hedesletten, der slutter sig til den nævnte Moræne. Det turde derfor være berettiget at trække Israndslinjen som Forbindelseslinje imellem de to angivne Punkter. Ganske vist lader de to Punkter sig forbinde ved mange forskellige Linjer, men Sandsynligheden taler for, at den paa medfølgende Kort angivne, der paa det nærmeste er den lige Linje imellem de to Punkter, er den rigtigste, eller maaske snarere den yderste Grænse, indenfor hvilken Isranden har bevæget sig lidt frem og tilbage, uden dog at have haft tilstrækkeligt Materiale til deraf at sammenskubbe en Morænevold.

Længst imod Syd bestaar Terrainet paa begge Sider af den angivne Linje af Moræneler; dog er dette Øst for Linjen af en noget vekslende Beskaffenhed, og det kan paa Steder gaa over til temmelig stenet Morænesand; tillige er Overfladen her ligesom lidt mere uroligt formet. Længere imod Nord fortsættes Moræneleret Vest for Linjen saa langt nordpaa som til det Sted, hvor denne skærer Hovedlande-vejen. Øst for Linjen er Terrainet derimod allerede her blevet

sandet og gruset og bestaar nu paa Resten af Strækningen op til Rimmerslund af vel sorterede, lagdelte Dannelser, der ikke let lader sig skille fra Hedeslettens Aflejringer udenfor. Det bør dog fremhæves, at der, hvor der har været Lejlighed til at se Profiler, kun er iagttaget vandret, eller saa godt som vandret lagdelt Sand med Gruslag *uden* nogen som helst diskordant Parallelstruktur. Saadant Sand er iagttaget i en ca. 2 M. dyb Grav umiddelbart Vest for Banelinjen og godt 200 M. Nord for dennes Skæring med Hovedlandevejen samt i en større, indtil $3\frac{1}{2}$ M. dyb Grusgrav 100 M. Vest for Constantia Kro.

Terrainhøjden langs med den angivne Israndslinje er noget over 200 Fod (63 M.). Saaledes ligger Engom paa 220 Fod (69 M.), og op over Morænelerterrainer NNØ. herfor gaar Linjen op til omtrent 270 Fod (85 M.). Videre nordpaa falder Terrainet langsomt ned til kun lidt over 200 Fod (63 M.) Nordvest for Hedensted for saa igen at stige til godt 250 Fod (78 M.) op imod Rimmerslund.

Israndslinjen fra Rimmerslund til Nord for Løsning. Videre nordpaa lader Israndslinjen sig paa Resten af det her betragtede Stykke let følge i en Længde af noget over $3\frac{1}{2}$ Km., til den bøjer brat imod Vest. Israndens Beliggenhed fremgaar af en ikke særlig høj og temmelig smal Randmorænevold, der har et næsten retlinjet Forløb i Retningen S. t. Ø. — N. t. V. Den hæver sig noget over Terrainet paa begge Sider, bestaar overvejende af groft Morænegrus og danner Grænsen mellem den flade, grusede Hedeslette imod Vest og et smaatoppet, uroligt formet Morænelerterrain med en Mængde smaa Mosehuller imod Øst. Selve Randmorænenes Veludviklethed i Forbindelse med dens ringe Bredde turde tyde paa, at Isranden her har ligget usædvanlig roligt, og i Samklang hermed staar Karakteren af det bagved liggende, smaakuperede Morænelerterrain, der kun kan tænkes dannet under en næsten stilleliggende Is.

Paa de første 2 Km. fra Rimmerslund nordpaa fremtræder Randmorænen som en smal og ganske lav Bakkeryg, der efter Gravhøjene paa den passende kan benævnes Torpshøje Randmorænen. Den er højest i den sydlige og midterste Del, hvor flere Punkter er omkring 265 Fod (83 M.) høje, men længere imod Nord bliver den lavere, saaledes at den nordligste Top kun er 237 Fod (74 M.). Affaldet imod Øst er mere iøjnefaldende end imod Vest, dels fordi det er stejlere, og dels fordi Morænelerterrainer bagved Israndslinjen ligger lidt lavere end den nærmest ved Morænen liggende Del af Hedesletten. Fig. 1 paa Tavle VI viser Udseendet af Torpshøje Randmorænen set fra den tilstødende Del af Hedesletten.

Medens Randmorænen i det hele taget vel kan siges at danne et sammenhængende Hele, opløser dens Top sig i enkelte, langstrakte Forhøjninger, der imod Syd, hvor Morænen er bredest (ca. 400 M.), synes at ordne sig i to Rækker, hvoraf dog den østligste bestaar af Moræneler ligesom det bagved liggende Terrain. Ellers er Randmorænen ganske overvejende opbygget af Morænegrus, hvori der paa flere Steder fandtes smaa Profiler. I Sydvestkanten af Rimmerslund iagttoges i en omtrent 2 M. dyb Grav Morænegrus, i hvilket Materialet navnlig længst imod Syd var noget rullet. — I Vestsiden af selve den langstrakte Top, hvorpaa Torpshøje ligger, saas en lille, knap 1 M. dyb Grav i lignende Morænegrus. — Ca. 400 M. nordligere paa en lille uopdyrket Top lige Vest for Vejen stak adskillige store Sten op igennem Overfladen. — Umiddelbart Vest for Sebberup ind i det øverste af Skraaningen ned imod et lille, rundt Mosehul var der et smukt, 2—3 M. højt Profil i groft Morænegrus med Blokke paa over 1 M. i Diameter; Materialet imellem Stenene var her fuldstændig usorteret. Det er denne Grusgrav, der er afbildet i Fig. 2 paa Tavle VI. — Et lille, ca. 1 M. højt Profil i lignende Morænegrus fandtes 400 M. Nord herfor, NNØ. for Sebberup Mølle og lidt østligere end Morænen øverste Kam. — I denne afløses Morænegruset derimod af mere rullet og finere Grus, som man har god Lejlighed til at studere i Statsbanernes store Grusgrav, der er ført langt ind i Morænevolden straks Nordvest for Sebberup Mølle. I Nordøstvæggen saas her et 4—5 M. højt Profil i Grus med vandret Lagdeling. Det var overvejende vel sorteret og rullet, og kun de grovere Lag nærmede sig Morænegrus. I Gravene iagttoges flere isskurede Sten, men ingen store Blokke. Noget foran dette Profil var der i Gravens Bund gravet endnu ca. $2\frac{1}{2}$ M. ned; de derved blottede, dybere liggende Lag viste sig at bestaa af noget finere og tillige mere sorteret Grus.

Videre nordpaa følger nu en Afbrydelse af Randmorænen paa $\frac{1}{2}$ Km. Overfladen er her flad med kun enkelte Smaaforhøjninger og ligger paa samme Højde som Hedesletten umiddelbart Vest herfor, nemlig paa omkring 215 Fod (67 M.), og kun ubetydeligt over det bagved liggende Terrain. Jordbunden bestaar dog ogsaa her af Morænegrus. I en lille og temmelig tilskreden Grav ind i Vestsiden af en lille Top 300 M. SSØ. for Løsning Station iagttoges saaledes temmelig groft Morænegrus; en enkelt løstliggende Sten var endog $1\frac{1}{2}$ M. i Diameter.

Imod Vest gaar Morænegruset efterhaanden over i Hedeslettens rullede Grus. Overgangen kunde iagttages i et Par Grave omtrent midt i Afbrydelsen af Randmorænen og lige Øst for Jernbanen. Ved den Markvej, der i Retningen Øst—Vest gaar igennem Lavningen, og godt 100 M. Øst for Banelinjen gravedes der Grus i en mindre, indtil

3 M. dyb Grav. Her fandtes temmelig groft Morænegrus (en enkelt Sten var omtrent 1 M.), der paa et kort Stykke var dækket af 1 M. Sand. Beskaffenheden af Morænegruset var vekslende og paa sine Steder var det noget rullet. Der, hvor Graven var dybest, saas forneden vel afrullet Grus med tydelig Lagdeling. Et ganske kort Stykke Vest for denne Grav og i en flad Forhøjning af Terrainet umiddelbart Øst for Jernbanen var der en større Grusgrav, i hvis Vestvæg der stod et smukt, rent, 4 M. højt Profil i rullet, vandret lagdelt Grus med underordnede Sandlag. Desuden forekom enkelte grovere, i Reglen udkilende Lag af Morænegrus. Man har altsaa her med en indbyrdes Afstand af mindre end 100 M. to Grave, hvori der i den østligste findes overvejende Morænegrus og lidt rullet Grus og i den vestligste rullet Grus med underordnede Lag af Morænegrus. Længere vestpaa følger saa Hedeslettens sorterede Grusaflejringer.

Nord for denne Afbrydelse kan Randmorænen igen følges paa en Strækning af $1\frac{1}{4}$ Km. som en enkelt, sammenhængende, lav Vold med Retningen omtrent Syd—Nord. Den er baade lavere end Torps-høje Morænen, idet dens højeste Punkter kun er lidt over 230 Fod (72 M.), og tillige mindre fremtrædende i Terrainet, da den imod Vest gaar næsten jævnt over i Hedesletten. Ogsaa her bestaar Jordbunden ganske overvejende af Morænegrus og flere Steder rager store Blokke op igennem Overfladen. Kun længst imod Nord, i selve Hjørnet mellem de to her sammenstødende Isrande, fandtes der Profiler. Det sydligste var en lille, noget tilskreden Grav i Østsiden af en lille Top 200 M. Syd for Trindbjerg. Her saas typisk Morænegrus med Sten paa indtil $\frac{1}{2}$ M. I Overfladen oven over Graven laa derimod Sten paa indtil $1\frac{1}{2}$ M. — Lignende Morænegrus iagttoges lidt NNV. herfor i et Par Huller, der var gravede omkring to store jordfaste Sten for at fjerne disse. — I den 236 Fod (74 M.) høje Top, Trindbjerg, der ligger lige paa Grænsen mellem Maalebordsbladene M 8 og M 9 og 100 M. Vest for Banelinjen var der i Østsiden et overordentlig smukt Profil i Morænegrus, som var meget stenet og førte Blokke paa indtil 1 M. Materialet mellem Stenene var noget vekslende, snart leret og snart gruset og noget sorteret. Tavle VII, Fig. 1 viser et Parti af denne Grusgrav. Ogsaa i Nordvestsiden af den samme Bakke var der et mindre Profil i typisk Morænegrus.

Endnu et kort Stykke nordpaa er Jordbunden stadig stærkt stenet, men smukkest optræder Morænegruset Vest for Trindbjerg i et Par Smaabakker, som ved deres øst—vestlige Retning antyder, at de danner Begyndelsen til de Moræner, der slutter sig til Bygholm Lavningens Istunge.

2. Bygholm Lavningens Istunge.

Under den Is, der som en lang og spidst tilløbende Istunge strakte sig ind igennem Bygholm Lavningen, aflejredes Moræneler, der nu danner den frugtbare Overflade i dette Omraade. I det hele og store er dette Terrain fladt, selv om Overfladeformen ofte, navnlig ud imod Israndslinjen, kan være noget uregelmæssig og urolig og derved kan bidrage til at fremhæve Israndslinjen som en Grænse imellem dette mere uroligt formede og smaakuperede Terrain bagved Randmorænerne og de regelmæssigere og roligere formede Strækninger, der ligger udenfor.

En anden Forskel mellem Terrainet paa begge Sider af Israndslinjen fortjener ogsaa at fremhæves. Det er nemlig iøjnefaldende, at der ingen Steder indenfor Randmorænerne findes Flyvesand, medens denne Jordart er temmelig almindelig i det omkringliggende Terrain og ofte gaar helt ind til Randmorænerne, ja endog optræder almindeligt indenfor Smeltevandsaflejringerne Omraade. Der er saaledes iagttaget betydelige Mængder af Flyvesand i den sydøstlige Del af Krollerup-Ullum Dalen paa Strækningen fra Krollerup imod Nordvest og i det Sydvest for denne Dal liggende Morænelersterrain, hvor Flyvesandet i Reglen optræder som et fladt udbredt Dække af fint Sand. Endvidere findes det over store Arealer dels fladt udbredt og dels som smukke Smaaklitter i den i Sydvest—Nordøst gaaende Del af Gudenaa Dalen, i det høje Terrain Nordvest for denne og paa den Del af Nim Højdepartiet, som ligger udenfor Randmorænerne samt i Smeltevandsdalen, der gennemskærer dette Højdeparti.

Israndslinjen fra Nord for Løsning til Nord for Krollerup. Hvad Istungens Begrænsning angaar, da lader den sig bestemme ved sikrere Midler end de i det foregaaende nævnte, der kun her er medtagne for Fuldstændighedens Skyld. Som allerede tidligere antydtes findes der nemlig her vel udviklede Randmoræner, som med kun faa og uvæsentlige Afbrydelser lader sig følge langs med hele Istungens Rand.

Den første Antydning af en Randmoræne træffer man Nord for Løsning Station paa det Sted, hvor den i Syd—Nord gaaende Randmoræne stopper. I Slutningen af det foregaaende Afsnit blev det nævnt, at der her, umiddelbart Vest for Trindbjerg, findes et Par Smaabakker, der røber Israndslinjens Ombøjning paa dette Sted, ved at de er noget langstrakte i Retningen Øst—Vest, og ved at de ligger Vest for den beskrevne Randmorænevold. De bestaar af Morænegrus,

hvad der var Lejlighed til at iagttage i nogle Smaagrave. I Sydsiden af den lille, lave Top, Skindbjerg, hvis øverste Del nu er helt afgravet, var der saaledes to næsten helt sammenstødende Grave i groft Morænegrus; en enkelt Sten heri maalte omtrent 2 M. — Den betydeligt større, 233 Fod (73 M.) høje Bakke straks VNV. herfor er delvis lyngklædt, og adskillige store Sten rager op gennem Overfladen. I Østenden af Bakken iagttoges et ganske lille Profil i Morænegrus og i den vestlige Ende af Sydsiden en noget større Grav i Morænegrus, hvori Materialet imellem Stenene var noget mere sorteret. — I Hjørnet Syd for de to sidst omtalte Smaabakker og Vest for Morænevolden fra Trindbjerg sydpaa ligger der en Mængde store Sten i Overfladen. Flere Steder var man i Færd med at grave disse op, og i de derved fremkomne Huller fandtes der typisk Morænegrus. Overfladen er her flad og jævn og Overgangen til Hedesletten umærkelig.

Fra det her beskrevne Hjørne fortsætter Israndslinjen sig først en kort Strækning i vestlig Retning for derefter at bøje imod Nordvest. De omtalte smaa Morænegrusbakker danner dog foreløbig Slutningen paa de normalt udviklede Randmorænedannelser, og der kommer en Strækning paa omtrent 3 Km., hvor saadanne ganske mangler eller kun findes antydende som lokale, stærkt stenede Smaaomraader, i Reglen paa flad Mark, hvor Højden efterhaanden aftager fra ca. 210 Fod (66 M.) til ca. 180 Fod (57 M.), og uden at man træffer den karakteristiske, voldformede Aflejring. Omtrent 400 M. Vest for den sidst omtalte Morænegrusbakke fandtes der saaledes en mindre Plet, hvor der laa adskillige jordfaste Sten, hvoraf flere var indtil $1\frac{1}{2}$ M. store. De var dog ikke ganske uberørte, idet der omkring nogle af dem var gravet Huller, og enkelte var sprængte. — Omtrent 200 M. længere imod Vest fandtes igen en lille Strækning, hvor ikke faa store Sten ragede op igennem den lyngklædte Overflade. — En lille Smule Morænegrus er iagttaget i en lille Grusgrav ca. 800 M. ØNØ. for Krollerup. Her fandtes $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ M. typisk Morænegrus over lagdelt Sand og rullet Grus. I en lignende Grav lige ved Siden af erstattedes Morænegruset af $\frac{3}{4}$ M. Moræneler; der var her en udpræget Diskordans imellem Moræneleret og det underliggende, rullede Grus.

Løvrigt er det karakteristisk for Jordbunden i Terrainet nærmest bagved den angivne Israndslinje paa Strækningen fra „Hjørnet“ til Nord for Krollerup, at den veksler noget, selv om den i Hovedsagen bestaar af Moræneler. Men ogsaa dette har en varierende Beskaffenhed. Imod Øst er det som Regel temmelig stenet og kan gaa over til Morænegrus; andre Steder bliver det mere sandet og nærmer sig Morænesand. Pletvis optræder desuden rullet Grus og lagdelt Sand.

Hvis der ikke her fandtes andre og bedre Holdepunkter end Jordbundsforholdene indenfor Moræneaflejringerne til Bestemmelse af Israndslinjen, kunde man derfor virkelig være i Tvivl om, hvorvidt den bøjer vestpaa fra det Punkt, hvor den Syd—Nord gaaende Randmoræne standser. Den Omstændighed, at der længere imod Nordvest atter optræder en udpræget Morænevold, lader ganske vist formode, at Fortsættelsen af Israndslinjen maa søges i denne Retning, men noget Bevis for Samtidighed af de to adskilte Randmoræner lader sig, som man har set, ikke føre paa Grundlag af Moræneaflejringerne.

Ser man derimod paa Smeltevandsaflejringerne, maa enhver Tvivl svinde, og den angivne Israndslinje er i Virkeligheden trukket paa Grundlag af disses Udbredelse, nemlig som Nordgrænsen for Løsning Hedeslettens Grusaflejringer. At dette er fuldt berettiget turde fremgaa af, at Terrainet umiddelbart Nord for Grussletten ikke ligger højere end denne men tvært imod i den vestlige Del lidt lavere og herfra uafbrudt falder imod Nord. Der er derfor ingen anden Mulighed, end at Isen her maa have spærret for Afløbet og tvunget Smeltevandet til at løbe imod Nordvest, hvad Tilstedeværelsen af Krollerup-Ullum Dalen og Manglen paa Smeltevandsdannelser nordpaa tilstrækkelig tydeligt viser, at det faktisk har gjort, i Stedet for at følge Terrainets lavest liggende Partier, hvorigennem nu Afvandingen af Hedesletten og dens Omgivelser sker til Horsens Fjord.

En enkelt Iagttagelse, der er gjort ved Hedeslettens Nordgrænse, bekræfter, at denne betegner en Israndslinje. I en lille Grusgrav i Skraaningen ned mod Gjesager Aa, ca. 500 M. ØSØ. for Krollerup og umiddelbart Nord for Vejen fra denne By til Løsning saas et $\frac{3}{4}$ M. højt Profil i rullet Grus med lidt Sand og kun meget utydelig Lagdeling, og heri fandtes enkelte, spredte, forholdsvis store Sten paa indtil $\frac{1}{3}$ M. Da der ellers ikke i Hedeslettens Grusaflejringer er iagttaget saadanne Forekomster af spredte, større Sten, og da Gruset Syd og Sydøst herfor baade er finere og tillige, hvor det er set i Profil, har vist sig at have en tydelig Lagdeling med diskordant Parallelstruktur, maa man tyde det her omhandlede Grus som en Dannelse, der staar paa Overgangen til Moræne og altsaa er afsat nær ved Isranden. Paa den modsatte Side af Aaen og kun ca. 100 M. Nord. for den omtalte Grav findes allerede Moræneler i Overfladen.

Naar i det foregaaende Hedeslettens Nordgrænse er betegnet som Israndslinjen, maa denne dog kun betragtes som en Ydergrænse, indenfor hvilken Isranden maa antages at have bevæget sig lidt frem og tilbage. Herpaa tyder baade den Omstændighed, at Smeltevandsgruset i det nordøstlige Hjørne af Hedesletten ikke gaar helt ind til

de omtalte Morænegrusbakker, og den ret rigelige Forekomst af rullet Grus og Sand, saavel dækket af Moræne som gaaende i Dagen i Isens Randaflejringer.

Desuden er der gjort en Iagttagelse, der kunde tyde paa, at Isranden til en Tid har staaet endog over 1 Km. bagved den angivne Linje, idet der Nordøst for Krollerup, dér hvor Terrainet bagved Israndslinjen er lavest og ligesom danner en imod Nordøst aaben, halvrund Lavning, under Moræneler er fundet stenfrit Ler, hvis Dannelse man fristes til at sætte i Forbindelse med Tilstedeværelsen af en lille isdæmmet Sø paa dette Sted.

Smukke Profiler i dette stenfrie Ler findes i Gravene ved et lille Teglværk, der ligger 300 M. Nord for Stengaard nede i den lille Erosionsdal, som Gjesager Aa har nedskaaret netop igennem denne laveste Del af Terrainet. Umiddelbart Øst for Værket og ind i Dalskraaningen var der en stor Lergrav, hvori der fandtes 3—4 M. vandret bænket Moræneler over vandret lagdelt, blaagraat, stenfrit Ler med indlejrede sandede Lag. Hvorledes Grænsen mellem de to Lag er, var der ikke Lejlighed til at se, da Moræneleret var afgravet et Stykke længere tilbage end det stenfrie Ler. I den vestlige Aaskrænt var der to Grave, en paa hver Side af Vejen, der gaar fra Krollerup imod Nordøst. I Modsætning til det foregaaende Profils Regelmæssighed iagttoges her nogen Forstyrrelse i Lagdelingen, og Morænen var kun ca. 1 M. mægtig. Grænsen mellem Moræneler og stenfrit Ler var ikke let at angive, idet der var næsten jævn Overgang fra det ene Lag til det andet.

Aflejringen af det stenfrie Ler *kan* være foregaaet foran Isranden under dennes Fremrykning, og før den naaede helt frem til den angivne Israndslinje, eller ogsaa kan Leret være afsat under en forbigaaende, maaske endog kun ganske lokal Tilbagegang af Isranden. Endelig er den Mulighed ikke ganske udelukket, at dets Dannelse slet ikke staar i Forbindelse med den her betragtede Isrand. At besvare disse Spørgsmaal og at udrede de nærmere Omstændigheder ved Dannelsen af det stenfrie Ler er paa Grund af dettes Overvejring af Moræneler en vanskelig Opgave, som kun lader sig løse ved meget detaillerede Undersøgelser.

Skjelhøj-Bavnehøj Randmorænevold. Efter den i det foregaaende skildrede 3 Km. lange Strækning, hvor der ingen tydelig Randmoræne findes, angives Israndens Beliggenhed paa de følgende $5\frac{1}{2}$ Km. af en lang, smal og næsten sammenhængende Morænevold, der i Retningen Sydvest—Nordøst strækker sig fra lidt Nord for Krollerup over Skjelhøj til Bavnehøj Nordøst for Ullum. Til at begynde med

er denne Randmoræne kun uanselig og mindre iøjnefaldende ogsaa af den Grund, at den ikke er særlig stenet men paa det første Stykke hovedsagelig bestaar af Moræneler. Længere imod Nordvest bliver den efterhaanden større, baade højere og bredere, og gaar over til næsten udelukkende at bestaa af Morænegrus.

Angaaende de enkelte Dele af Randmorænen skal her kun meddeles følgende. Paa de første $1\frac{1}{2}$ Km. dannes den af en ganske lav og smal Vold, der kun hæver sig 5—10 Fod ($1\frac{1}{2}$ —3 M.) over det øvrige Terrain, og hvis Højde over Havet er omkring 200 Fod (63 M.). Jordbunden bestaar for en stor Del af Moræneler, der kan gaa over til Morænesand, og som et enkelt Sted (VSV. for Skovhus Gaard) erstattes af Morænegrus.

Efter et svagt Knæk følger nu en Strækning paa 2 Km., hvor Randmorænen Retning er lidt mere vestlig, og hvor dens Dimensioner bliver betydeligt større. Fra 200 Fod (63 M.) over Havet stiger den hurtigt op til Skjelhøj, hvor Højden er 230 Fod (72 M.), medens Terrainet paa begge Sider ikke ligger nævneværdigt højere end tidligere. Fra Skjelhøj og videre imod Nordvest aftager Højden atter men kun ganske langsomt, indtil Volden igen bliver lille og ubetydelig paa en kort Strækning Nordøst for Sønderkær. Hele denne Del af Randmorænen er meget mere stenet end det første Stykke. Sydøst for Skjelhøj findes dog endnu en Del Moræneler, medens Jordbunden i selve Toppen Skjelhøj er endog overordentlig stenet. Videre imod Nordvest er der et enkelt Sted truffet rullet Grus, men ellers bestaar Jordbunden overvejende af Morænegrus, der ofte er noget leret og kan gaa over til Moræneler. Kun et enkelt Profil er iagttaget. Det var i Toppen 300 M. Sydvest for Vestergaard. Her bestod Jordbunden af en Blanding af talrige større og mindre Sten liggende i en leret Grundmasse, der paa det nærmeste svarede til almindeligt Moræneler — altsaa en Dannelse, der nærmest maa betegnes som leret Morænegrus.

Derefter følger en smuk, $\frac{1}{2}$ Km. lang og noget buet Randmorænebakke, der hæver sig ca. 20 Fod (6 M.) over det foranliggende Terrain, og hvis højeste Punkt, som ligger paa den noget imod Nord bøjede nordvestlige Ende af Bakken, er 218 Fod (68 M.) over Havet. Denne Bakke bestaar udelukkende af Morænegrus, og lige Nord for Gravhøjen paa dens Nordvestende er der iagttaget en Mængde store jordfaste Sten, hvoraf en enkelt maalte over 3 M.

Videre imod NNV. stiger Terrainet den næste halve Kilometer op imod Toppen af et lille Højdeparti, der ligger Vest for Kalhave og Nordøst for Ullum, og som maa antages oprindeligt at have hængt sammen med det længere imod Sydvest liggende høje Terrain, fra hvilket det kun skilles ved Smeltevandsdalen, hvori Ullum ligger.

Op ad Skraaningen findes Morænenes Voldform kun antydnet, men paa Toppen er den til Gengæld saa meget smukkere udviklet, idet der her ligger en omtrent 1 Km. lang, udpræget Randmorænebakke, som ved sin skarpe Form ligefrem gør Indtryk af at være sat ovenpaa det ellers flade Højdeparti. Det sidste ligger gennemgaaende ikke mere end 240 Fod (75 M.) over Havet, men herover hæver Randmorænen sig endnu indtil 40 Fod (13 M.) højere og dens Top, Bavnehøj, naar 279 Fod (88 M.). Hele denne voldformede Bakke er opbygget af Morænegrus, i hvilket der dog ikke er set rene Profiler. Kun i Bakkens Nordvestende var der et Par smaa, nu forladte, næsten ganske tilskredne og bevoksede Grave i Morænegrus, hvis Materiale maaske er noget rullet. Iøvrigt stak paa flere Steder en Del jordfaste Sten frem igennem Overfladen.

Bavnehøj Morænebakken danner Slutningen paa den lange, enkle og næsten uafbrudte Morænevold, der strækker sig fra Nord for Krollerup til Nordøst for Ullum, og som er beskrevet i det foregaaende. Denne Randmoræne angiver dog ikke den yderste Stilling, hvortil Isranden er naaet, men man maa antage, at denne Grænse ligger ca. $\frac{1}{2}$ Km. foran, ved den paa Kortet angivne Israndslinje fra Krollerup imod Nordvest, selv om der ikke langs med denne findes nogen Randmoræne. Ogsaa her er det i Hovedsagen Grænsen mellem Smeltevandssanddannelserne og Moræneaflejringerne, der leder til en saadan Antagelse.

Paa den 4 Km. lange Strækning fra Krollerup til Sønderkær ligger der foran Morænevolden et fladt, dalagtigt Terrain, der imod Sydvest begrænses af et højere liggende Morænelersomraade, og hvis Bredde gennemgaaende er godt 1 Km. Ved en Linje omtrent gennem Midten af dette Terrain deles det paa langs i to Dele, og det er kun i den sydvestligste af disse, at man træffer Smeltevandssand, medens Jordbunden umiddelbart udenfor Morænevolden hovedsagelig bestaar af Moræneaflejringer, i Reglen Moræneler. Enkelte Steder findes ogsaa lidt Morænegrus, saaledes i en ganske lav, lille, voldformet Forhøjning straks Øst for Sønderkær, og tillige er der indenfor det lyngklædte Omraade SSØ. for Skjelhøj iagttaget adskillige store jordfaste Sten. En enkelt af disse, den saakaldte Havrum Søsten, ligger omtrent helt oven paa Jordoverfladen og rager godt 2 M. op over denne. Den gør Indtryk af at være skyllet frem, og dette i Forbindelse med Terrainets Fladhed og Skjelhøj Randmorænenes stejle, regelmæssige, næsten retlinjede Affald imod Sydvest, der i meget minder om en Erosionsskraaning, tyder paa, at ogsaa denne nordøstlige Del, selv om den har været isdækket den meste Tid, dog ogsaa har været udsat for Smeltevandets Angreb og delvis udgør en Erosionsflade, som er opstaaet samtidig med Dannelsen af den til-

stødende Morænevold og sandsynligvis paa det Tidspunkt, da Isranden begyndte at trække sig tilbage.

Op over det højere liggende Parti Nordøst for Ullum maa Israndslinjen ogsaa trækkes lidt udenfor Morænevolden, men Afstanden mellem dem bliver her mindre. Israndslinjen fremtræder som en Grænse imellem et Parti, hvor fedt, stenfattigt Moræneler gaar i Dagen, og et lidt mere uroligt formet Morænegrusomraade. Morænelerets Beskaffenhed og Overfladens regelmæssige Form viser tydeligt, at det lille Morænelersparti udenfor Israndslinjen og Terrainet Syd for Ullum hører sammen. I Morænegrusomraadet er kun iagttaget et enkelt lille Profil i en stor, flad, nu tilpløjet Grav lige Syd for Vejen mellem Ullum og Kalhave og umiddelbart bagved Israndslinjen. Her fandtes ca. $\frac{3}{4}$ M. fint Morænegrus med indtil decimeterstore Sten; det gik nedad over til Grus med talrige Smaapartier bestaaende af korte, vandrette Striber af Sand med vandret Lagdeling.

Israndslinjen i Ullum Kær. Søger man den videre Fortsættelse af Israndslinjen, viser det sig, at den fra Bavnehøj bøjer mere i vestlig Retning for snart at forsvinde ud i Ullum Kær, hvor dens Spor ikke lader sig følge paa Grund af det senere afsatte Tørvedække.

Paa Strækningen fra Bavnehøj ned mod Ullum Kær findes ingen egentlig Randmorænevold; Israndslinjen fremgaar ogsaa her som en Grænse mellem det udenfor liggende, fede Moræneler og et Bælte bagved Israndslinjen, hvori Jordbunden er stærkt stenet og overvejende bestaar af Morænegrus. I dette findes der langs med Vejen fra Ullum imod NNØ. flere Grusgrave. Ved Vestsiden af Vejen og knap 200 M. NNØ. for Korsvejen saas et $1\frac{1}{2}$ M. højt Profil i Grus med næsten vandrette, korte Sandlag. Gruset selv var meget lidt sorteret og indeholdt Sten paa over 1 Dcm. — En større Grav lidt længere nordpaa og paa samme Side af Vejen var saa godt som fyldt med harpet Grus og store Stenbunker, saa der kun et Par Steder kunde ses lidt Morænegrus. — Et smukt Profil fandtes derimod i den lille Top straks Nordvest for Skæringen mellem Vejen og Jernbanen. Her saas udpræget Morænegrus, og i Graven laa adskillige, indtil 1 M. store Sten; flere af disse var smukt isskurede. Syd for dette Morænegrus findes det tidligere omtalte Morænelersparti og længst imod Vest lidt Smeltevandsgrus, medens Morænegrusomraadet imod Nord gaar over i et kuperet Morænelersterrain.

Godt 1 Km. Nord for Ullum løber Israndslinjen ud i Ullum Kær. Selv om man saaledes paa den følgende Strækning er afskaaret fra direkte at efterforske Isens Randaflejringer, lader dens omtrentlige Udbredelse sig dog angive paa Grundlag af følgende Raisonnement.

Først og fremmest kan den Mulighed ganske udelukkes, at Isranden skulde have fortsat sig i vestlig eller nordvestlig Retning tværs over Lavningen til det høje Land Nordvest for Gudenaå. Thi det Smeltevand, der kom fra Løsning Hedesletten og gennem Krolle-rup-Ullum Dalen naaede Lavningen Nordvest for Ullum, er herfra, som det fremgaar af Terrasserne, løbet imod Nordøst igennem den nuværende Gudenaå Dal. Isranden kan derfor ikke blot ikke have staaet tværs over Lavningen, men man kan tillige slutte, at Isen ikke har været saa langt fremme, at den har spærret for Indløbet til Smeltevandsdalen ved Nordranden af den store Lavning.

Dette giver en sandsynlig Ydergrænse for Isens Udbredelse i Ullum Kær. Tillige kender man det Punkt, hvor Israndslinjen gaar ud i Lavningen, og da dens Fortsættelse ikke er at søge paa den modsatte Side af Gudenaå, kan man længere imod Nord vente at finde et Sted, hvor Sporene af Isranden igen viser sig i Terrainet Øst for Gudenaå Dalen. Og et saadant Sted har man, som det nedenfor skal blive omtalt, ved Dalens Grænse Nord for Rask. Der er derfor al Grund til at antage, at hvis man forbinder disse to Punkter med en imod Vest buet Linje igennem den nordøstlige Del af Ullum Kær og Sydøstsiden af Gudenaå Dalen ved Aale, da vil denne Linje paa det allernærmeste betegne Isens Ydergrænse.

Ser man paa Overfladeformen og Jordbundsforholdene i Terrainet nærmest bagved denne Linje, finder man en yderligere Støtte for den fremsatte Anskuelse. Overfladen er her uregelmæssigt kuperet og danner en iøjnefaldende Modsætning til det jævne og regelmæssigt stigende Terrain paa den modsatte Side af Gudenaå. Jordbunden bestaar overvejende af Moræneler, der gaar helt ned til Tørven i Ullum Kær, uden at der langs med dette findes noget Smeltevandsgrus. Ud imod Randen bliver Moræneleret noget varierende, dels sandet og dels stenet, og antyder derved, at det er afsat i Nærheden af Isranden. Egentligt Morænegrus træffer man dog først i et Par langstrakte Smaatoppe ca. 600 M. NNV. for Rask, og umiddelbart udenfor disse begynder ogsaa Dalterrassen paa denne Side af Dalen. Man staar altsaa her ved det Sted, hvor Israndslinjen atter bøjer ind paa det højere liggende Terrain Øst for Smeltevandsdannelserne, for omtrent 1 Km. længere imod Øst at forlade Gudenaå Dalen og med omtrent østlig Retning at løbe tilbage langs med Nordsiden af Bygholm Lavningen.

Randmorænedannelser langs med Bygholm Lavningens Nordside. Nim Højdepartiet begrænser imod Nord Bygholm Lavningen. Midten af dette Højparti og den Del af det, der ligger ud imod Gudenaå

Dalen, udgøres af et temmelig højt liggende, fladt Terrain med rolige Overfladeformer. Medens dette pludseligt falder med en brat Skraaning ned imod Gudena, overrages det derimod langs med Højdepartiets Sydrand af en langstrakt Bakkekam, fra hvis højeste Punkter Terrainet falder jævnt og regelmæssigt ned imod de lavere Dele af Bygholm Lavningen. Denne Bakkekam danner en iøjnefaldende Grænse imellem det flade og regelmæssigt formede Terrain imod Nord og den mere uroligt smaa kuperede, langsomt faldende Skraaning imod Syd, og allerede herved antydes, at dens Dannelse staar i Forbindelse med Israndens Beliggenhed paa dette Sted. En Undersøgelse af Jordbundsforholdene beviser Rigtigheden heraf.

Det nordlige, flade Terrain bestaar for største Delen af Moræneler, dog findes ogsaa noget fluvioglacialt Sand og fint Grus, saaledes Nordvest for Hvirring Kirke. Naar denne Egn alligevel gør et temmelig ufrugtbart Indtryk, skyldes det Flyvesand, der ofte som et fladt udbredt Dække danner Overfladen paa forholdsvis betydelige Arealer eller optræder i Smaaklitter.

Det sydligere Terrain, der danner Skraaning ned imod Bygholm Lavningen, bestaar ganske overvejende af frugtbart Moræneler aflejret i uregelmæssige Forhøjninger og Smaabakker, mellem hvilke der findes et Utal af smaa Mosehuller.

Mellem disse to Omraader, der ganske vist begge i Hovedsagen bestaar af Moræneler, men hvis hele Karakter dog er saa forskellig, ligger der et Bælte, der udmærker sig ved at være overordentlig stenet og for en væsentlig Del at bestaa af Morænegrus. Dette Bælte er længst imod Vest ganske smalt, men bliver østpaa efterhaanden bredere, saa at det i den østlige Ende har en Bredde paa omtrent $\frac{3}{4}$ Km. Den ovenfor omtalte Bakkekam, der nærmest maa opfattes som en Randmorænevold, danner hele Vejen den sydligste Rand af dette stenede Bælte, der længst imod Øst, hvor det er bredest, ikke blot naaer et Stykke udenfor Volden, men ogsaa her har sin største Stenrigdom i denne yderste Del.

Dette meget stenede Strøg, der altsaa, som man vil have forstaaet af det foregaaende, er en Randmorænedannelse langs med Nordsiden af Bygholm Lavningens Istunge, strækker sig i en Længde af ca. 7 Km. med et svagt bugtet Forløb fra Gudena Dalen NNØ. for Rask imod Ø. t. N. til et Punkt 2 Km. VNV. for Tamdrup Kirke.

Paa den første Kilometer fra Gudena Dalen østpaa træffer man dog foreløbig ikke nogen voldformet Moræne. Der ligger derimod her enkelte stærkt stenede Smaabakker, og det fladere Terrain imellem og bagved dem bestaar hovedsagelig af Moræneler, der ogsaa er rigt paa Sten. Iøjnefaldende er det saaledes, at alle Mergelgravene her er fyldte med Sten, af hvilke adskillige er over 1 M.

store. Et enkelt Sted, 200 M. Vest for Grønhøj, var et mindre Stykke af Marken endog endnu uopdyrket paa Grund af en Del store, jordfaste Sten.

Den lille, runde Bakke Grønhøj bestaar af Morænegrus, der dog paa Østsiden er noget leret. — Ved Gulbjerg Høje, ca. 300 M. længere østpaa, bestaar Jordbunden ogsaa af Morænegrus, som her er noget mere sandet. I Sydøstsiden af den nordvestligste af de to Gravhøje saas et lille Profil. Under Fyld (lidt af Gravhøjen) fandtes der Grus, som var noget sorteret og ikke leret, men dog kun med Spor af en vandret Lagdeling. Stenene var gennemgaaende smaa, sjældent over 1 Dcm. Aflejringen maa nærmest betegnes som Morænegrus, der staar paa Overgangen til stærkt stenet Morænesand med halvvejs sorteret Materiale.

Terrainhøjden stiger paa dette Stykke fra ca. 180 Fod (56 M.) ved Dalterrassen til omtrent 210 Fod (66 M.) 1 Km. østligere; Terrainet bagved ligger lidt højere.

Gaar man videre imod Øst, forandres Karakteren af det stenede Bælte noget. Det begynder at antage Voldform og stiger jævnt, saa at det snart udgør Terrainets højeste Del. I Løbet af 1 Km. hæver Randmorænen sig saaledes fra 210 Fod (66 M.) til 250 Fod (78 M.) Nord for Hornum, hvor dens Voldform ogsaa er udpræget. Langs den flade Ryg op imod Hornum er Jordbunden stadig stærkt stenet, og efter Overfladen at dømme bestaar den overvejende af lignende sandet Morænegrus, som fandtes ved Gulbjerg Høje. Længst imod Øst iagttoges et Profil i saadant Grus Nord for Hornum, lige Nord for den i Vest-Øst gaaende Vej og Vest for Vejen nordpaa. Der var her gravet et $1\frac{3}{4}$ M. dybt, rundt Hul i sandet Morænegrus uden større Sten. — Ca. 100 M. SSØ. herfor var der ind i Toppen af Bakkekammen en større Grav. Morænegruset var her noget grovere og indeholdt mange Sten paa indtil 2 Dcm. men kun faa, der var nævneværdigt større. Ogsaa her var Materialet imellem Stenene temmelig sorteret, og et enkelt Sted i Gravens Østvæg saas en Antydning af Lagdeling eller fin Bænkning.

Videre østpaa bliver Morænevolden snart meget udpræget og stiger samtidig fra ca. 250 Fod (78 M.) ved Hornum til ca. 290 Fod (91 M.) ved Hvirring Kirke. Navnlig imod Øst, hvor Morænen ligger betydeligt højere end det bagved liggende Morænelerterrain, træder den, set derfra, skarpt frem i Landskabet, saaledes som det fremgaar af Fig. 2 paa Tavle VII. Nordskraaningen er derimod mindre stejl, og Morænevolden er derfor ikke saa iøjnefaldende, naar man kommer nordfra.

Imellem Hornum og Hvirring bestaar Jordbunden i Bakkekammen for største Delen af groft Morænegrus med mange store Sten. Medens

dette sydfor straks afløses af det kuperede Morænelersterrain, er Voldens flade Nordskraaning endnu noget stenet, da det stenede Bælte allerede her begynder at brede sig Nord for den egentlige Bakkekam. Nordpaa synes Gruset dog at blive noget finere og mere rullet, et Forhold, der muligvis staar i Forbindelse med, at der i Egnen Vest for Hvirring Kirke er kommet lidt Smeltevand ud fra Isen. I en stor, flad Grusgrav ca. 800 M. Nordøst for Hornum og 350 M. foran Kammen af Morænevolden iagttoges saaledes Grus, hvori Stenene gennemgaaende kun var ca. $\frac{1}{2}$ Dem. store. Gruset havde en tydelig, vandret Lagdeling, men trods denne var Materialet dog forholdsvis lidet sorteret, og spredt forekom Sten paa indtil 2 Dem.

Fortsætter man fra Hvirring Kirke imod Øst, stiger Morænevolden endnu paa det næste Stykke, og den naar 600 M. Øst for Kirken sit højeste Punkt, 323 Fod (101 M.), paa Toppen ved Gilhøje. Herfra falder den saa atter langsomt. 1 Km. Øst for Hvirring Kirke er en lille Top umiddelbart Syd for Landvejen 311 Fod (98 M.) høj, og længere østpaa gaar den ned til omkring 290 Fod (91 M.).

Hvad Jordbundsforholdene paa Strækningen Øst for Hvirring Kirke angaar, bør det nævnes, at selve Bakkekammen nu ikke længere overalt er saa stærkt stenet som hidtil, men ofte bestaar af Morænesand eller Moræneler, og det er, som om Stenrigdommen lidt imod Øst, hvor Randmorænebæltet naar sin største Bredde, koncentrerer sig langs med dettes yderste (nordlige) Rand.

Den sydlige Bakkekam er dog endnu mere end almindeligt stenet. Saaledes bestaar Toppen ved Gilhøje af Morænegrus, og flere Steder rager adskillige store Blokke op igennem Overfladen. I en smal Mark tværs over Bakkekammen, umiddelbart Nord for Landvejen og ret Nord for Trebjerg taltes f. Eks. ikke mindre end 19 store, jordfaste Sten. — Saa langt østpaa som knap 450 M. Vest for Molkjær Kro fandtes lige Nord for Landvejen Morænegrus, hvori der var en lille, 2 M. dyb Grav. Her saas smukt Morænegrus med Sten af alle forskellige Størrelser. I Vestvæggen sad en Gneisblok paa over 1 M., og et Par lige saa store Blokke laa løse i Gravens Bund. I Østvæggen var Jordarten noget leret og nærmede sig Moræneler, medens Materialet imellem Stenene i Vestvæggen var mere gruset og afrullet. — Nord for denne Grusgrav var der gravet et Par smaa Huller, og ogsaa her fandtes Morænegrus.

Betydeligt mere stenet end selve Bakkekammen er dog som nævnt den nordligste Del af Randmorænebæltet. Allerede lidt ØNØ. for Hvirring Kirke begynder der at optræde nogle Smaatoppe af Morænegrus, og gaar man herfra videre imod ØNØ., kommer man over et overordentlig stenet Terrain. Jordbunden bestaar næsten overalt af

Morænegrus, og der findes endnu Smaapletter, som er uopdyrkede paa Grund af Stenmængden. Flere Steder er Rigdommen paa store Blokke meget iøjnefaldende. Særlig god Lejlighed til at iagttage, hvor stenet Jordbunden er, var der ved mit Besøg i 1905 i en Mark ca. 1100 M. Nord for Trebjerg, hvor man var i Færd med at brække Stenene op. Der saas her en stor Mængde meget store Sten, enkelte endog paa indtil 3 M.

Længst imod Øst bliver Randmorænebæltet smallere, idet den øverste Ende af en Smeltevandsdal her gaar lidt ind i det. Der findes dog endnu noget Morænegrus i nogle Smaatoppe, der ligger Nord for Molkjær Kro og paa den imod VNV. udløbende Forlængelse af den høje, jævnt afrundede store Bakke Vest for Tamdrup Kirke.

Derefter bøjer Morænegrusstrøget pludseligt nordpaa langs med Randen af Hansted Lavningens Istunge.

Terrainforholdenes Indflydelse paa Isens Udbredelse. I det foregaaende er der givet en Skildring af de Randmorænedannelser, som omgiver Bygholm Lavningen. De viser, hvorledes Isen er trængt ind igennem denne, og i hvor høj Grad Israndens Beliggenhed har været afhængig af Højdeforholdene, idet der er en iøjnefaldende Parallelitet imellem Israndslinjen og Horizontalkurverne inde i Lavningen. Men denne Sammenhæng imellem Isens Udbredelse og Terrainforholdene, som saaledes i det store giver sig til Kende ved hele Istungens Dannelse og dens Form, kan ogsaa spores i det smaa i Israndslinjens Enkeltheder.

Fra Hjørnet Nord for Løsning Station er Israndslinjens Retning først vestlig; men den begynder snart at svinge imod Nordvest og danner derved en flad Bue foran det i en anden Sammenhæng omtalte, lavere liggende Parti, der findes Nordøst for Krollerup, og som nu gennemløbes af Gjesager Aa. Israndslinjen trækker sig Vest herfor lidt tilbage til det noget højere Omraade ved Skjelhøj, men videre imod Nordvest træffer man igen en svag Udbuen for en lille Lavning Nordøst for Sønderkær. Isens Fremtrængen her har dog kun været ganske ubetydelig, og den træder kun klart frem, fordi Israndslinjen derefter bøjer stærkt tilbage paa Grund af det høje Parti Nordøst for Ullum. At dette har virket hæmmende paa Isbevægelsen ses ogsaa af, at Israndslinjen efter at have passeret dets Top atter bøjer tydeligt fremad.

Paa det følgende Stykke har Isen staaet ud i det lave Ullum Kær og i Gudenaa Dalen ved Aale. Dette har bevirket, at Istungens Spids har bredet sig noget, et Forhold, som giver sig til Kende ved Is-

randslinjens øst-vestlige Retning Nord for Ullum og dens Forløb ligeledes i Vest—Øst fra Gudenaa Dalen til Nord for Hornum. Fra dette sidste Punkt fortsætter den sig imod ØNØ., og dens næsten uforandrede Retning paa det sidste Stykke er betinget af Nim Højdepartiets regelmæssige Affald imod Syd.

3. Hansted Lavningens Istunge.

Den dybe Lavning, som gennemløbes af Store Hansted Aa, har paa lignende Maade som Bygholm Lavningen begunstiget Isens Bevægelse og betinget en Udbuen af Israndslinjen. Forholdene i denne Egn er dog noget mere komplicerede, idet Isen ikke alene er trængt frem igennem selve Lavningen, men ogsaa har formaaet at overskride det temmelig flade, noget over 200 Fod (63 M.) høje Terrain Nord for denne og endog er naaet et Stykke op ad Ejer Bavnehøj Partiets Sydskraaning. Grænselinjen for Isens Udbredelse imod Nord slutter sig derfor ikke saa direkte til Hansted Lavningen, som Tilfældet er med Bygholm Lavningens Randmoræner, og tillige gør enkelte lokale Afvigelser sig gældende som f. Eks. Israndslinjens Buen ud i den store Gudenaa Dal ved Vestbirk. Men i det hele og store har Terrainforholdene indenfor dette Omraade bevirket, at Isens Randparti ogsaa her har antaget en udpræget Tungeform, der, om end ikke fuldstændig saa dog for en Del, er betinget af den dybe Hansted Lavning.

De Morænedannelser, der er afsatte langs med denne Istunges Rand, afviger ogsaa en Del fra de lange, regelmæssige Grusvolde, som omgiver Bygholm Lavningen. Egentlige Randmorænebakker, opbyggede af Morænegrus, forekommer normalt udviklede kun langs med den sydligste Del af den her omhandlede Israndslinje, medens de videre nordpaa næsten ganske mangler. Dette Forhold staar sandsynligvis for en Del i Forbindelse med, at Isen her paa en lang Strækning er naaet helt frem til Gudenaa Dalen og saa at sige har været beskyttet af Smeltevand, der søgte sig Vej imod Nord uden om den fremtrængende Is.

Til Gengæld er derimod det kuperede Morænelandskab, der maa tænkes opstaaet ved en uregelmæssig Aflejring af Materiale inde under Isens yderste, næsten stilleliggende Partier, saa meget desto bedre udviklet, og det ligger nær at antage, at hele det stærkt kuperede og meget uregelmæssigt formede, høje Terrain, der nu adskiller Gudenaa Dalen fra Hansted Lavningen, er opbygget af Isen paa det her betragtede Tidspunkt, idet man maa formode, at den dybe Han-

sted Lavning har muliggjort en rigelig Tilførsel af Is og dermed ogsaa af Morænemateriale netop til den Del af Isranden, der laa for Enden af Lavningen.

Randmoræenerne SSØ. for Nim. Vil man studere Enkelthederne i de Morænedannelser, der knytter sig til Hansted Lavningens Istunge, er det naturligt at begynde med de sydligste Randmoræner, ikke blot fordi disse er mest typisk udviklede, men ogsaa af den Grund, at de paa en Maade danner den direkte Fortsættelse af de i det foregaaende Afsnit skildrede Israndsaflejringer.

Ligesom Nim Højdepartiets Sydrand krones af en Bakkekam, der rager op over det øvrige Terrain, saaledes findes der ogsaa langs med Højdepartiets Nordøstside et højtliggende Bælte, der med en Bredde af henimod 2 Km. følger dets Rand. Dette Bælte bestaar dog ikke her af en enkelt Bakkekam, der kan opfattes som en Randmoræne, men det dannes af forskellige, sammenkædede, uregelmæssige Bakkepartier, der ved deres regelløse Overfladeformer og ved i Hovedsagen at bestaa af Moræneler, som dog ud imod Randen kan blive usædvanlig stenet, viser sig at være en Dannelse, der er opstaaet inde under Isen. De egentlige Randmoræner langs med dette Partis Sydvestgrænse ligger i Reglen paa et lavere Niveau og bestaar ikke af saa store Bakker, hvorfor de paa denne Strækning er betydeligt mindre iøjnefaldende end langs med Nim Højdepartiets Sydgrænse.

Imod Nordøst begrænses det nævnte, høje, kuperede Morænelers-terrain af Skraaningene ned imod Hansted Lavningen. Denne Skraaning er navnlig længst imod Nordvest temmelig stejl og har paa sine Steder endog et Fald af ca. 1:12. Imod Sydvest grænser det høje Bælte til den allerede i det foregaaende Afsnit omtalte, fladere og noget lavere liggende Del af Nim Højdepartiet, og Israndslinjen kommer saaledes ogsaa her til at danne en iøjnefaldende Grænse imellem et uroligt formet Terrain bagved og et fladere og mere regelmæssigt Omraade foran Israndslinjen.

Langs med denne Grænse er Jordbunden hele Vejen ganske overordentlig stenet, og der findes en Række større og mindre Bakker og Forhøjninger i Terrainet, der alle er opbyggede af usædvanlig groft og stenet Morænegrus og fremtræder som typiske Randmorænedannelser.

Længst imod Syd, ved Østenden af den smukke Smeltevandsdal, der gennemskærer Nim Højdepartiet, og i umiddelbar Tilslutning til de tidligere skildrede Morænegrusforekomster træffer man 900 M.

VNV. for Tamdrup Mølle den første udprægede Randmorænebakke. Med en noget uregelmæssig Form hæver den sig indtil 25 Fod (8 M.) over de nærmeste Omgivelser, og dens Top ligger paa 264 Fod (83 M.). Fra det bagved liggende, kun ubetydeligt højere Terrain adskilles den ved nogle smaa Mosehuller. Denne Bakke bestaar udelukkende af meget groft Morænegrus med en imponerende Mængde store Blokke. Overalt stikker Stenene op igennem den lyngdækkede Overflade og umuliggør al Opdyrkning af Bakken. Paa Tavle VIII er gengivet et Par Fotografier af denne Bakke; Fig. 1 viser hele Bakken set fra VNV., medens Fig. 2 giver et Begreb om dens meget stenede Overflade. Desværre er man nu begyndt at ødelægge dette pragtfulde Stenmonument ved at bryde nogle af de største Sten, som er blevne bortførte, efter Sigende for at anvendes til Brobygning ved Viborg-Herning Jernbanen.

Gaar man herfra en 400 M. imod Nordvest, kommer man over et forholdsvis fladt Terrain med kun enkelte, smaa Morænegrustoppe. Overalt er dog Jordbunden ogsaa her stærkt stenet, og adskillige Steder ligger der endnu store, jordfaste Sten omkring i Markerne.

Derefter møder man atter en meget smuk Randmorænebakke, der er udpræget voldformet, og som med en Længde af 500 M. og en Bredde af 100 M. strækker sig i Retningen S. t. Ø. — N. t. V. Dens Top ligger 264 Fod (83 M.) over Havet, og den hæver sig 25—35 Fod (8—11 M.) over de smaa Mosehuller, der paa alle Sider omgiver den. Allerede her begynder Morænelersterrainet bagved at ligge kendeligt højere end Randmorænen. De første Toppe Øst herfor naar saaledes 291 Fod (91 M.), og længere imod Nordøst op imod Enner træffer man en Bakke paa 308 Fod (97 M.) og lidt NNV. herfor en paa 314 Fod (99 M.). Ogsaa den her omhandlede Randmorænebakke er udelukkende opbygget af Morænegrus, og selv om den ikke er saa rig paa store Sten som den ovenfor omtalte, tager den sig dog pragtfuldt ud i Landskabet. Dens Udseende fremgaar af Fig. 1 paa Tavle IX. Stærkt stenet og hovedsagelig opbygget af Morænegrus er ligeledes den langstrakte, flade Forhøjning udenfor (Nordvest for) Bakken, men her er Stenmængden dog ikke større, end at Jorden lader sig dyrke.

Videre nordpaa følger nu nogle Smaabakker, der bestaar af meget stenet Morænegrus, og hvor Overfladen flere Steder er overordentlig rig paa store Blokke. En usædvanlig Mængde store, jordfaste Sten iagttoges ogsaa umiddelbart Nord herfor paa omtrent flad Mark. VNV. for disse ligger en noget afrundet Bakketop, der bestaar af leret Morænegrus.

Herfra nordpaa kommer der en Strækning paa omtrent 500 M., hvor der ingen egentlige Stenbakker findes, men hvor Jordbunden

dog stadig er usædvanlig stenet. En overordentlig smuk Randmorænebakke træffer man derimod umiddelbart Syd for Hovedlande-vejen og ca. 1700 M. Sydøst for Nim. Den ligger paa Skraaningen af det høje Omraade omkring Enner ned imod en lille, flad Lavning, der adskiller dette Parti fra de høje Banker ved Nim. Højden er derfor størst imod Sydøst, hvor Bakkens Top endog naar 304 Fod (95 M.), og aftager imod Nordvest til ca. 260 Fod (82 M.) samtidig med, at Bakken bliver betydeligt smallere. Næsten hele Overfladen er lyngklædt, og mange store Sten stikker frem mellem Lyngbuskene. I Bakkens Nordvestende saas et lille, $1\frac{1}{2}$ M. højt Profil i Moræne-grus, som dog ikke indeholdt særligt store Sten.

Følger man Israndslinjens videre Forløb, viser det sig, at den nu bøjer mere imod Vest, og dens Retning bliver paa det følgende Stykke omtrent Sydøst—Nordvest. Først træffer man dog i den ovenfor nævnte, lille Lavning en Afbrydelse paa ca. 300 M. i Rækken af Randmorænebakker; men Jordbunden er ogsaa her langs med Hovedlandevejen og Nordøst for denne stadig meget stenet, og tillige angives Israndslinjens Beliggenhed paa dette Sted ved, at en lille Smeltevandsaflejring tager sin Begyndelse i Lavningen umiddelbart Sydvest for Landevejen.

Har man passeret Lavningen, støder man atter paa et Par smaa, aflange Randmorænebakker, der har en Højde af omtrent 280 Fod (88 M.), og som er næsten sammenhængende. Længst imod Sydøst iagttoges heri, ved Vejen op til Ballegaard, et lille Profil i Moræne-grus med mange store Blokke.

I Forlængelsen af disse Smaabakker og lidt højere oppe ad Skraaningen ligger der endnu en lille Morænegrustop, men hermed ophører ogsaa de egentlige Randmorænebakker, og Overfladen bliver nu paa en kort Strækning mere jævn, selv om Jordbunden stadig er stenet. Materialet synes dog her at være mere sorteret. Ved Hovedlandevejen omtrent dér, hvor denne er højest, og straks ØNØ. for Korsvejen iagttoges saaledes i en stor Grusgrav vandret lagdelt, temmelig fint Grus, der dog ikke var ordentlig vandsorteret, og som indeholdt spredte større Sten, men ingen rigtig store. Stenene var meget lidt afrullede, og flere isskurede Blokke fandtes.

Israndslinjen ved Nim. Til Trods for Manglen paa voldformede Morænegrusbakker paa den næste Strækning forbi Landsbyen Nim, lader den yderste Grænse, hvortil Isen er naaet, sig dog temmelig nøje bestemme. Den danner nemlig ligesom længere sydpaa en Grænse imellem et uroligt formet og gennemgaaende meget stenet Terrain Nord for Nim og et fladere og mere regelmæssigt Omraade,

som hovedsagelig bestaar af Moræneler af normal Beskaffenhed, Syd for denne By og ned imod Gudena Dalen. Paa en ca. $2\frac{1}{2}$ Km. lang Strækning lader Israndslinjen sig paa denne Maade følge. Den gaar fra det Punkt, hvor de ovenfor omtalte Randmorænedannelser stopper, først imod Nordvest, Syd om Nim, og bøjer derefter imod Nord, indtil den Nord for Loddenhøj træffer det aflange, dybe og tørvefyldte Hul Porskær. Højden af dette Stykke af Israndslinjen er størst Syd for Nim, nemlig ca. 280 Fod (88 M.); derefter falder den en halvthundrede Fod paa det følgende Stykke nordpaa.

Hvad Jordbunden paa denne Strækning angaar, da er den umiddelbart indenfor den angivne Israndslinje overalt temmelig stenet, men den største Stenrigdom findes dog nærmest i et Bælte 500—600 M. bagved Linjen. Man træffer dér endog meget betydelige Morænegrusforekomster, der ganske vist ikke kan betegnes som typiske Randmorænebakker, da de mangler den karakteristiske Voldform parallel med Isranden og heller ikke gaar helt ud til Israndslinjen, men som dog maa opfattes som en dermed meget nær beslægtet Dannelse. Mest iøjnefaldende er de mægtige Stenophobninger, som følger den sydlige og sydvestlige Rand af den store Bakkeknode Øst og Nord for Nim, saa at Toppene langs med denne Rand og det ofte stejle Affald imod Syd udviser en ganske usædvanlig Stenrigdom. Bakkekknudens nordligere Dele bestaar derimod overvejende af Moræneler, som dog endnu ofte kan være temmelig stenet. Saaledes træffer man allerede Moræneler paa Toppen ved Møllen Nord for Nim.

De nævnte Morænegrusforekomster begynder allerede saa langt imod Sydøst som bagved de i det foregaaende sidst omtalte Randmorænetoppe Sydøst for Nim, idet Toppen og Sydskraaningene af den store Banke, paa hvilken den 336 Fod (105 M.) høje Bavnehøj ligger, udelukkende bestaar af groft Morænegrus med mange store Blokke. Midt paa Sydskraaningene var der endnu bevaret et Stykke af den naturlige Overflade med en Mængde store, jordfaste Sten.

Følger man herfra Terrainets højeste Punkter over til den 334 Fod (105 M.) høje Kjeldhøj, viser det sig, at Jordbunden hele Vejen bestaar af Morænegrus, og Toppen samt Syd- og Vestskraaningene af Kjeldhøj Bakken er ligeledes overordentlig stenede. Ogsaa her findes et lille Stykke af den oprindelige Overflade med dens mange jordfaste Sten uberørt.

Den udprægede Stenrigdom synes at vedblive paa Skraaningene Nord for Landevejen ind igennem Nim By, men den tætte Bebyggelse gør her, at man næsten intet kan se. Kun ved et nybygget Hus Nord for Vejen og Nordvest for Præstegaarden saas et lille Profil i leret Morænegrus. Ved Huset laa der en stor Bunke Sten, som aabenbart hidrørte fra Udgravningen af Grunden.

Endnu paa den 329 Fod (103 M.) høje Kløvenhøj, der ligger Nordvest for Nim, og som danner det vestligste Punkt af den store Bakkeknude her, er Jordbunden saa stenet, at den maa betragtes som Morænegrus.

Videre nordpaa falder Terrainet noget. Jordbunden er stadig stærkt stenet, men bestaar dog nu overvejende af Moræneler. Et enkelt Sted paa Nordsiden af den 240 Fod (75 M.) høje, afrundede Bakke Loddenhøj er der tillige iagttaget fint, stenfrit Sand. Bagved (Øst for) denne bliver Jordbunden derimod atter saa rig paa Sten, at den staar paa Overgangen imellem Moræneler og Morænegrus. Et Profil i saadant stenet og leret Morænemateriale saas i en Grav godt 200 M. ØNØ. for Toppen af Loddenhøj.

Gaar man herfra østpaa, finder man, at Stenrigdommen nu vedbliver et Stykke bagved Israndslinjen. Langs med Toppen af en omtrent i Vest—Øst langstrakt Kam ca. $\frac{1}{2}$ Km. ØSØ. for Loddenhøj bestaar Jordbunden saaledes af leret Morænegrus med en Del store Sten, og Nordøst for denne Ryg ligger der to mindre Bakker, af hvilke den ene ligeledes er langstrakt i Retningen Vest—Øst og den anden omtrent i Nord—Syd. De bestaar begge af Morænegrus. I Vestenden af den førstnævnte af disse to fandtes 650 M. Øst for Toppen af Loddenhøj et smukt, lille Profil i typisk Morænegrus. Disse Bakker kan betragtes som Begyndelsen af en Række Morænegrusforekomster, der ligger i et Strøg herfra imod Nordøst, og hvori Morænegruset forekommer pletvis aflejret i Bakker og Smaatoppe med ganske regelløse Længderetninger.

Israndslinjen for Enden af Hansted Lavningen. Man er ved Porskær naaet til et Punkt, Nord for hvilket enhver Antydning af egentlige Randmorænedannelser synes at mangle. Naar Israndslinjens Beliggenhed alligevel saa nogenlunde lader sig angive, er det paa Grundlag dels af Smeltevandsdannelserne og dels af Terrainets Overfladeformer.

Det Forhold, at Gudena Dalen fra Aale strækker sig imod Nordøst, bevirker, at den efterhaanden atter nærmer sig Israndslinjen, saa at det sidst omtalte Punkt af denne Linje ved Porskær ligger umiddelbart Øst for Dalen. Da Gudena Dalen endnu paa et Stykke fortsætter sig imod Nordøst, maa Isranden videre nordpaa atter have bøjet tilbage, og paa den følgende Strækning i det mindste have antaget en Retning imod NNØ. Det samme Raisonnement, som godtgjorde Israndens Ombøjning ved Spidsen af Bygholm Lavningens Istunge, lader sig nemlig ogsaa gennemføre her. Isen kan heller ikke paa dette Sted have overskredet Gudena Dalen,

da den derved vilde have spærret Afløbet for Smeltevandet; dette viser tilstrækkelig tydeligt, at Isranden atter maa have bøjet tilbage, og det indses tillige, at man i Smeltevandsaflejringerne har en yderste Grænse, indenfor hvilken Fortsættelsen af Israndslinjen maa søges.

Men dette er ikke den eneste Oplysning, Studiet af Smeltevandsdannelserne giver. Et bestemt Punkt af Israndslinjen længere fremme angives ved den øverste Ende af en udpræget Smeltevandsdal, og dette Punkt fremhæves yderligere derved, at Terrainet umiddelbart bagved Smeltevandsaflejringsens Begyndelse ligger lavere end Dalbunden. Dette iøjnefaldende Punkt findes 1 Km. Sydøst for Østbirk, og herfra strækker Smeltevandsdalen sig imod Nordvest, medens den flade Dalbund falder jævnt i samme Retning for ved Dalens Munding at forene sig med Terrassen i Gudenaa Dalen.

Smeltevandsdannelserne giver saaledes dels en ydre Grænse, indenfor hvilken Fortsættelsen af Israndslinjen fra Porskær maa findes, og dels et bestemt Punkt af denne Linje 1 Km. Sydøst for Østbirk.

Ser man derefter paa Overfladeformerne i Terrainet imellem de to nævnte Punkter af Israndslinjen, tyder alt paa, at Isranden imellem dem og navnlig længst imod Nord har staaet betydeligt længere fremme end ved den direkte Forbindelseslinje imellem de to Punkter, og at Isen næsten overalt er naaet helt frem til Gudenaa Dalen. Saa godt som hele det Terrain, der ligger Øst og Syd for Smeltevandsdannelserne, maa nemlig siges landskabelig set at danne et sammenhørende Hele. Det er et stærkt kuperet og meget uregelmæssigt formet Terrain, hvis Udseende fremgaar af Fig. 2 paa Tavle IX. Billedet er taget fra Toppen af Møgelbjerg imod Nordøst; i Baggrunden skimtes den karakteristiske Kontur af Ejer Bavnehøj Partiets nordvestlige Ende med Yding Skov. Det beskrevne Terrain danner et uregelmæssigt kuperet Morænelandskab, som maa tænkes dannet inde under Isens forholdsvis lidet bevægelige Randparti og paa et Sted, hvor der har været tilført en rigelig Mængde Morænemateriale. Der er indenfor dette Omraade ikke nogen som helst Antydning af en Grænselinje, der kunde forbinde de to Punkter af Israndslinjen, og som skulde kunne danne Skellet mellem to Omraader med forskellig Overfladeform. Snarere gør der sig en ubetydelig Forskel gældende mellem det høje Terrain omkring Vorbjerg og det nordøstligere Omraade imellem Vestbirk og Østbirk, et Forhold, der senere skal blive nærmere omtalt, og hvorpaa der kan gives en naturlig Forklaring.

Det eneste, der kunde tyde paa, at Isens Rand skulde have staaet langs med en nogenlunde ret Linje fra Porskær til Sydøst for Øst-

birk, er de allerede tidligere nævnte, spredte Morænegrusforekomster, som i et i Sydvest—Nordøst gaaende Strøg kan følges fra de omtalte Bakker Syd for Østenden af Porskær over Underup og Vorbjerg til Terrainet Nordvest for Nordenden af Torp Sø. Morænegruset er her aflejret i uregelmæssige Forhøjninger og Smaabakker, der gaar op over det høje Parti ved Vorbjerg, og som danner adskillige af dette Terrains højeste Punkter.

For Fuldstændighedens Skyld skal her kortelig meddeles, paa hvilke Steder der er iagttaget Morænegrus. Ca. 500 M. ØNØ. for de i det foregaaende (S. 55) sidst omtalte Morænegrusbakker ligger der i den langstrakte Lavning, der ligesom antyder en Forbindelse mellem Porskær og den store Hansted Lavning, paa det Sted, hvor dens Bund er højest, og umiddelbart Øst for Vejen mellem Nim og Underup en lille, i Øst—Vest langstrakt, lyngklædt Bakke. I dennes Nordside iagttoges normalt Morænegrus i et $\frac{3}{4}$ M. dybt Hul. I Sydsiden var der en lille Grav i Diluvialsand dækket af et ganske tyndt Lag af Morænegrus. — Op ad Skraaningen imod Underup findes der Sand, men oppe paa det 289 Fod (91 M.) høje Ørstbjerg, der ligger ØNØ. for den sidst omtalte Forekomst, træffer man atter Morænegrus. Paa Østsiden af denne Top stikker dog atter noget Diluvialsand frem. — Endvidere bestaar et Par andre Smaatoppe Nord herfor og Syd for Østenden af Underup ligeledes af Morænegrus. — Derefter følger en kort Strækning, hvor Overfladen i Hovedsagen dannes af Moræneler, men paa Møgelbjerg, der er dette Partis højeste Punkt, og som naar 346 Fod (109 M.), træffer man atter Morænegrus. — Ca. 300 M. Nordøst for Møgelbjerg findes ligeledes Morænegrus, der vedbliver et lille Stykke imod Nordøst. — Derefter kommer man til den store, ejendommeligt formede Bakke, paa hvis Nordende Kvægnhøj ligger. Denne Bakke og Terrainet Nordvest for den helt ned til Gudena Dalen bestaar udelukkende af Diluvialsand. Et meget stenet Omraade genfinder man derimod i det lavere Terrain Nordøst for Kvægnhøj; Rigdommen paa store Sten er her meget iøjnefaldende, selv om de nu for største Delen er pillede af Markerne og samlede i store Stendiger.

Som man ser, ligger disse Morænegrusforekomster langs med den sydlige Halvdel af en kun svagt buet Forbindelseslinje mellem de to Punkter af Israndslinjen ved Porskær og Sydøst for Østbirk, og man kunde maaske ved første Øjekast fristes til at antage, at Isranden havde staaet her. Forskellige Forhold synes dog at vise, at dette ikke har været Tilfældet, og at disse Morænegrusbakker ikke angiver nogen Israndslinje. For det første afviger de i Karakteren væsentlig fra den almindelige Randmoræneform, som den kendes fra det sydligere Terrain. De har vel nok endnu som oftest en aflang Form,

men Længderetningen er ikke konstant. Tvært imod optræder de med alle mulige og, som det synes, ganske tilfældige Retninger, og snarere synes de oftere at ligge vinkelret paa end parallelt med Strøgets Længderetning. Dertil kommer, at de omhandlede Morænegrusforekomster ingenlunde danner et sammenhængende Hele, men de ligger spredte i et Terrain, hvor Jordbunden er overordentlig vekslende, og hvor der ikke blot findes Morænegrus og Moræneler, men ogsaa betydelige Mængder af lagdelt Sand. Karakteren af og Jordbundsbeskaffenheden i hele dette Terrain tyder derfor snarere paa, at det er opstaaet inde under Isens yderste Omraade end foran dens Rand, og man ledes derigennem til den samme Betragtningssmaaade, som allerede Studiet af Terrainformerne gav Anledning til.

Søger man nu paa det i det foregaaende omtalte Grundlag at bestemme Grænsen for Isens Udbredelse i dette Terrain, kommer man til Antagelsen af en Israndslinje, hvis Forløb i Enkelthederne er angivet i det nærmest følgende. Lejlighedsvis skal der med det samme blive gjort opmærksom paa en Del Forhold, der ganske vist hver for sig intet beviser, men som dog set under ét taler stærkt for Rigtigheden af de fremsatte Anskuelser.

Isranden maa have staaet tværs over Porskær over til Plovshøj og herfra have bøjet yderligere tilbage omtrent til Vestenden af Underup. Ved det sidstnævnte Punkt begynder nemlig en lille Aflejring af Smeltevandsgrus, der strækker sig ned ad Skraaningen imod Gudena Dalen, og som forneden gaar jævnt over i Dalterrassen. Endvidere bør det nævnes, at der 150 M. Vest for Underup Kirke er iagttaget en Del store, jordfaste Sten stikkende op igennem Overfladen.

Videre nordpaa har Isranden paa en Strækning af ca. 1 Km. haft en Retning imod NNØ. Isen er naaet frem til Trehøje, men har ikke overskredet den omtrent 300 Fod (94 M.) høje Bakke, hvorpaa de ligger. Dennes jævne og regelmæssigt formede Morænelersskraaning ned imod Gudena Dalen danner nemlig en skarp Modsætning til det østligere Terrain og maa nærmest sammenstilles med den Del af Nim Højdepartiet, som ligger udenfor Randmorænerne længere sydpaa. Israndslinjens Højde, der Vest for Underup er ca. 220 Fod (69 M.), gaar ved Trehøje mindst op til 250 Fod (78 M.). Derefter falder den hurtigt, til Israndslinjen Nord for Ringskov Banke naar Gudena Dalen, hvis Terrasse her ligger paa omkring 160 Fod (50 M.) ude i Dalen og som Regel noget højere inde ved Dalsiderne.

Paa hele den følgende Strækning maa Isranden antages at have staaet helt fremme ved Smeltevandsskællingerne, da det kuperede

Morænelandskab strækker sig helt ned til Gudena Dalens Terrasse og ikke engang adskilles fra denne ved en Erosionsskraaning. Højden af Israndslinjen maa derfor paa dette Stykke have været omtrent den samme som Dalterrassens Højde eller ca. 155 Fod (49 M.) i Egnen omkring Vestbirk og lidt højere imod Sydøst, hvor Dalbunden i Østbirk Dalen efterhaanden stiger til omtrent 185 Fod (58 M.).

Paa det første Stykke Nord for Ringskov Banke, har Isranden haft en Retning fra Syd—Nord omtrent op til Spinderiet ved Gudena Nordvest for Vestbirk. Her følger saa en brat Ombøjning, saa at Retningen snart bliver VNV.—ØSØ. og endelig paa den anden Side af Østbirk Nordvest—Sydøst.

Denne Ydergrænse for Isens Udbredelse angiver, at Isranden har buet stærkt frem i det store Dalstrøg NNV. for Vestbirk, hvad der, med Erfaringerne fra det sydligere Terrain for Øje, synes meget naturligt. Men der er et andet Forhold, som ogsaa tyder stærkt paa, at Isen virkelig er trængt et Stykke frem i Dalen, nemlig det bratte, næsten retvinklede Knæk, som Gudena Dalen danner godt $\frac{1}{2}$ Km. ØNØ. for Bredvad Vandmølle, samt den høje, stejle og lidt imod Vest udbuede Erosionsskrænt, der Nord for dette Knæk danner Dalens Vestgrænse; den naturligste Forklaring herpaa synes at være, at det er Isen, der ved sin Fremtrængen her har tvunget det fra de sydligere Egne kommende Smeltevand til at forandre Retning og søge at forlægge sit Løb saa langt imod Vest som muligt — med andre Ord, Isen maa selv have været den direkte Aarsag ikke alene til, at Smeltevandsfloden har bøjet om, men tillige til, at den har eroderet særlig kraftig imod Vest, medens man ellers skulde have ventet at finde Sporene af den stærkeste Erosion umiddelbart nedenfor Ombøjningen paa den modsatte Side af Dalen. For Rigtigheden af den paa Grundlag af Terrainformerne bestemte Udbredelse af Isen taler da tillige den Omstændighed, at den antagne Israndslinje netop naar frem til Gudena Dalen paa det Sted, hvor Dalen knækker, og tillige den iøjnefaldende Parallelitet imellem Israndslinjen og den omtalte, lidt imod Vest udbuede Erosionsskraaning, der danner Dalens Vestside videre nordpaa.

I nøje Overensstemmelse med Antagelsen af, at det er den fremtrængende Is, der har tvunget Smeltevandet ud imod Dalens Vestskraaning, staar ogsaa Udbredelsen af Smeltevandsgruset. Smeltevandsaflejringen indsnævres nemlig her til et kun ca. 700 M. bredt Bælte langs med den nævnte Skraaning, og videre østpaa findes der overalt Moræneler. Saaledes bestaar allerede den flade Søbanke Syd for Spinderiet for største Delen af Moræneler, selv om dens Overflade tildels er dækket af lidt Flyvesand, og kun dens

vestligste Spids, der rager ud imod Gudenaå, dannes af temmelig groft Smeltevandsgrus. Endelig skal det ogsaa allerede her antydes, at Faldet indenfor Smeltevandsaflejringen, som det senere skal blive omtalt, fører til Antagelsen af en saadan Fremtrængen af Isen paa dette Sted.

Angaaende Overfladeformerne langs med den angivne Israndslinje er det allerede sagt, at man ingen Steder træffer voldformede, randmoræneagtige Bakker parallelle med Isranden. Tvært imod er Formerne næsten overalt de samme helt ude ved Israndslinjen som i Terrainet nærmest indenfor, og meget uregelmæssige. Kun i den nærmeste Egn omkring Vestbirk træffer man nogle lidt mere roligt formede Bakkerygge med mellemliggende langstrakte Lavninger. De ligger dog ikke parallelt med Isranden men nærmest vinkelret paa denne, og de har Overfladeformer, som maa formodes at være opstaaede ved Erosion af i Spalter nedstyrtende Smeltevand. Isens Flyden ud i det store Dalstrøg her maa nemlig antages at have begunstiget Dannelsen af et System af „Længdespalter“ i denne lokale, lille Istunge.

Ogsaa hvad Jordbundsforholdene langs med Israndslinjen angaar, er der som Regel ingen Forskel at iagttage ude ved Grænsen og et Stykke indenfor denne. Saaledes findes der længst imod Syd, i Egnen Vest og Nord for Vorbjerg, betydelige Mængder af lagdelt Sand og Grus, medens man omkring Vestbirk træffer Moræneler. Kun langs med Israndslinjen paa begge Sider af Østbirk er der iagttaget noget Morænegrus.

I Terrainet Vest for Østbirk bestaar Jordbunden oppe paa Højderne af Moræneler, og dette strækker sig et Stykke ned ad Skraaningen imod Østbirk Dalen. Forneden bliver denne Skraaning ganske flad og Jordbunden samtidig meget stenet, saa at Smeltevandsdalen imellem Morænelersbakken Hestbjerg og Østbirk imod Syd begrænses af et temmelig fladt, kun lidt over Dalbunden liggende, stenet Bælte. I Jernbanens Grusgrav ved Skæringen mellem Banen og Landevejen Nordvest for Østbirk var der god Lejlighed til at se Profil heri. I den nævnte Grav iagttoges vandret lagdelt Grus, hvori de finere Lag var vel sorterede og førte rullet Materiale, medens de grovere Lag bestod af Morænegrus. Spredt forekom adskillige store Sten, og der fandtes mange isskurede Blokke.

Paa Strækningen Sydøst for Østbirk begrænses den lille Smeltevandsdal ogsaa imod Sydvest af en Erosionsskraaning, og umiddelbart oven over denne træffer man nogle langstrakte Smaabakker, der for en stor Del bestaar af meget stenet Moræneler og Morænegrus, som ofte strækker sig ned ad Dalsiden. Disse Smaabakker, der hæver sig til ca. 50 Fod (16 M.) over Dalbunden, kan opfattes

som en Antydning af en Randmoræne, og interessant er det, at de netop findes paa et Sted, hvor Morænedannelserne adskilles fra Smeltevandsaflejringerne ved en Erosionsskraaning. Dette taler for Rigtigheden af den tidligere fremsatte Formodning om, at Manglen paa Randmoræner i det beskrevne Terrain stod i Forbindelse med, at Isen næsten hele Vejen har staaet ud i de af Smeltevandet gennemstrømmede Dale.

Isens Omformning af det oprindelige Terrain. Betragter man under ét den skildrede Israndslinje uden om Enden af Hansted Lavningen, viser det sig, at man, som det allerede tidligere er antydnet, ogsaa her kan spore Isens Afhængighed af de oprindelige Terrainforhold, selv om der ikke findes lignende smaa Uregelmæssigheder i Israndslinjens Forløb, betingede af kun ubetydelige Højdeforskelligheder, som det er Tilfældet navnlig langs med den sydvestlige Begrænsning af Bygholm Lavningens Istunge.

Dette sidste Forhold turde delvis staa i Forbindelse med, at det er igennem selve den dybe, dalagtige Hansted Lavning, at Hovedmængden af Isen har bevæget sig, og at den kun har udbredt sig over forholdsvis smaa, højere liggende Arealer, medens derimod den Is, der trængte frem igennem Bygholm Lavningen, forefandt et til alle Sider jævnt og svagt stigende Terrain, i hvilket selv smaa Højdedifferenser har kunnet indvirke paa Bevægelsen af det navnlig ud imod Randen kun tynde Isdække.

For en Del skyldes Israndslinjens tilsyneladende mindre Afhængighed af Terrainforholdene dog rimeligvis ogsaa, at noget af det højere Terrain, som nu findes her, ikke eksisterede, da Isen rykkede frem, men efterhaanden er aflejret af den selv. Der tænkes herved paa det stærkt kuperede Parti, som ligger for Enden af Hansted Lavningen eller, nærmere betegnet, imellem denne Lavning og Gudena Dalen, imod Syd begrænset af Lavningen Syd for Underup og imod Nordøst af en Linje omtrent fra Vestbirk over Torp Sø til Hansted Lavningen.

At dette Parti virkelig for største Delen er en forholdsvis ung Dannelse, er der flere Ting, der tyder paa. For det første adskiller det sig ved sine stærkt vekslende og uregelmæssige Jordbundsforhold og den rigelige Forekomst af fluvioglacialt Sand og Grus fra det paa begge Sider af Hansted Lavningen liggende Terrain, der hovedsagelig bestaar af Moræneler. Herved og ved sin urolige Overfladeform gør det, som allerede tidligere antydnet, Indtrykket af at være en Dannelse, der er skubbet sammen inde under Isens Randparti, og Beliggenheden lige for Enden af Hansted Lavningen stemmer ogsaa

godt med denne Antagelse. Man maa nemlig gaa ud fra, at denne store og dybe Lavning ikke blot har begunstiget en stærk Isbevægelse ud til det her betragtede Terrain, men dermed ogsaa betinget en rigeligere Tilførsel af medslæbt Materiale, netop til dette Punkt. I Modsætning hertil maa man antage, at Isen paa begge Sider af Hansted Lavningen og videre fremme mellem Østbirk og Vestbirk kun har aflejret meget lidt, og at dens Virksomhed her i Hovedsagen har været indskrænket til at give Terrainet dets karakteristiske, kuperede Overflade, medens det væsentlige, saavel hvad Højdeforholdene som hvad Jordbundsbeskaffenheden angaar, maa være betinget af, at Isen ved sin Fremrykning forefandt et Terrain opbygget af Moræneler og med i det hele og store den samme Højdebelighed i Forhold til Omgivelserne som i Nutiden.

Men der er tillige et andet Forhold, som endnu tydeligere synes at vise, at Partiet for Enden af Hansted Lavningen er af forholdsvis ung Alder. Som det skal blive vist under Omtalen af Smeltevandsdannelserne, maa man gaa ud fra, at man i den store og brede Del af Gudena Dalen, som fra Vestbirk strækker sig imod NNV., har et Dalstrøg, der er ældre end de her betragtede Israndsdannelser og det Stykke af Gudena Dalen, der ligger ovenfor Vestbirk. Den Tanke, at dette store Dalstrøg tidligere skulde have endt blindt her, forekommer allerede paa Forhaaad usandsynlig. Naar man saa tillige ser, at der i Forlængelse af Dalen og kun adskilt fra den ved et smalt Højdedrag findes en anden, dyb, dalagtig Lavning — nemlig Hansted Lavningen — som ogsaa maa antages at være ældre end den her betragtede Is, og som staar i umiddelbar Forbindelse med Horsens Fjord, synes det utvivlsomt, at de to Dalstykker oprindelig har været sammenhængende, og at den Barriere, der nu adskiller dem, maa være yngre.

Skulde man paa Grundlag af Jordbundsforholdene og Terrainformerne forsøge at angive de tidligere Grænser for denne Dal paa det Sted, hvor den nu overskæres af et Højdedrag, maatte disse Grænser omtrent antages at have følgende Forløb. Imod Nordøst har Dalen rimeligvis gaaet til en Linje fra Vestbirk over Torp Sø til Hansted Lavningens Nordøstskraaning. Denne Linje følger et nuværende, lavere liggende Strøg og danner, som ovenfor nævnt, Grænsen mellem det uregelmæssige og temmelig sandede Parti for Enden af Hansted Lavningen og det mere ensartede Morænelers-omraade Nordøst for Lavningen. Den modsatte Dalside maa antages at have forladt den nuværende Gudena Dal omtrent ved Ringskov Banke og fortsat sig gennem Østenden af Underup til den sydvestlige Skraaning af Hansted Lavningen. Denne sidste Linje danner dog kun delvis Grænsen for det uregelmæssige og sandede Terrain, eftersom dette ved Underup gaar lidt udenfor den, et Forhold, som

dog ingen Betydning har, da Isen selvfølgelig ogsaa kan have aflejtret udenfor det gamle Dalstrøg og navnlig paa det nævnte Sted, hvor Dalen har begyndt at svinge imod Nord.

4. Isen i Egnen Nord for Horsens.

I de foregaaende Afsnit er det skildret, hvorledes den store Isstrøm, der skød sig ind igennem Horsens Fjord, imod Vest har delt sig i to Istunger, om hvis Begrænsning Studiet af det paagældende Terrain kunde give endog temmelig detaillerede Oplysninger. Vil man derefter forsøge at bestemme Grænsen for Horsens Fjord Gletscherens Udbredelse imod Nord, viser det sig desværre, at denne Del af Opgaven byder betydeligt større Vanskeligheder. Ingen Steder træffer man tydelige Randmorænedannelser, og Manglen herpaa er saa meget mere følelig, som der i denne Egn heller ikke findes Smeltevandsaflejringer, der kan give Oplysninger om Israndens tidligere Beliggenhed.

Naar der i det følgende er angivet en Israndslinje, der betegner Horsens Fjord Gletscherens Nordgrænse, er det dog ikke en helt hypotetisk Linje, idet der til Trods for Manglen paa egentlige Israndsdannelser er flere Ting, som kan give Oplysninger om Isens tidligere Udbredelse.

Israndslinjens omtrentlige Forløb, eller maaske rettere det, at Isranden endnu paa en Strækning har fortsat sig i østlig Retning, fremgaar af, at der i Egnen Syd og Øst for Skanderborg Sø findes Randmorænedannelser, som af Grunde, der skal blive udviklede i et senere Kapitel, maa opfattes som samtidige med de foran skildrede Israndsaflejringer. Den søgte Israndslinje maa derfor danne Forbindelsen imellem disse adskilte Morænepartier, og man ledes derved til at antage, at Isranden har staaet omtrent i VSV.—ØNØ. fra Smeltevandsdalen Sydøst for Østbirk til Egnen Syd for Hylke Station.

Indenfor det Omraade, hvor man ifølge dette Raisonnement maa søge Fortsættelsen af Israndslinjen, kan Terrainformerne og Jordbundsforholdene give yderligere Oplysninger om forskellige Enkeltheder. Man kommer ved et nøjere Studium navnlig af Overfladeformerne til Antagelsen af den i det følgende skildrede Israndslinje, som betegner en Grænse imellem to Omraader, af hvilken det, der ligger bagved Linjen, har en uroligere og mere regelløs Karakter end det, der ligger imod Nord og Nordvest.

Det første, der saaledes falder i Øjnene, naar man undersøger Overfladeformerne i det her betragtede Terrain, er den store Forskel imellem Ejer Bavnehøj Partiet og det Øst derfor liggende Elbjerg

Højdeparti. De store, rolige og afrundede Former paa de langstrakte Bakkerygge, der strækker sig fra Ejer Bavnehøj først imod Nordvest og senere imod Nord, og som udgør Danmarks højest liggende Egn, samt de ganske lignende Overfladeformer paa Højdepartiets Skraaning imod Nordøst ned imod Skanderborg Sø danner en skarp Mod-sætning til det smaatoppede, urolige og fuldstændig uregelmæssige Terrain, der strækker sig fra Tepstrup hen over Elbjerg Højdepartiets Top. Gaaende ud fra det nævnte Princip maa man slutte, at Isen har overskredet selv de højeste Dele af Elbjerg Højdepartiet og er trængt frem i den Vest for liggende Tepstrup Lavning. Derimod er den paa Ejer Bavnehøj kun naaet et Stykke op ad Sydskraaning og har støttet sig til den, men har ikke formaaet at overskride denne mægtige Bakkeknude. Den søgte Israndslinje maa derfor antages at gaa fra den øverste Ende af Østbirk Dalen imod ØNØ., Syd om Ejer Bavnehøj, forbi Ris og et Stykke norden om Tepstrup, for derefter at bøje lidt tilbage henimod Eggen nærmest Syd for Hylke Station.

I et stærkt kuperet Terrain som det foreliggende kan denne Metode til Bestemmelse af Isens Udbredelse naturligvis ikke gøre Fordring paa at være absolut nøjagtig, og den angivne Israndslinje bør derfor ikke betragtes som mere end omtrentlig. Endvidere skal det fremhæves, at denne Israndslinje kun kan opfattes som den yderste Grænse, hvortil Isen til Tider er naaet frem, og indenfor hvilken Isranden godt kan have bevæget sig frem og tilbage. Hele det her omhandlede Terrain ligger nemlig meget højt, og ogsaa et stort Stykke bagved Israndslinjen er Landets Højde betydelig, saa at den Is, der er trængt frem her, kun kan have haft en forholdsvis ringe Mægtighed og maa antages at have været særlig følsom for Variationer i Istilførslen og Afsmeltningen. Man staar sandsynligvis her overfor Aarsagerne til, at der i dette Terrain ingen egentlige Randmoræner findes.

Israndslinjen paa Ejer Bavnehøj Partiets Sydside. Gaar man fra den øverste Ende af Østbirk Dalen imod Nordøst op imod de høje Bakker omkring Ejer, passerer man først et temmelig fladt Terrain, der ligger paa omtrent 250 Fods (78 M.) Højde, og som begrænser Smeltevandsdalen imod Nordøst. Det har en Bredde af ca. $1\frac{1}{2}$ Km. Derefter følger en stærk Stigning op ad en Skraaning paa ca. 150 Fods (47 M.) Højde til et igen noget fladere Omraade, hvis højeste Punkter ligger paa omkring 400 Fod (126 M.). Godt 1 Km. længere fremme kommer man atter til en stejl Skraaning af noget over 100 Fods (31 M.) Højde, og først naar man er naaet op ad den, staar man oppe paa det øverste af Ejer Bavnehøj Partiet.

Denne trinvis Stigen af Terrainet maa have indvirket paa Israndslinjens Form. Den øverste Skraaning er ganske vist ikke bleven overskredet af Isen; men denne er dog Syd for Ejer Bavnehøj naaet et Stykke op ad Bakken, som her har stanset Isbevægelsen, og man maa derfor antage, at Isranden paa dette Sted har bøjet lidt tilbage. En lignende Tilbagebøjning maa ogsaa den nederste bratte Skraaning have givet Anledning til, saaledes at Israndslinjen op ad den har faaet en mere vest-østlig Retning og paa det første Stykke ovenfor en Retning mere i Sydvest—Nordøst.

I Overensstemmelse hermed er den sandsynlige Ydergrænse for Isens Udbredelse konstrueret.

Ved den øverste Ende af Østbirk Dalen bøjer Israndslinjen brat om med en Vinkel paa 90° , idet Isranden, som Sydvest for Dalen stod langs med denne, maa have staaet tværs over Smeltevandsdalen paa det Sted, hvor den flade Dalbund hører op. Denne Retning fra Sydvest til Nordøst kan Isranden endnu dog kun have haft paa en kort Strækning. Dér, hvor Terrainet begynder at stige nedenfor Trampenbjerg, har Isranden som nævnt sandsynligvis ogsaa begyndt at bøje tilbage, saa at den har staaet op ad den omtalte Skraaning med en Retning i Vest—Øst. Oppe paa det fladere Terrain VNV. for Elling maa Israndslinjen atter antages at bue noget fremad og naa det stejle, sydlige Affald af Bakkerne omkring Ejer paa det Sted, hvor Vejen fra Ejer sydpaa kommer ned ad Skraaningens. Herfra maa Fortsættelsen saa rimeligvis atter søges i mere østlig Retning langs med Sydsiden af det stejle Møgelbjerg og videre omtrentlig til Bøllebjerg, Øst for Ris.

Højden af den her skitserede Israndslinje er meget forskellig, idet den, som man allerede vil have forstaaet af det foregaaende, stiger betydeligt fra Vest til Øst. Medens Dalbunden i Smeltevandsdalen Sydøst for Østbirk ikke er højere end knap 185 Fod (58 M.), ligger Israndslinjen straks Nordøst herfor paa ca. 250 Fod (78 M.), og op ad Skraaningens Syd for Trampenbjerg stiger den hurtigt til omtrent 400 Fod (126 M.). Hvor højt Isen er naaet op ad Skraaningens Syd for Ejer Bavnehøj lader sig ikke fastslaa med Sikkerhed, men det er næppe urimeligt at antage, at den paa Sydsiden af Møgelbjerg er gaaet op til mindst 450 Fod (141 M.) og Øst herfor endog til henimod 500 Fod (157 M.). Israndslinjen gaar derefter om paa den nordlige Side af det Højdedrag, der adskiller Horsens Fjord Lavningen fra det Bassin, hvori Skanderborg Sø ligger, og dens Højde aftager derfor atter.

Langs med den Del af Isranden, der har staaet Syd om Ejer Bavnehøj Partiet, findes ingen Antydning af voldformede Randmoræner, og heller ikke Jordbundsforholdene giver særlig fyldige Oplys-

ninger om Israndens tidligere Beliggenhed. Dette sidste hænger vel delvis sammen med, at Isranden paa en Del af den skildrede Strækning har krydset stejle Skraaninger, hvor Betingelserne for Aflejring af Materiale ikke har været gunstige, og hvor man derfor snarere kan vente at træffe den oprindelige Jordbund end Aflejringer hidrørende fra denne sidste Is. Rimeligst var det maaske at søge saadanne Dannelser paa de fladere Omraader nedenfor Skraaningerne, og i Virkeligheden træffer man ved Foden af begge de omtalte Skraaninger grusede og stærkt stenede Strækninger, medens der i selve de stejle Skrænter paa flere Steder stikker ældre fluvioglaciale Dannelser — Sand og Grus — frem.

Bagved den vestligste Del af den skildrede Israndslinje og nedenfor Skraaningen imellem Over Monbjerg og Brokbjerg findes saaledes et udpræget gruset Omraade, hvis Dannelse dog for den sydlige og navnlig for den vestligste Dels Vedkommende allerede paa Grund af Beliggenheden lige bagved Østbirk Dalen maa sættes i Forbindelse med det her fremstrømmende, subglaciale Smeltevand. Hele det nævnte Terrain, saa langt sydpaa som til Mosen umiddelbart Nord for Urup, er overalt gruset, og kun enkelte Steder er der truffet lidt Moræneler. Længst imod Vest, henimod Smeltevandsdalen, er Materialet sorteret og bestaar af rullet Grus og lagdelt Sand. Kun et enkelt Sted er der her iagttaget lidt Morænegrus, nemlig i en $1\frac{1}{2}$ M. dyb Grav ved Landevejen 400 M. NNV. for Kokhus Gaard. Her saas Morænegrus med Partier af vandret lagdelt Sand og rullet Grus, som var finere end Morænegruset. At dette Morænegrus dog ikke har nogen stor Udbredelse ses af, at der ikke mere end godt 100 M. VNV. herfor findes en Grav i lagdelt Sand, der kun indeholder enkelte Grusstriber med indtil decimeterstore, afrullede Sten.

Længere imod Øst eller ØSØ. bliver Gruset grovere og begynder at vise Overgang til Morænegrus. Langs med Nordsiden af Jernbanen og ret Nord for Urup findes en stor, nu forladt Grusgrav. Graven var tilskreden og noget bevokset; det kunde dog ses, at Materialet var temmelig sorteret, selv om det for en Del maa opfattes som en Moræneaflejring. I Graven laa adskillige store Sten paa indtil 1 M., og de mange store Stenhegn langs Markerne omkring Graven vidner ogsaa om Rigdommen paa store Sten. Man staar her sandsynligvis overfor en lignende Dannelse som i Jernbanegrusgraven Nordvest for Østbirk. — I et lille Hul straks Nordvest for denne Grav og ligeledes umiddelbart ved Jernbanen iagttoges ogsaa lidt Grus, der nærmest maa opfattes som Morænegrus med rullet Materiale. Der fandtes heri enkelte Sten paa indtil $\frac{1}{2}$ M.

Hele dette Strøg, der ligger bagved og i Forlængelse af Smeltevandsdalen ved Østbirk, og som bestaar af Grus, der henimod Dalen

bliver mere og mere afrullet og sorteret, maa tænkes dannet under Medvirkning af det subglaciale Smeltevand, der har begyndt at aflejre noget af sit medbragte Materiale, allerede inden det forlod Isen for at gennemløbe Østbirk Dalen. Hermed stemmer ogsaa de her optrædende, langstrakte Overfladeformer, hvis Retning peger henimod Smeltevandsdalen.

Nord for dette Omraade og umiddelbart nedenfor den stejle Skraaning bliver Overfladen derimod ganske uregelmæssigt formet, medens Jordbunden stadig er meget rig paa Sten. Ganske usædvanlig stenet er der saaledes ved Skolen Syd for Neder Monbjerg og i Markerne Nord herfor. Paa dette Sted findes dog ingen store Sten, og Materialet gør et afrullet Indtryk; men gaar man herfra østpaa til Sydsiden af Brokbjerg, kommer man over et Terrain, hvor Jordbunden bestaar af normalt Morænegrus med mange store Sten, og hvor Morænegruset endog paa Steder er stærkt leret.

Ogsaa nedenfor den øverste af de to stejle Skraaninger og umiddelbart bagved den angivne Israndslinje træffer man i det flade Terrain Nordvest for Elling et udpræget stenet Omraade, hvor Jordbunden ganske overvejende bestaar af Morænegrus. Og videre østpaa findes nedenfor Skraaningen endnu paa et Stykke spredte Forekomster af Morænegrus. Denne Jordart er saaledes iagttaget pletvis i Markerne NNØ. for Elling samt Sydøst for Østergaard, der ligger omtrent midt imellem Elling og Ovsted Kirke.

Israndslinjen paa Elbjerg Højdepartiets Nordside. Omtrent ved Landsbyen Ris, Øst for Ejer Bavnehøj, maa man som allerede tidligere nævnt antage, at Isranden har passeret Ryggen af det Højdedrag, der adskiller Horsens Fjord Lavningen fra det Bassin, hvori Skanderborg Sø ligger. Fra dette Punkt maa Israndslinjen fortsætte sig imod ØNØ., saaledes at den passerer Sydøst om Tammestrup og ca. 1 Km. Nord for Tepstrup. Derefter bliver Retningen Vest—Øst til henimod Hylke Station, hvor Isranden maa antages at have bøjet endnu en lille Smule mere tilbage for under en spids Vinkel at støde sammen med Randen af den Is, der efter at have overskredet det temmelig høje Terrain Vest for Odder trængte frem i den store Lavning Sydøst for Skanderborg Sø, og hvis Ydergrænse angives af den pragtfulde Morænevold, som strækker sig fra Hylke Station i nordlig Retning.

Højden af denne Del af Israndslinjen er ifølge Sagens Natur størst dér, hvor Isranden har passeret Ryggen af Højdedraget, nemlig ved Landsbyen Ris. Paa dette Sted maa den have naaet op til over 450 Fod (141 M.). Derefter aftager Højden, saa at den NNV. for Tepstrup

kun er lidt over 300 Fod (94 M.); men hen over Nordenden af Elbjerg Højdepartiet stiger Israndslinjen atter lidt, nemlig til ca. 350 Fod (110 M.), for saa paa det sidste Stykke at falde jævnt, til den paa ca. 250 Fods (78 M.) Højde møder Hylke Morænen.

Den angivne Israndslinje betegner, som allerede tidligere nævnt, en Grænse mellem to Omraader med væsentlig forskellig Overfladeform, idet Ejer Bavnehøj Partiets rolige Former fortsætter sig imod Øst paa den lavere liggende Del af Elbjerg Højdepartiets Skraaning ned imod Skanderborg Sø, medens det nævnte Højdepartis højest liggende Del derimod karakteriseres ved en meget uroligt og uregelmæssigt formet Overflade. Men ogsaa Jordbundsforholdene synes at tale til Gunst for den fremsatte Anskuelse, idet der flere Steder, navnlig langs med den østlige Del af den angivne Israndslinje, atter begynder at optræde Morænegrus, hvis Aflejring maa sættes i Forbindelse med Israndens Ophold i denne Egn, og det samme er maaske Tilfældet med den forholdsvis store Mængde rullet Grus, der findes i Bakkerne Nord for Tepstrup.

Morænegrus er saaledes iagttaget omtrent 2 Km. Nordøst for Tepstrup i den i Vest—Øst langstrakte, randmoræneagtige Bakke, hvorpaa Brørup Mølle ligger. Øst for Møllen var der en større Grav, hvori dog kun Østvæggen var fri for Bevoksning. Her saas $1\frac{1}{2}$ M. Morænegrus, der nedad gik over i rullet Grus, som forneden indeholdt noget Sand. Profilhøjden var paa dette Sted 3 M.; lidt sydligere, hvor Væggen dog var ganske tilskreden, var Højden endnu større. Adskillige store Sten paa indtil $\frac{3}{4}$ M. laa løse i Graven. — Omtrent 300 M. VNV. for denne Grav fandtes der en lille, ogsaa i Vest—Øst langstrakt Forhøjning i Terrainet. Den var halvt afgravet, saa at der kunde ses et Længdesnit i den. Her var under ca. $\frac{1}{4}$ M. Muld blottet indtil 1 M. temmelig groft Grus og Sand, fuldstændig uregelmæssigt sammenæltet, saa at det hele nærmest maa opfattes som Morænegrus med rullet Materiale.

Et andet og mere betydeligt Morænegrusomraade strækker sig fra Egnen nærmest Vest for Hylke Station imod SSØ. forbi Landsbyen Ustrup. Morænegruset optræder dog ikke her i voldformede Bakker, men danner den jævne Overflade af den $1\frac{1}{2}$ Km. lange og $\frac{1}{2}$ Km. brede, i NNW.—SSØ. langstrakte, ganske flade Bakke, hvorpaa Ustrup ligger. Baade Formen og Længdeudstrækningen af dette stærkt stenede Strøg udelukker, at det er nogen egentlig Randmorænedannelse; det bør snarere opfattes som en Slags „interlobat“ Moræne. Da Hylke Morænen løber ind og støtter sig til dette Partis Østside, maa det dog antages nærmest at høre til den her betragtede Del af Isen og at være afsat inde under den Del af den, der her stødte sammen med Isen i Lavningen Sydøst for Skanderborg Sø.

Dette Morænegrusomraade er mest iøjnefaldende i den nærmeste Omegn omkring Ustrup, hvor en Del store Stenhegn røber Jordbundens usædvanlige Rigdom paa store Sten. Her er dog kun set et enkelt og endog temmelig daarligt Profil. I en tilgroet Grav 800 M. SSV. for Hylke Station iagttoges i Østvæggen noget Moræneler og i dens Nordende Morænegrus. I Gravens Nordøsthjørne stod lidt Diluvialsand, medens der i den helt bevoksede Sydside atter syntes at findes Morænegrus. Syd for Graven var der paa et lille Stykke en meget stenet Overflade med adskillige store, jordfaste Sten, hvoraf en enkelt var paa $1\frac{1}{2}$ M.

Sydpaa kan Morænegruset følges til en lille, voldformet Udløber imod SSØ. fra den omtalte ganske flade Bakke. Der er her ca. 1 Km. Syd for Ustrup iagttaget et mindre, indtil 2 M. højt Profil i groft Morænegrus med mange store Sten. Materialet imellem Stenene var her temmelig sorteret. — Lige Syd for dette Profil var der en stor, smuk Grav, hvori der foroven stod Morænegrus af vekslende Mægtighed; paa flere Steder gik dette over til Moræneler. Derunder saas indtil 3 M. Sand med vandrette og stærkt hældende Lag.

Imod Nord synes Morænegrusomraadet ikke at være skarpt begrænset, men snarere at gaa jævnt over i rullet Grus, der vedbliver nordpaa udenfor Hylke Morænen, og som sandsynligvis er afsat af lokalt Smeltevand, der herfra er løbet ned til Skanderborg Sø Lavningen. Saa langt nordpaa som til Smaatoppene VSV. for Hylke Station har man dog endnu normalt Morænegrus, men i en Grav 300 M. Vest for Stationen saas ca. $1\frac{1}{2}$ M. Grus med vel rullet Materiale og en Antydning af vandret Lagdeling. Gruset indeholdt ikke faa decimeterstore Sten, der sad i alle mulige Stillinger, saa det maa dog opfattes som en Dannelse, der staar paa Overgangen mellem Morænegrus og rullet Grus.

Isens Udbredelse over Elbjerg Højdepartiet og derved betingede Dannelser. Betragter man Formen af den sidst skildrede Del af Israndslinjen, vil man lægge Mærke til, at den danner en flad Bue fremad imod Nord og det til Trods for, at Isen ikke paa dette Sted har staaet frem i nogen Lavning, men tvært imod har overskredet det temmelig høje Elbjerg Højdeparti. Naar man erindrer den iøjnefaldende Afhængighed af Højdeforholdene, som hele den tidligere skildrede Del af Israndslinjen udviste, kunde dette Forhold maaske ved første Øjekast synes at tale imod den angivne Begrænsning af Isen. Men ser man nærmere til, stiller Sagen sig noget anderledes. Efter ved Ris at have passeret Højderyggen bøjer Israndslinjen naturligt noget udad, hvad der er saa meget mere Grund til, som det

følgende Stykke af den ligger foran det laveste Parti ved Tepstrup; men derefter buer den atter tilbage og antager efterhaanden en Retning, der nærmer sig stærkt til Isens Hovedbevægelsesretning, i denne Egn fra ØSØ.—VNV. Man maa tænke sig, at Isbevægelsen her i Hovedsagen er gaaet langs med Sydsiden af Elbjerg Højdepartiet henimod Tepstrup Lavningen, og at den radiære Istransport op over Højdepartiet, ud imod Isranden paa dettes Nordside, kun har været relativt ringe. Med andre Ord: den svagt imod Nord udbuede Del af Israndslinjen imellem Ris og Hylke bør opfattes, ikke som en *hel* Bue, der har begrænset Isen vinkelret paa dens Bevægelsesretning, men som den nordlige, stærkt tilbagebøjede Del af en imod VNV. rettet Bue, hvis sydlige Dele mangler, fordi Terrainet dér var lavere, saa at Isen har kunnet flyde endnu længere frem Syd om Ejer Bavnehøj Partiet.

Naar Isen, til Trods for at dens Bevægelse i Hovedsagen gik fra ØSØ.—VNV., har formaaet at brede sig ud til Siden og overskride Elbjerg Højdepartiet, skyldes dette sikkert ogsaa for en Del den Omstændighed, at den gennem Horsens Fjord Lavningen kommende Istrøm her for første Gang traf isfrit Terrain imod Nord, medens den længere østpaa stødte sammen med den Is, der fra Odder Egnen trængte frem imod Lavningen Sydøst for Skanderborg Sø. For det første kan Trykket af denne Ismasse imod Horsens Fjord Gletscheren have bevirket, at denne sidste var forholdsvis tilbøjelig til at flyde ud til Siden paa det første Sted, hvor der var Lejlighed dertil. For det andet maa det erindres, at selv om Elbjerg Højdepartiet nu fremtræder som en forholdsvis højtliggende Del af Bakkedraget imellem Skanderborg Sø og Horsens Fjord, saa har dette Sted dog dengang været det laveste, idet der østpaa laa den nævnte, mægtige Ismasse og imod Vest det store Ejer Bavnehøj Parti. Paa den anden Side har maaske Elbjerg Højdepartiet og dets noget lavere Fortsættelse imod ØSØ. over Møgelbjerg dog været en saa væsentlig Hindring for Isbevægelsen, at man her har Grunden til, at Isen ikke, efter at have overskredet Elbjerg Højdepartiet, har bredt sig videre nordpaa ned imod Skanderborg Sø, men at der er fremkommet den spidse, indadgaaende Vinkel paa Israndslinjen ved Hylke.

Til Slutning skal der endelig gøres opmærksom paa en Terrainform, hvis Dannelse synes at kunne forklares gennem Antagelsen af den skildrede Israndslinje, og som derved kunde give en yderligere Bekræftelse paa de fremsatte Anskuelser. Der sigtes herved til de ejendommelige, skarptskaarne, smalle, næsten retlinjede Kløfter, der uden Hensyn til Højdeforholdene gennemskærer selv de højest liggende Dele af Elbjerg Højdepartiet, og som er bundne til dette Højdeparti og dets nærmeste Omgivelser bagved Israndslinjen.

Retningen af disse Kløfter er noget varierende fra Sted til Sted, men dog altid temmelig nær Nord—Syd. I Terrainet Nordøst og Øst for Tepstrup træffer man saaledes tre mere eller mindre udprægede, i NNV.—SSØ. gaaende, smalle Rende, af hvilke navnlig den østligste er smukt udviklet. Syd for Brørup findes et Par Antydninger af lignende Kløfter med Retningerne N. t. V.—S. t. Ø. og NNØ.—SSV. De største og smukkeste af de herhen hørende Dannelser træffer man umiddelbart Øst for Elbjerg. Der findes her to imod Syd sammenløbende Kløfter, en mindre i Nord—Syd rettet og en $1\frac{1}{2}$ Km. lang og indtil omtrent 100 Fod (31 M.) dyb, ganske smal Rende med Retningen NNØ.—SSV. I Terrainet videre østpaa træffer man flere mindre Kløfter af samme Type og alle med en Retning, der er meget nær Nord—Syd, saaledes en ganske lille ca. 1 Km. Nordøst for Tepstrup Gaard, en SSØ. for Ustrup, en Vest og en umiddelbart Øst for Banelinjen 2 Km. Nord for Hovedgaard Station. Endelig bør maaske ogsaa en i Sydvest—Nordøst gaaende Kløft Syd for Grumstrup henregnes til disse Dannelser.

Det bør bemærkes, at disse ejendommelige Kløfter synes bundne til den her betragtede Del af Horsens Fjord Gletscheren. De findes nemlig indenfor den angivne Israndslinje og Sydvest for den Linje, der maa antages at danne Grænsen mellem de to store Isstrømme, Horsens Fjord Gletscheren og Isen i Lavningen Sydøst for Skanderborg Sø, eller de overskrider kun ubetydeligt denne Grænselinje, der maa trækkes fra Hylke Morænen, Øst om Ustrup og videre gennem Sydsiden af Grumstrup.

At de omtalte Kløfter ikke er dannede ved normal Erosion fremgaar af, at Bunden i dem i Reglen indtages af en Række langstrakte, ofte tørvefyldte, Smaahuller uden Afløb. Særlig smukt ses dette i en over 1 Km. lang Kløft $1\frac{1}{2}$ Km. Øst for Tepstrup. Dette Forhold leder Tanken hen paa subglacial Erosion, og ved at betragte Fordelingen og Retningen af Kløfterne synes den Mulighed nærliggende, at de er udskaarne af Smeltevand, som er styrtet ned i Gletscher-spalter. Thi i Virkeligheden har man her et Sted, hvor der sandsynligvis maa have dannet sig Spalter i Isen, idet denne har kunnet flyde nogenlunde uhindret ud imod Nord uden at blive presset af et nordfor liggende Isdække, saaledes som længere østpaa, eller blive standset af et mægtigt Højdeparti, som imod Vest. Den her fremtrængende Is maa have været underkastet lignende Betingelser som en Gletscher, der skyder sig ud i en bred Dal, og der kan have dannet sig et System af radiære „Længdespalter“ med en Beliggenhed svarende til de ejendommelige Kløfter, man nu finder i Elbjerg Højdepartiet. Den Omstændighed, at der midt i dette „lavere Sted“ imellem Ejer Bavnehøj Partiet og den østligere liggende Is fandtes en Bakkeknude, eller

med andre Ord, at Bunden i denne „Lavning“ hvælvende opad og ikke som normalt nedad, har rimeligvis ogsaa været medvirkende til, at den her fremtrængende Is var tilbøjelig til at danne Spalter.

De ovenfor skildrede Kløfter, som gennemskærer Toppen af Elbjerg Højdepartiet, maa ikke forveksles med nogle smaa Erosionsrender, der findes paa Skraaningen ned imod Skanderborg Sø, og som maa antages at være dannede af smaa Smeltevandsbække, der fra Isranden søgte ned til Lavningen. At de er udskaarne paa det her betragtede Tidspunkt turde nemlig fremgaa af, at de ikke fortsætter sig længere nedad end til ca. 160 Fod (50 M.), der er den omtrentlige Højde af Grusterrasserne omkring Skanderborg Sø. Endelig bør det ogsaa nævnes, at heller ikke de forgrenede Kløfter, der munder ud i den sydlige Ende af den store Lavning Sydøst for Skanderborg Sø, kan sættes i Forbindelse med Gletscherspalter, men at de maa tænkes dannede i postglacial Tid ved normal Erosion udgaaende fra den nævnte Lavning.

En lignende Oprindelse som for de smalle Kløfter i Elbjerg Højdepartiet maa man derimod antage for den store, langstrakte Tepstrup Sø og den 1 Km. Vest derfor liggende, ganske tilsvarende, tørvefyldte Lavning Syd for Ovsted Kirke. Det drejer sig dog her snarere om „Randspalter“ opstaaede ved en i Øst—Vest rettet Spænding i Isen paa Grund af dennes forholdsvis lette Bevægelse imod Vest, Syd om Ejder Bavnehøj Partiet. Tilsvarende, men mindre Dannelser har man sandsynligvis i en lille Kløft tværs igennem Bakkerne $\frac{1}{2}$ Km. Øst for Ovsted Kirke samt i en lignende Dannelse længere vestpaa, fra Vestsiden af Brokbjerg imod Nord.

C. Smeltevandsdannelser.

Medens der i det foregaaende Afsnit er givet en Skildring af de Morænedannelser, der er afsatte langs med Randen af den store Horsens Fjord Gletscher, skal der i det følgende blive gjort Rede for de interessante Smeltevandsdannelser, som knytter sig til denne Is.

Hovedtrækkene i Fordelingen af de forskellige Smeltevandsaflejringer er allerede skitserede i den tidligere givne Oversigt. Man vil derfra vide, at alle Tilløbene fra de forskellige Punkter af Isranden samlede sig til et stort Vandløb, som søgte sig Vej nordpaa udenom Horsens Fjord Gletscheren. Betinget af de forhaandenværende Terrainforhold og Isspærringerne paa de forskellige Steder fik Smeltevandsfloden et udpræget zig-zagformet Løb, hvis forskellige Dele

karakteriseres ved forskellige Retninger og ogsaa i andre Henseender adskiller sig indbyrdes. Herved falder Smeltevandsdannelserne i denne Egn naturligt i følgende fire Dele: 1) et i Hovedsagen i Syd—Nord gaaende Smeltevandsomraade udenfor Bjerge Herred Isen, 2) en Forbindelsesdal i Sydøst—Nordvest herfra til Gudena Dalen, 3) denne Dal imellem Aale og Vestbirk, hvor dens Retning er Sydvest—Nordøst og 4) den samme Dals Fortsættelse fra Vestbirk imod NNV.

1. Smeltevandet fra Bjerge Herred Isen.

I Overensstemmelse med det Princip, som er fulgt for Moræneaflejringerens Vedkommende, vil det være naturligt at begynde Beskrivelsen af Smeltevandsdannelserne med en Redegørelse for Forholdene i den sydligste Del af Terrainet og derefter at følge Smeltevandsfloden paa dens videre Vej imod Nord. Dette er der saa meget mere Grund til, som Udgangspunktet paa denne Maade bliver den sydligste Egn, hvorfra Gudena under sin Udviklingsperiode i den senglaciale Tid har modtaget Tilløb, nemlig Engom Dalen og Løsning Hedesletten, hvorfra dette Danmarks længste Vandløb saaledes maa siges at have haft sit oprindelige Udspring.

Engom Dalen. Hvad først denne Dal angaar, da er dens sydligste Del bleven udførligt omtalt allerede under Beskrivelsen af Israndens Stilling i denne Egn; der skal derfor her kun tilføjes nogle Oplysninger om dens nordligere Del. Med en Bredde af gennemsnitlig godt $\frac{1}{2}$ Km. og med en Længde af 3 Km. gennemskærer den det højere liggende Morænelersterrain, der imod Syd og Vest omgiver den sydligste Del af Løsning Hedesletten. Hele Vejen begrænses Dalen af tydelige, indtil 50 Fod (16 M.) høje, Erosionsskraaninger, der sammen med den smukke, flade Dalbund giver Dalstrøget dets udprægede Karakter af en Smeltevandsdal. Tavle X, Fig. 1 viser dette; Billedet er taget fra Dalens Vestsides tværs over den og umiddelbart Nord for Engom.

Fra Engom strækker Dalen sig først imod Nordvest, men drejer lige Nord for Hovedlandevejen imod NNØ. for at munde ud i det sydvestlige Hjørne af Hedesletten. Dalbundens Højde er ved Engom 220 Fod (69 M.), lidt derover ud imod Siderne, og den holder sig uforandret det første Stykke imod Nordvest omtrent til Hovedlandevejen. Derefter antager Dalbunden et Fald nordpaa af omtrent 1:500, saa at dens Højde ved Munden er 210 Fod (66 M.). Dalbunden synes overalt at bestaa af Grus, men Profiler heri har der

ikke været Lejlighed til at se. Kun i en tilskreden og tildels bevokset Grav lige Nord for Hovedlandevejen og midt i Dalen kunde der forneden iagttages rullet Grus med indtil decimeterstore Sten. Materialet synes altsaa her at være noget finere end i det moræneagtige Grus ved Engom.

Løsning Hedesletten. Vandet fra Engom Dalen har forenet sig med Smeltevandets fra den nordligere Del af Isranden og har sammen med det dannet Løsning Hedesletten. Ved sin flade og rolige Overfladeform og sin grusede og sandede Jordbund fremtræder denne i Terrainet som en udpræget Modsætning til det omgivende, mere kupe-rede og frodigere Morænelersterain. Den lille Slette har en i Nord—Syd langstrakt Form og en Længde af ca. 5 Km., medens Bredden gennemsnitlig kun er 3 Km. Imod Nord og Øst danner Israndslinjen dens Grænser, medens den paa største Delen af Sydsiden og langs med hele Vestsiden støder til højere liggende, temmelig regelmæssigt formede Morænelersomraader, der staar med jævne Skraaninger ned imod Sletten. Omtrent midt i Hedesletten hæver en ganske flad, lille Bakke sig lidt op over Grusoverfladen. Den er langstrakt i Retningen ØSØ.—VNV. og har en Længde af godt 1 Km. og en Bredde af godt $\frac{1}{2}$ Km. Til Trods for, at dens Overflade er meget flad, og at den kun ligger 5—10 Fod ($1\frac{1}{2}$ —3 M.) over den om-givende Grusslette, adskiller den sig dog skarpt fra denne, idet den bestaar af frugtbart Moræneler. Tillige falder den imod Syd med en, om end kun ganske lav, saa dog hele Vejen tydelig Skraaning ned imod Hedesletten. Ud over denne ene Bakke er der ikke iagt-taget Afbrydelser af Hedesletten; det er dog muligt, at man ved en mere detailleret Undersøgelse vil kunne finde Smaapletter, hvor det underliggende Moræneler naar op til Overfladen.

Største Delen af Løsning Hedesletten ligger lidt mere end 200 Fod (63 M.) over Havet; kun i det nordvestlige Hjørne, hvorfra Afløbet har fundet Sted, gaar Overfladen ned til 190 Fod (60 M.). De højeste Punkter ligger i den østlige Del langs med Randmorænen, og herfra er Faldet gennemgaaende imod VNV., saaledes at den vestlige Side af Sletten er forholdsvis lavtliggende og kun har et ringe Fald fra Syd til Nord, nemlig 20 Fod (6 M.) paa godt 5 Km. eller ca. 1 : 800. For at vise Overfladens Form er der i Fig. 2 paa Tavle II gengivet et Kort over Løsning Hedesletten i Maalestok 1 : 100000 og med 5 Fods (1,57 M.) Horizontalkurver. Ved Tegningen af Kortet er der set bort fra Virkningerne af den postglaciale Erosion, idet Kurverne, som i det hele taget er noget afrundede, er tegnede tværs over Gjes-ager Aa's lille Dalrende.

Der kunde maaske være Anledning til at søge at bestemme, paa hvilke Punkter de Smeltevandsfloder, der har dannet Løsning Hedesletten, er strømmede ud fra Isen. Som det er paavist af USSING i hans Arbejde over Karup Hedesletten¹⁾, afgiver Højdeforholdene indenfor selve Smeltevandsaflejringen de sikreste Udgangspunkter ved Udførelsen af en saadan Bestemmelse. Selv om den her omhandlede lille Grusslette, hvad Størrelsen angaar, aldeles ikke taaler Sammenligningen med Karup Hedeslettens imponerende Flade, viser den dog i det smaa en iøjnefaldende Lighed med denne, og — hvad der for det foreliggende Spørgsmaal har særlig Betydning — man genfinder her udenfor Randmorænen langs med Hedeslettens Østgrænse lignende „Aflejningskegler“ med Toppunkter i Israndslinjen som i Karup-Fladen. Det sydligste Punkt, hvor man maa antage, at en betydelig Vandmængde har forladt Isen, er dog ikke betegnet ved en saadan Kegel, men antydes snarere af en Erosion ned i Hedesletten, et Forhold, der heller ikke savner sit Sidestykke i de store, midtjydske Hedesletter. I sin Omtale af Sebstrup-Keglen skriver USSING: „I den øverste, mere stejle Del af Keglen ses en flad, $\frac{1}{2}$ —1 km bred Erosionsdal, hvis Bund mod Vest gaar jævnt over i Aflejningskeglen (mod Øst støder den til den øvre Ende af Salten Aaens store Dalstrøg). Denne Erosionsdal er altsaa samtidig med Hedesletten og synes at antyde, at Isranden henimod Aflejningsperiodens Slutning har trukket sig et Stykke tilbage“²⁾.

Lignende, om end ikke ganske tilsvarende, er Forholdene i det smaa i Egnen ved Hedensted Mose i det sydøstlige Hjørne af den her omhandlede Løsning Hedeslette. Det Hul, der optages af Hedensted Mose, og det Vest derfor liggende flade, lave og sumpede Terrain, som gaar umærkeligt over i den vestlige, lavt liggende Del af Hedesletten, kunde tyde paa en betydelig Erosion paa dette Sted samtidig med Aflejringen af den øvrige Del af Hedesletten. Syd og Nord for det lave Terrain, der ligger Vest for Mosen, findes Grusflader, som ligger 10—15 Fod (3—5 M.) højere og antyder, at der ogsaa her til at begynde med er bleven aflejret Materiale, og at Erosionen kun har fundet Sted i den sidste Del af Hedeslettens Dannelsesetid, rimeligvis paa Grund af ændrede Udstrømningsforhold for Vandet. Om de forandrede Forhold er fremkomne ved en lille Frem- eller Tilbagerykning af Isranden lader sig næppe afgøre. En tredje Mulighed skal dog her antydes, da den i det mindste er et Forsøg paa at forklare Dannelsen af den mærkelige Fordybning, hvori Hedensted

¹⁾ USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2.

²⁾ Anf. St. S. 127.

Mose ligger. Det kunde nemlig tænkes, at der efterhaanden, inde under den yderste Del af Isen, af Smeltevandets selv blev ophobet saa meget Materiale, at Vandløbet blev tvunget noget til Vejrs og derved fik tilstrækkeligt Fald og Hastighed i det Øjeblik, det forlod Isen, til at udskylle Hullet, hvori Mosen nu ligger, og til at erodere noget ned i den vestfor liggende Grusslette. Denne Formodning støttes tillige af det allerede tidligere omtalte Forhold, at Terrainet bagved Israndslinjen paa dette Sted opbygges af vandret lagdelt, rullet Grus og Sand, medens man ellers normalt træffer usorterede Moræneaflejringer langs med Israndslinjen i denne Egn.

Medens Forholdene i det ovenfor skildrede Hjørne af Hedesletten ikke er fuldstændig klare, lader de paa det videre nordpaa følgende Stykke af Israndslinjen intet tilbage at ønske i Retning af Tydelighed. Man finder paa denne Strækning tre udprægede Aflejringskegler, der dog, som det vil fremgaa af det følgende, ikke alle er ganske ens udviklede. Den sydligste og tillige den mest iøjnefaldende af disse Aflejringskegler ligger Vest for Rimmerslund. Ganske vist danner den ikke en fuldstændig halv Kegleflade, idet den er afsat inde i en omtrent ret Vinkel af Israndslinjen; men den fremtræder dog som en tydelig Del af en saadan. Dette faar man maaske bedst et Indtryk af ved at betragte Horizontalkurvernes Forløb paa Kortet. De ordner sig i regelmæssige Buer med omtrent samme indbyrdes Afstand omkring Keglens Toppunkt, der ligger i Sydvestsiden af Rimmerslund, og man ser, hvorledes Overfladen vestfra stiger jævnt helt op til Randmorænenens Top, idet Aflejringskeglen ligesom tilslører den ydre Moræneskraaning. Faldet indenfor Keglen er forholdsvis betydeligt, nemlig gennemsnitlig 1 : 100, og Højden af hele Keglen er 35 Fod (11 M.). Derimod er dens Udstrækning kun ringe; den lader sig ikke følge længere end til Østenden af den tidligere omtalte Bakkeø eller til godt 1 Km. fra dens Toppunkt. Derefter afløses Kegleskraaningens af den ganske flade, næsten horizontale Grusslette. Dette sidste Forhold tyder paa, at man her staar overfor en Aflejring, der er dannet af en ikke særlig betydelig Gletscherbæk, og det samme viser Jordbundsforholdene. Det er allerede tidligere omtalt, at der paa Toppen af Bakken i Sydvestsiden af Rimmerslund findes Morænegrus, hvori Materialet er noget rullet. Gaar man herfra imod Vest nedad Aflejringskeglen, bliver Gruset snart fuldstændig afrullet og aftager samtidig i Kornstørrelse for tilsidst at gaa over til Sand, som ved Keglens Fod endog er temmelig fint. Længere vestpaa, ud paa Fladen, findes derimod atter Grus. Hele denne Aflejringskegle fremtræder saaledes som en lokal Dannelse, der maa være afsat af en mindre Gletscherbæk, som maaske er kommen ned fra Isens Overflade, hvad Kegletoppunktets betydelige Højde ogsaa kunde tyde paa.

Lidt længere imod Nord og ligeledes sluttende sig til Torpshøje Morænen findes straks Sydvest for Sebberup en lignende, men noget mindre Aflejringskegle. Dens Højde er omtrent 20 Fod (6 M.), og den lader sig kun følge ca. $\frac{1}{2}$ Km. ud fra Toppunktet. Faldet her er lidt stærkere end i den forrige, nemlig ca. 1:80. Hvad der er sagt om den foregaaende Kegel gælder ogsaa om denne; den kan derfor ogsaa kun betragtes som Resultatet af en forholdsvis ubetydelig Gletscherbæks Virksomhed.

Et Sted, hvor der i Modsætning hertil er strømmet en betydelig Vandmængde ud fra Isen, har man endnu et kort Stykke nordligere i Afbrydelsen af Randmorænen SSØ. for Løsning Station eller, nærmere betegnet, i den sydlige Del af denne Afbrydelse. Allerede Jordbundsforholdene her og i den nordligste Spids af Torpshøje Randmorænen (se S. 36—37) peger i denne Retning; men Beviset faar man først ved at betragte Overfladens Form udenfor Israndslinjen. Horizontalkurvernes Forløb i store, koncentriske og langt fra hinanden liggende Buer omkring det nævnte Punkt viser, at den for Øjet ganske flade Slette her dannes af en lav, men udstrakt Aflejringskegle med det forholdsvis ringe Fald af gennemsnitlig 1:250. Godt $1\frac{1}{4}$ Km. udenfor Kegletoppunktet bliver Faldet dog noget stærkere, nemlig ca. 1:150, sandsynligvis paa Grund af, at Smeltevandet her har mødt et sydfra kommende Vandløb, som har kunnet erodere lidt ind i Siden af Aflejringskeglen og hjælpe med til den videre Transport af det hertil skyllede Materiale. Den her beskrevne Aflejringskegle optager hele det nordøstlige Hjørne af Hedesletten og røber ved sin Størrelse, at den er aflejret af en betydelig Gletscherflod, der har spredt sine Vandmasser ud over et stort Areal. I samme Retning peger Jordbundsforholdene indenfor dette Omraade, idet hele denne Kegel er opbygget af Grus eller vekslende Lag af Grus og Sand, men intet Steds af rent Sand.

2. Forbindelsen imellem Løsning Hedesletten og Gudenaa Dalen.

Krollerup-Ullum Dalen. Det fra Engom Dalen og fra de forskellige Punkter langs med den østlige Side af Løsning Hedesletten kommende Smeltevand forenede sig i Egnen Vest for Løsning til et stort Vandløb, for herfra samlet at søge videre fremad imod Havet. Naar Vandet ikke har fulgt Terrainets Fald og er løbet imod Nord til Horsens Fjord, er Grunden, som det allerede tidligere er udviklet, den, at Isen her spærrede for Afløbet og tvang Vandmasserne til at bøje imod Nordvest og løbe langs med Isranden. Det har langs med

denne udgravet en ganske flad og kun lidet iøjnefaldende Dal, der med et næsten retlinjet Forløb i Sydøst—Nordvest og med en Længde af over 6 Km. strækker sig fra Krollerup over Ullum til den store Lavning Ullum Kær.

Det første Stykke af denne Dal har en ret ejendommelig Karakter paa Grund af, at Isen, som det er paavist under Omtalen af denne Egns Morænedannelser, i længere Tid har staaet frem omtrent til Midtlinjen af det dalagtige, godt 1 Km. brede Strøg mellem Krollerup og Sønderkær ØSØ. for Ullum og derved selv dannet Dalens Begrænsning imod Nordøst. Det er derfor kun den sydvestlige Halvdel af dette Strøg, der er bleven fuldstændig udviklet som en Smeltevandsdal, tydeligt begrænset af en Erosionsskraaning imod Sydvest og med Smeltevandsgrus i Bunden, medens den nordøstlige Side rimeligvis kun en kortere Tid har været overskyttet af Smeltevandet, efter at Isranden havde trukket sig tilbage til Skjelhøj Randmorænen. Denne Del af Dalbunden fremtræder derfor nærmest som en Erosionsflade, hvor der kun pletvis findes lidt Smeltevandsgrus.

Nedenfor den lave, men udprægede Erosionsskraaning, der adskiller Dalen fra det imod Sydvest liggende Morænelersterrain, findes som ovenfor nævnt Smeltevandsgrus. Dette er dog ofte dækket af endog ret betydelige Mængder af Flyvesand, og kun et enkelt Sted har der været Lejlighed til at se Profil i Gruset. Ca. $1\frac{1}{2}$ Km. Nordvest for Krollerup fandtes bagved et nybygget Hus, umiddelbart Nord for Vejen, et Hul, hvor der under godt 1 M. Flyvesand kunde iagttages lidt vandret lagdelt, rullet Grus, hvis Sten gennemgaaende var paa 3—4 Ctm. Dette Profil ligger paa det allernærmeste paa det Sted, hvor det nuværende Vandskel mellem Gudena og Tilløb til Horsens Fjord passerer Dalen.

Længere imod Nordvest, hvor Isranden har bøjet tilbage for det højere liggende Terrain Nordøst for Ullum, er Dalen i Modsætning til det ovenfor skildrede Stykke normalt udviklet med udprægede Erosionsskraaninger paa begge Sider og med en smuk, flad og gruset Dalbund overalt. I Gruset her er der iagttaget flere Profiler i Eggen ØSØ. for Ullum. En stor, indtil godt 1 M. dyb Grav fandtes saaledes ca. 1200 M. ØSØ. for Byen, og her saas under knap 2 Dcm. Muld smukt, rullet Grus med underordnede Sandlag, der viste diskordant Parallelstruktur. Gruset var maaske ubetydeligt finere end i det ovenfor skildrede Profil; det indeholdt Sten gennemgaaende paa indtil 3 Ctm., men dog ogsaa enkelte endnu større.

At Dalgruset er saa groft som ovenfor angivet, kunde maaske vække Forundring, naar man sammenholder dette Forhold med Dalbundens meget ringe Fald, der kun udgør ca. 1:1500. Men man maa gaa ud fra, at Vandet til Trods for det svage Fald har løbet med en be-

tydelig Hastighed. Det var nemlig en forholdsvis stor Vandmængde, der skulde passere denne smalle Afløbsrende, og man maa tænke sig, at Smeltevandsfloden her kun har haft en ringe Dybde, men at den til Gengæld har udfyldt Dalen i hele dennes Bredde, noget, der sikkert har været Tilfældet med adskillige af vore Smeltevandsdale.

Ullum Kær. Nordvest for Ullum munder den ovenfor beskrevne Dal ud i Ullum Kær, en stor, tørvefyldt, i VSV.—ØNØ. langstrakt Lavning. Denne har en Længde af 6 Km. og er imod Vest omtrent 3 Km. og i den østlige Ende 4 Km. bred, hvad der giver den en trekantagtig Form. Imod Syd og Nordvest begrænses den af store Højdepartier, der falder langsomt og med jævne Skraaninger ned imod Lavningen. Imod ØNØ. grænser den derimod til de i et foregaaende Afsnit (S. 44—45) skildrede, ikke meget højere liggende Moræneaflejringer, der nu skiller den fra den vestlige Ende af Bygholm Lavningen, med hvilken den i en tidligere Tid maa antages at have staaet i Forbindelse, saa at de udgjorde et sammenhørende Hele, der som en stor, bred og flad Lavning strakte sig langt ind i Landet i Forlængelse af Horsens Fjord.

Hele Ullum Kær indtages nu af en stor og næsten plan Tørveflade, et Forhold, der viser, at den udstrakte Sø, som fandtes her i senglacial Tid, er vedbleven at eksistere, endnu længe efter at Isen havde trukket sig tilbage. Først efterhaanden som Tørvedannelsen skred fremad, og Vandstanden samtidig sænkedes lidt, ved at der eroderedes en lille Rende ned i Dalterrassen gennem Gudenaa Dalen, forvandlede dette udstrakte Areal til tørt Land. Vandstanden i den senglaciale Sø var godt 175 Fod (55 M.) over Havet, medens den nuværende Tørveoverflade ude i Midten af Kæret ligger paa omkring 165 Fod (52 M.), og Højden af den alluviale Dalbund i Begyndelsen af Afløbet ved Aale er 160 Fod (50 M.) over Havet.

Hovedmængden af det Vand, der i den senglaciale Tid løb ud i Ullum Kær, kom igennem den ovenfor skildrede Krøllerup-Ullum Dal; men naturligvis har Lavningen ogsaa dengang ligesom nu modtaget mindre Vandløb fra de omgivende Højdepartier i Syd, Vest og Nordvest. Og endelig taler Sandsynligheden for, at der paa et enkelt Sted er strømmet en Gletscherflod ud fra den Is, der, som det er beskrevet i Afsnittet om Morænedannelserne, stod ud i Søen i Egnen imellem Ullum og Aale. Men da de Dannelser, der her er aflejrede ved Isranden og umiddelbart foran denne, nu ligger begravede under et alt skjulende Tørvedække, lader der sig intet absolut Bevis føre for denne Antagelse. Den støttes kun paa Tilstedeværelsen af det langstrakte, dybe, nu tørvefyldte Hul, Rasksø, der

ligger i Forlængelse af det laveste Strøg i Bygholm Lavningen, og som i Retningen Øst—Vest gennembryder den Morænebarriere, der adskiller Ullum Kær fra Bygholm Lavningen. Begge disse sidstnævnte Forhold peger i den anførte Retning. Det er nemlig sandsynligt, at en Del af det subglaciale Smeltevand har søgt til de under Isen liggende laveste Steder og derfor har fulgt Bunden af Bygholm Lavningen vestpaa for at naa ud til Isranden netop paa det angivne Sted. Og den iøjnefaldende Afbrydelse af Moræneaflejringerne, som Rask sø danner, og til hvilken der ellers intet tilsvarende findes, tyder paa, at der her har været særlige Forhold til Stedet. Rask sø's Dannelse lader sig neppe forklare uden gennem Antagelsen af en paa dette Sted fremstrømmende, subglacial Smeltevandssflod.

3. Gudena Dalen mellem Aale og Vestbirk og dens Tilløb.

Gudena Dalen mellem Aale og Vestbirk. Igennem en stor og bred Dal løber den nuværende Gudena fra Ullum Kær imod Nordøst, og den samme Vej har Vandet fulgt allerede i den senglaciale Tid. De betydelige Vandmængder, som dengang samledes i den store Smeltevandssø, kunde kun komme frem ad denne Vej. De har nedgravet og udvidet Dalen mellem Aale og Vestbirk samt aflejret en smuk, flad Dalterrasse, i hvilken Gudena senere kun har nedskaaret en smal Erosionsrende, som tager sig helt ubetydelig ud i det brede Dalstrøg.

Denne Del af Gudena Dalen, der danner et særligt Afsnit med en fra de nordligere Strækninger fuldstændig forskellig Karakter, har en Længde af ca. 14 Km. og en Bredde, der varierer fra 600 M. paa det smalleste Sted ved Bredvad Vandmølle til 1400 M. paa det bredeste Sted ved Bresten Bro. Fra Landsbyen Aale, der ligger i Dalens nordvestlige Side ved Nordenden af Ullum Kær, strækker den sig paa de første 3 Km. imod ØNØ. for derefter paa de følgende 2 Km. at fortsætte sig imod Nord. Bredden, der paa den førstnævnte Strækning er 700—800 M., vokser her til ca. 1 Km. Derefter følger et 6 Km. langt, næsten fuldstændig retlinjet Dalstykke med Retningen Sydvest—Nordøst og den forholdsvis betydelige Bredde af i Reglen noget over 1 Km. Omtrent ved Bredvad Vandmølle bliver Dalen hurtigt smallere og antager samtidig en næsten vest-østlig Retning, som den dog kun beholder paa godt 1 Km. Derefter bøjer den imod Nord og munder ca. 2 Km. nordligere, med en Bøjning imod Nordøst, ud i det store Dalstrøg, der strækker sig fra Vestbirk imod NNV. Paa det sidst beskrevne Stykke er Bredden hele Vejen forholdsvis ringe og varierer mellem 600 og 800 M.

Gennem denne Dal strækker der sig en sammenhængende og smukt udviklet Grusterrasse, som falder regelmæssigt, men meget langsomt imod Nordøst. Faldet er endnu mindre end i Krøllerup-Ullum Dalen, nemlig kun noget over 20 Fod (6 M.) paa hele Strækningen eller ca. 1:2000. Ikke desto mindre er det Materiale, Terrassen er opbygget af, ogsaa her temmelig groft, og i Indsnævringen af Dalen i dennes nordøstlige Ende findes endog forbausende grove Lag. Ved at færdes i Dalen faar man dog ikke noget særlig fyldigt Indtryk af Grusets Kornstørrelse, da store Arealer af Dalterrassen dækkes af Flyvesand. Dette findes ofte sammenblæst i smaa Klitter, som f. Eks. Nord for Lillebro over Matrup Mølleaa og SSV. for Bresten Bro; men det forekommer ogsaa almindeligt som fladt udbredte Dækker over større og mindre Arealer og kan derved give Anledning til Forveksling med Smeltevandsaflejringen, saa at man vurderer denne til at bestaa af betydeligt finere Materiale, end den i Virkeligheden gør. Men paa forskellige Steder ned igennem Dalen har der været Lejlighed til at se Profiler i Terrassen og derigennem at faa et Indblik i dens Bygning. Det synes deraf at fremgaa, at Kornstørrelsen paa ingen Maade er afhængig af Stedets Beliggenhed, men udelukkende af Dalens Bredde, og at den endog varierer betydeligt med denne, saaledes at Materialet bliver finere, hvor Dalen breder sig og omvendt. Dette Forhold viser, at Vandets Hastighed har været afhængig af Dalens Bredde eller, med andre Ord, at Smeltevandsfloden samtidig har løbet over hele Dalbunden. I det følgende skal der kort omtales nogle Profiler, der illustrerer det nævnte Forhold, og som — maaske med en enkelt Undtagelse — er iagttagne paa Steder, hvor lokale Uregelmæssigheder, forarsagede af Tilløb fra Siderne, maa anses for at være udelukkede.

Umiddelbart Syd for Landevejen og 200 M. Sydøst for Aasted Bro iagttoges i Bunden af en ældre, flad Grav fint Grus med lidt Sand. Lagdelingen var vandret med nogen diskordant Parallelstruktur navnlig paa de Steder, hvor der var Sand. Stenene i Gruset var gennemgaaende paa 3—4 Ctm.; der fandtes enkelte større og mange mindre. Dalens Bredde er her 1 Km. — I Skraaningen ned imod Matrup Mølleaa saas i en Grav lige Nord for Lillebro vekslende Lag af Sand og fint Grus med fin diskordant Parallelstruktur. Stenene i Gruset var sjældent over 3 Ctm., i Reglen mindre. Paa dette Sted er Dalen 1200 M. bred. — Paa et Sted, hvor Bredden er endnu større, nemlig 1300 M., eroderer Aaen paa en kort Strækning ind i Terrassen, saa der her ca. 650 M. Vest for Bresten Bro var Lejlighed til at se et tilskredet Profil i Sand med fine Gruslag. — Videre imod Nordøst bliver Dalen atter smallere, og Kornstørrelsen tiltager samtidig. 900 M. Sydvest for Bredvad Vandmølle og paa et Sted, hvor

Dalen allerede er indsnævret til 800 M.'s Bredde, var der gravet et firkantet Hul, 3 M. i Kvadrat og 2 M. dybt. Her saas vekslende Lag af Sand og Grus, i hvilket Stenene gennemgaaende var ca. 3 Ctm. store. Smeltevandsaflejrings diskordante Parallelstruktur var her smukt udviklet, og da Profilet var rent overalt, var der Lejlighed til at iagttage den karakteristiske Forskel, der er imellem Snit i Terrassens Længderetning og Snit vinkelret paa denne. I Længdeprofil viser Lagene i alle de enkelte Partier Hældning til samme Side, nemlig med Strømretningen, medens man i Tværprofil ser Lagene skraane ud til begge Sider. Aflejrings opbygges altsaa af Smaapartier, indenfor hvilke Faldet er noget varierende, men altid nedad Dalen. — Det næste Profil er iagttaget 400 M. Vest for Bredvad Vandmølle. Her saas en tilskredet Grav i Grus med adskillige Sten paa henimod 1 Dcm., og i Stenbunker i Bunden af Graven fandtes Sten paa over 2 Dcm. Grusets forholdsvis store Kornstørrelse staar dog her sandsynligvis ikke alene i Forbindelse med Dalens formindskede Bredde, der paa dette Sted er 700 M., men skyldes rimeligvis ogsaa, at dette Profil, i Modsætning til de øvrige beskrevne, ligger meget nær ved Dalsiden og tillige ud for Munden af en lille Erosionskløft. — Paa Dalens smalleste Sted, hvor Bredden kun er 600 M., saas lige Syd for Broen ved Bredvad Vandmølle Profil i vekslende Lag af groft og fint Grus samt noget Sand. Næsten helt foroven fandtes et ca. 3 Dcm. mægtigt Gruslag med mange decimeterstore Sten og enkelte Sten paa ca. 2 Dcm. Dette Lag laa vandret, medens det underliggende, noget finere Grus viste diskordant Parallelstruktur i Længdeprofil.

Endnu skal kun omtales nogle Uregelmæssigheder i Overfladeformen indenfor Dalterrassen, foraarsagede af det Vand, der igennem større og mindre Erosionskløfter søgte fra Højlandet Nordvest for Dalen ned til denne. Længs med den nordvestlige Dalside træffer man en hel Række smaa, deltaagtige Aflejringskegler, der i Formen ganske ligner de tilsvarende Dannelser paa Hedesletterne, men som naturligvis her ikke er nær saa store og derfor kun lidet iøjnefaldende. Enhver af disse Kegler har sit Toppunkt i en Erosionskløft og paa det Sted, hvor denne munder ud i den store Dal. Efter Kløftens Størrelse er Keglen mere eller mindre udpræget, og man finder saadanne Aflejringskegler af meget forskellig Størrelse, fra ganske smaa, der paa Kortet kun giver sig til Kende ved en svag Udbuen af en enkelt Horizontalkurve ud for Munden af en ubetydelig Erosionskløft, og til temmelig store, som ofte kan spores helt ud over Midten af Dalen, og hvis Toppunkt kan ligge indtil 15—20 Fod (5—6 M.) højere end den egentlige Terrasseflade. Paa enkelte Steder ser man, at Smeltevandsfloden har skaaret lidt ind i Siden

af en større Aflejningskegle, noget, der ved første Øjekast maaske kunde give Anledning til at antage to forskellige Terrasser paa et saadant Sted. Af disse Aflejningskegler træffer man som sagt en hel Række; den største og smukkeste findes Nordvest for Bresten Bro ud for den Kløft, i hvis Munding Neder Aastrup ligger.

En ganske tilsvarende Dannelse, som er almindelig næsten overalt i vore Smeltevandsdale, har man langs med den stejle og af smaa Erosionskløfter ganske sønderskaarne, vestlige Dalskraaning, der strækker sig fra Hjørnet Nordøst for Bredvad Vandmølle imod Nord. Gaar man fra den vandrette Terrasseflade ude i Dalen ind imod Dalsiden, passerer man, inden man naar denne, en jævn Skraaning, der falder regelmæssigt fra Dalsiden ud imod Midten af Dalen, og som har en Hældning af omkring 1 : 30. Dette giver sig paa Kortet til Kende ved, at Horizontalkurverne ordner sig i regelmæssige, parallelle Linjer langs med Dalsiden og op til en Højde, der ofte er betydeligt over Dalterrassernes normale Niveau, paa dette Sted endog henimod 50 Fod (16 M.) højere. Først endnu højere oppe finder man Dalsidernes tæt ved hinanden liggende Kurver, der løber ind og ud i de talrige smaa Erosionskløfter. Den nævnte Skraaflade, som man kunde fristes til at kalde en „Aflejringsskraaning“, maa opfattes som en Række smaa, men forholdsvis stejle Aflejningskegler, der er dannede af det fra Smaakløfterne af Overfladevand udskyllede Materiale, og som ligger saa nær ved hinanden, at de er smeltede fuldstændigt sammen til en uafbrudt Skraaflade langs med Dalsiden. Saadanne Aflejringsskraaninger er, som nævnt, almindelige rundt omkring i vore Smeltevandsdale, men kun paa Steder, hvor Dalsiderne bestaar af Sand og Grus, der let lader sig skylle ud, og hvor de stejle Dalskraaninger derfor altid er gennemfurede af en Mængde smaa Erosionskløfter. Og paa mange Steder træffer man forskellige Overgangstrin imellem saadanne hele og regelmæssige Aflejringsskraaninger og Former, der nærmer sig til de ovenfor beskrevne, deltaagtige Aflejningskegler.

Tilløb fra Isranden. Langt betydeligere end de nævnte Tilløb fra Højlandet imod Nordvest, var dog de Smeltevandsstrømme, som den senglaciale Gudena modtog fra den Sydøst for Dalen liggende Isrand. Paa adskillige Punkter har smaa Vandløb forladt Isen for at løbe til den her betragtede Del af Gudena Dalen, og et enkelt Sted munder der ud i denne en Sidedal, som efter dens Størrelse at dømme maa have tilført Gudena Dalen en stor Vandmængde. I det følgende skal der blive gjort Rede for de forskellige Dannelser, der staar i Forbindelse med det fra Isranden kommende Smeltevand, og

de skal blive omtalte i den Rækkefølge, hvori man træffer dem, naar man fra Ullum Kær følger Gudena Dalen nedad.

Det første Sted, hvor man muligvis staar overfor Virkningerne af en lille Smule lokalt Smeltevand, er NNØ. for Rask og dér, hvor Israndslinjen forlader Gudena Dalen og bøjer imod Øst. Fra dette Punkt strækker der sig en lille, indtil 30 Fod (9 M.) dyb, langstrakt Lavning imod Sydøst skraat ind i det smaa kuperede Terrain bagved Israndslinjen. Ved sin regelmæssige Form afviger den tydeligt fra dette Terrains øvrige Huller, og man ledes til at formode, at den er udskyllet af lidt lokalt Smeltevand, der er styrtet ned i en Længde-spalte her i Spidsen af Bygholm Lavningens Istunge. Men herom lader sig intet sikkert sige, og det hele er i Virkeligheden kun en ganske ubetydelig Dannelse.

Vigtigere er en lille Smeltevandsaflejring, der begynder ved Israndslinjen ca. 1 Km. Nordøst for Hornum og herfra strækker sig imod VNV. til Gudena Dalen. Dens Længde er omtrent 2 Km. og Bredden i Reglen ikke over 200 M.; kun i dens øverste Ende breder den sig omtrent til det dobbelte. Imod Nord begrænses den hele Vejen af en udpræget Erosionsskraaning, medens Sydgrænsen derimod er meget utydelig paa Grund af, at det sydfor liggende Terrain kun er ganske lidt højere. Den øverste Ende af Smeltevandsaflejringen ligger ca. 235 Fod (74 M.) over Havet og godt 60 Fod (19 M.) over Dalterrassen ved dens Munding i Gudena Dalen; Faldet er saaledes i Gennemsnit 1:100. Paa Overgangen imellem Israndens Morænedannelser og Smeltevandsaflejringen og nær ved dennes Sydgrænse iagttoges der i en, allerede under Omtalen af Morænedannelserne nævnt, stor, flad Grusgrav temmelig fint Grus med tydelig vandret Lagdeling. Til Trods for Lagdelingen var Gruset dog forholdsvis usortet. Stenene var gennemgaaende indtil ca. 5 Ctm. store, men spredt forekom Sten paa indtil 2 Dcm. Nedad Smeltevandsaflejringen bliver Materialet hurtigt finere og gaar over til Sand.

Den næste Smeltevandsdannelse, man træffer paa, er den allerede nævnte, smukke og nu ganske tørre Dal, der i Retningen ØSØ.—VNV. gennemskærer Nim Højdepartiet, og som falder ud i Gudena Dalen omtrent midt imellem Aasted Bro og Bresten Bro. Den har en Længde af godt 5 Km. og en Bredde, som varierer mellem 300 og 500 M. Paa begge Sider begrænses den af veludviklede Erosionsskraaninger, der i Hovedsagen bestaar af Moræneler, og Bunden i den indtages af en jævn Grusflade, i Midten af hvilken der kun er eroderet en ubetydelig Rende. Den fremtræder saaledes i Terrainet som en udpræget Smeltevandsdal, hvis Udseende (omtrent 2 Km. fra Gudena Dalen) fremgaar af Fig. 2 paa Tavle X. Billedet er taget fra Dalens Sydside tværs over den.

Den østlige Ende af Dalbunden gaar op til ca. 240 Fod (75 M.) over Havet. Herfra er Faldet paa de første 800 M. ca. 20 Fod (6 M.) eller 1:125, og paa dette Stykke er Overfladen lidt uregelmæssigt formet af det stærkt løbende Smeltevand. Men snart bliver den ganske flad og fortsættes med et Fald af ca. 1:250, som ned imod Dalens Munding langsomt aftager til ca. 1:350. Overalt finder man i Dalbunden Smeltevandssgrus, der dog paa enkelte Steder dækkes af Flyvesand. Kornstørrelsen i Smeltevandssaflejringen er forholdsvis stor; i et lille Profil omtrent halvvejs nede ad Dalen og 800 M. SSV. for Søballe iagttoges saaledes vekslende, vandrette Lag af Grus og Sand, og i Gruset fandtes Sten paa indtil 1 Dcm.; hyppigst var Stenene dog kun paa 3–4 Ctm. eller lidt mindre. Endnu et lille Profil i ganske lignende Grus saas $\frac{1}{2}$ Km. længere nede ad Dalen.

Hovedmængden af det Vand, der har nedgravet denne Dal, er strømmet ud fra Isranden i Hjørnet mellem de to store Istunger. Hen til dette Punkt har det under Isen kommende Smeltevand sandsynligvis løbet langs med begge Sider af den aflange Bakke, hvorpaa Tamdrup Bavnehøj ligger, og det er tillige muligt, at en mindre Del deraf har fundet Vej til Dalen igennem en lille Kløft $\frac{1}{2}$ Km. Nordøst for Molkjær Kro. Men ogsaa fra et andet og nordligere Punkt af Israndslinjen har denne Smeltevandssdal modtaget en forholdsvis betydelig Vandmængde. Omtrent $1\frac{1}{2}$ Km. Sydøst for Nim og paa det Sted, hvor Isranden har staaet tværs over den flade Lavning, som adskiller de store Banker Nord og Øst for Nim fra det omtrent lige saa høje Parti omkring Enner, begynder nemlig en Smeltevandssaflejring, som, dannende en imod Vest vendt Bue, følger Randmorænen sydpaa. Denne Smeltevandssdannelse fremtræder som en flad, svagt hældende Grusaflejring, der udfylder Bunden af en Lavning i det oprindelige Terrain, og som gaar jævnt over i Dalgruset knap 1 Km. nedenfor Dalens øverste Ende. Den har en Længde af noget over $1\frac{1}{2}$ Km. og er i den nordlige Ende ca. 300 M. bred, men indsnævres sydpaa til det halve. Den begynder paa en Højde af 250 Fod (78 M.), og Faldet er paa det første Stykke udenfor Israndslinjen 1:100; derefter aftager det efterhaanden omtrent til 1:250.

Følger man derefter Gudena Dalen videre imod Nordøst, er det næste Sted, hvor man maa antage et Smeltevandstilløb, ved Porskær. Dannelsen af dette dybe, aflange Hul, som strækker sig ind i det kuperede Morænelandskab, og i hvis Forlængelse der gaar en smal Lavning østpaa ind til den store Hansted Lavning, lader sig næppe forklare uden ved Erosion af en her frembrydende, subglacial Smeltevandssflod, hvis Udstrømningsforhold fra Isen har været saaledes, at Vandløbet har kunnet erodere særlig kraftigt ned i Undergrunden netop paa det Sted, hvor det forlod Isranden.

Mærkeligt nok træffer man umiddelbart Nord for Porskær Sporene af en anden fra Isranden kommende Smeltevandsstrøm, som slet ikke har eroderet ned i Grunden, men hvis Virksomhed har været indskrænket til at aflejre et Grusbælte nedad Skraaningen imod Gudena Dalen. Dette, i Forbindelse med en forholdsvis stor Begyndelseshøjde, tyder paa, at Gruset er afsat af en fra Isoverfladen nedstrømmende Gletscherbæk. Denne Smeltevandsaflejring tager sin Begyndelse 200 M. VNV. for Underup Kirke paa en Højde af ca. 230 Fod (72 M.); den strækker sig herfra først i vestlig Retning, men bøjer senere noget imod Nordvest. Længden er $1\frac{1}{2}$ Km., og Bredden overstiger i hele den øverste Del sjældent 200 M.; først helt nede ad Skraaningen breder Aflejringen sig hurtigt til omtrent 600 M. Faldet er betydeligt, i den øverste Del ca. 1 : 50, men aftager nedad til omtrent det halve. Aflejringen bestaar overalt af Grus, hvad der ikke kan undre, naar man ser hen til dens stærke Fald.

Endnu skal der kun gøres opmærksom paa et Punkt, hvor en mindre Mængde Smeltevand har forladt Isen. Det er paa det Sted, hvor Israndslinjen naar helt frem til Gudena Dalen Nord for Ringskov Banke. Her strækker Smeltevandsgruset sig fra Dalbunden et lille Stykke ind i Morænedannelserne. Det hele drejer sig dog kun om ca. 300 M., og Højden af Gruset stiger ikke til mere end godt 180 Fod, (56 M.), saa dette lille Tilløb var næppe nogen Omtale værd, hvis man ikke med en vis Sandsynlighed kunde angive, hvorfra Vandet i dette Tilfælde er kommet. I Vestsiden af den store Bakke, paa hvis Nordende Kvæghøj ligger, og 1 Km. SSØ. for det angivne Punkt findes to dybe Huller, der, ligesom flere mindre Fordybninger i dette Terrain, har en Form, som tyder paa, at man her staar overfor en jættegrydeagtig Dannelse. Man maa med andre Ord antage, at de er udskyllede af Smeltevand, der fra Isens Overflade er styrtet ned i Gletschermøller. De nævnte to store Huller er dog ikke helt lukkede, men staar imod Vest i Forbindelse med en smal Lavning, som løber ud til det angivne Punkt af Israndslinjen og saaledes synes at betegne den Vej, det nedstyrtede Smeltevand har fulgt paa det sidste Stykke, inden det forlod Isen.

4. Smeltevandet fra den nordlige Del af Hansted Lavningens Istunge samt Gudena Dalen mellem Vestbirk og Gudensø.

Smeltevandet fra den nordlige Del af Hansted Lavningens Istunge. Nordvest for Vestbirk mundedes den ovenfor skildrede Smeltevandsflod ud i det store Dalstrøg, der herfra strækker sig imod NNV., og som endnu benyttes af Gudena paa dens videre Vej nordpaa.

Men ogsaa fra andre Steder modtog denne store Dal Tilløb fra Isranden, dog ikke saa betydelige som den sydfra kommende Flod.

Under Omtalen af den her betragtede Egns Morænedannelser er der gjort opmærksom paa, at Terrainet bagved Israndslinjen i den nærmeste Omegn omkring Vestbirk bestaar af Bakkerygge med mellemliggende, langstrakte Lavninger, og at deres Retning er omtrent vinkelret paa Israndslinjen, hvorved de kommer til at ligge noget vifteformet ordnede. Denne Form af Overfladen synes naturligt at kunne forklares ved Erosion af Smeltevand, der er styrtet ned i radiære Længdespalter i den her fremflydende, lille Istunge. Muligvis har dog ogsaa subglaciale Vandløb været medvirkende. Sandsynligt er det saaledes, at der inde under Isen har løbet Vand igennem den Lavning, der fra Nordøstenden af Torp Sø strækker sig ud til Vestbirk, og som over Torp Sø staar i Forbindelse med Hasted Lavningen og ved et lavt Strøg østpaa igennem Nørreskov forbindes med Mosedraget ved Urup og dets Fortsættelse imod ØSØ.

Medens der ikke lader sig noget absolut sikkert sige om disse Vandløb, finder man derimod en anden Smeltevandsdannelse, som ikke lader noget tilbage at ønske i Retning af Tydelighed. Det er den tidligere nævnte Østbirk Dal, som med en Længde af knap $3\frac{1}{2}$ Km. og en Bredde af mellem 125 og godt 400 M. strækker sig fra Israndslinjen 1 Km. Sydøst for Østbirk imod Nordvest til Gudena Dalen. Kun i den øverste Ende begrænses Østbirk Dalen paa begge Sider af Erosionsskraaninger. Længere nedad findes en saadan kun langs med Dalens Nordøstside, da Isen paa den modsatte Side har staaet helt ned til Dalbunden. Den øverste Ende af Smeltevandssaflejringer i denne Dal ligger paa ca. 185 Fod (58 M.), og Faldet er i Gennemsnit 1:400. Kornstørrelsen i Smeltevandssaflejringer er her kun ringe, og overalt er Dalbunden sandet, hvilket viser, at det ikke er saa særligt store Vandmængder, der har dannet Dalen. Muligvis er endog kun en Del af det Smeltevand, som inde under Isen maa antages at have fulgt det lave Strøg Øst og Nord for Urup, strømmet denne Vej ud, medens Resten har fortsat sit Løb inde under Isen helt frem til Vestbirk, noget, som Formen af Mosehullerne i Egnen Syd for Østbirk kunde tyde paa.

Gudena Dalen fra Vestbirk til Vest for Mossø. I Gudena Dalen NNV. for Vestbirk samledes alt det Smeltevand, der var strømmet ud fra Isen paa de forskellige, i det foregaaende omtalte Steder. De forenede Vandmængder forlod her som en stor Flod Isranden for at følge Gudena's bugtede Dal nordpaa igennem Jydland og naa ud til Havet igennem Randers Fjord.

Fra Israndslinjen ved Vestbirk strækker Gudena Dalen sig imod NNV., til den ca. 9 Km. længere nede munder ud i det store, i Øst—Vest gaaende Dalstrøg, hvori Mossø og Salten Langsø ligger, og hvis vestlige Ende gennemløbes af Salten Aa. Med den betydelige Bredde af $1\frac{1}{2}$ —2 Km. og dybt nedskaaren i det omgivende, høje Terrain, der paa sine Steder endog naar op til 400 Fod (126 M.), fremtræder denne Del af Gudena Dalen som et i landskabelig Henseende meget væsentligt Led af Terrainet. Dertil kommer, at den paa Grund af sine stejle Erosionsskraaninger og sin smukke Dalterrasse er et af de bedste Eksempler paa Daldannelser i Danmark.

Betragter man Dalbundens Smeltevandsaflejring, viser det sig dog, at denne ikke er fuldstændig normalt udviklet, idet Terrassen opløser sig i enkelte Stykker med flad Overflade og som oftest stejle Skraaninger. Imellem disse Terrassestykker findes tørvefyldte og i Reglen meget lange Lavninger, der ofte er afløbsløse eller dybere end Afløbet. Dette Forhold, og iøvrigt ogsaa Lavningernes uregelmæssige Form, udelukker, at de kan være dannede ved Erosion efter Terrassens Aflejring, selv om den postglaciale Erosion vel nok kan have nedskaaret enkelte Forbindelsesrender imellem dem og derved bidraget noget til Sønderdelingen af Terrassefladen.

Den beskrevne, ejendommelige Form af Smeltevandsaflejringen er ikke noget helt ualmindeligt Fænomen, selv om det ikke er iagttaget indenfor de tidligere omtalte, sydligere Smeltevandsdannelser. Følger man Gudena Dalen videre nordpaa, finder man nemlig hele Vejen ned til Silkeborg ganske tilsvarende Former i Dalbunden, idet de bekendte Silkeborg Søer er Dannelser, som er fuldstændig analoge med de ovenfor skildrede Lavninger, kun at de ikke som disse er blevne helt udfyldte med Tørv i den postglaciale Tid.

Man kunde spørge om Oprindelsen til disse ejendommelige Fordybninger i den ellers saa flade Dalterrasse, og Svaret bliver ikke vanskeligt at give, naar man ser hen til, hvad der er kendt fra andre Egne af Landet. Allerede i 1880 har FEDDERSEN i et mindre Arbejde om „Nogle danske Overfladeforhold“¹⁾ henledet Opmærksomheden paa en ganske lignende Dannelse i Egnen omkring Flyndersø, og han har tydet Fordybningerne som Jordfaldshuller opstaaede paa Grund af Opløsning af og Sammenstyrtninger i underliggende Kridtaflejringer. Efter udførligt at have begrundet denne Tydning gør han i Slutningen af Afhandlingen opmærksom paa, „at det langt fra er sjældent ved f. Ex. vore Indsøer at træffe Forhold, som aldeles svare til, hvad vi nu kjende fra Flynder Sø“ og fremhæver som Eksempler derpaa Søerne i Viborg Egnen samt netop Silkeborg

¹⁾ FEDDERSEN, A. 1880. Nogle danske Overfladeforhold. Geografisk Tidsskrift. 4de Bd. S. 112—118. (Særtryk med selvstændig Paginering 1881.)

Sørerne. Senere har USSING i sin Afhandling om Hedesletterne¹⁾ ligeledes beskæftiget sig med Egnen omkring Flyndersø. Som det tidligere er omtalt (S. 18—19), bekræfter han Rigtigheden af Fordybningernes Tydning som Jordfaldshuller, dog med den Ændring, at „Jordfaldene“ er foraarsagede ved Smeltning af større og mindre isolerede Ismasser, der var blevne begravede i Hjelmhede Smeltevands-aflejringen, efter at Randen af det sammenhængende Isdække havde trukket sig noget tilbage. I senere Arbejder²⁾ angiver USSING en ganske tilsvarende Dannelsesmaade for Sørerne i Viborg Egnen.

Sammenligner man nu disse to Søomraader med Silkeborg Sørerne og de i det foregaaende beskrevne Fordybninger i Terrassen længere sydpaa, maa man give FEDDERSEN Ret i, at det ogsaa her drejer sig om aldeles tilsvarende Dannelser. Man træffer i Gudena Dalen ganske de samme Former fra smaa, runde, dybe Huller til lange Sø-Lavninger med de karakteristiske Indsnøringer, der ligesom deler dem i flere Bassiner, og her, ligesom de to andre Steder, findes Fordybningerne i en ellers flad Smeltevandsaflejring. Det maa derfor betragtes som hævet over enhver Tvivl, at Afbrydelserne af Dalterrassen i denne Del af Gudena Dalen ligeledes skyldes, at Smeltevandet under og i sit medslæbte Materiale har begravet større og mindre isolerede Isklumper, som ved senere Smeltning har givet Anledning til Dannelsen af de omtalte Fordybninger.

Denne Dannelsesmaade er i sig selv ikke uden Interesse; men endnu større Betydning har den dog ved at give Oplysninger om forskellige andre Forhold. Det er for det første indlysende, at naar saa mange isolerede, mindre Ispartier har kunnet holde sig uden at smelte helt bort, kan der ikke have ligget noget særlig langt Tidsrum imellem den Tid, da hele Silkeborg Egnen var isdækket, og den her betragtede Fremrykning af Indlandsisen. Om nogen „Interglacial Tid“ kan der saaledes slet ikke være Tale. For det andet viser Tilstedeværelsen af saadanne „døde“ Ismasser i Dalstrøgene, at disse ikke er udformede af det Smeltevand, som har aflejret Terrassen, men at de maa være ældre. Hvorvidt de oprindelig er opstaaede ved subglaciale Smeltevandsfloders Virksomhed eventuelt i Forbindelse med Iserosion, eller om det er Dale, som er ældre end den sidste fuldstændige Isdækning af denne Egn, er et Spørgsmaal, der vanskeligt lader sig besvare med fuld Sikkerhed, selv om den sidste Mulighed allerede paa Grund af Dalenes betydelige Størrelse forekommer at

¹⁾ USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2. S. 145 o. f.

²⁾ USSING, N. V. 1903. Geologi og Overfladeforhold. TRAP, J. P. Kongeriget Danmark, 3die Udg. Bd. 1. S. 20.

USSING, N. V. 1904. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. 2den Udg. S. 264.

være den sandsynligste. Den forholdsvis store Dybde af flere af Søerne synes ganske vist kun at kunne forklares gennem Erosion af subglaciale Vandløb, men paa den anden Side maa man antage, at det under Isen fremstrømmende Vand som Regel har søgt til Terrainets laveste Steder og derfor har fulgt de oprindelige Dalstrøg, naar disse havde en Retning, der faldt nogenlunde sammen med Isens Bevægelsesretning.

Hvad specielt angaar den Del af Gudena Dalen, som strækker sig fra Vestbirk hen imod Salten Langsø, da synes alt at tale for, at man virkelig her staar overfor en meget gammel Dal. Thi, som det tidligere er omtalt, har den en tydelig Fortsættelse imod Sydøst, nemlig Hansted Lavningen, fra hvilken den kun adskilles ved en smal og relativt ung Morænebarriere, og man ledes saaledes til at antage, at der her paa et tidligere Tidspunkt har eksisteret en Dal, som forbandt Salten Aa's Dalstrøg med Horsens Fjord. Men hvor gammel denne Dal er, og under hvilke nærmere Omstændigheder den er dannet, er Spørgsmaal, der foreløbig ikke lader sig besvare, og som heller ikke direkte vedkommer den foreliggende Opgave.

Om det Afsnit af Dalens Udviklingshistorie, som her interesserer mest, nemlig det, der angaar den Tid, da Vandløbene fra den sydfor staaende Isrand søgte ad denne Vej imod Nord, kan derimod Smeltevandsaflejringen i Dalen give Oplysninger. Thi selv om man, som det vil være fremgaaet af det foregaaende, nu ikke længere træffer en sammenhængende Terrasseflade, saa er dog de enkelte Terrassestykker saa talrige og tillige saa store, at de kan give et Begreb om det oprindelige Udseende af Dalbunden. Ser man saaledes bort fra de omtalte Lavninger og Huller samt fra Virkningerne af den senere Erosion, faar man et Billede af en flad Dalbund med Fald imod Nord. Dog træffer man ogsaa her langs med Dalsiderne regelmæssigt formede „Aflejringskraaninger“, der strækker sig fra Terrassefladen et Stykke op ad Skrænten ganske paa samme Maade, som det ovenfor er beskrevet under Omtalen af Dalsiden Vest for Vestbirk. Dette Forhold kan iagttages hele Vejen ved Foden af Dalens Vestskraaning samt langs med den nordlige Halvdel af den østlige Dalside.

Paa Grund af den omtalte Dannelse maa man ved Vurderingen af Smeltevandsaflejringens Højdeforhold kun tage Hensyn til de flade Terrassestykker noget ude fra Dalsiderne, og vil man bestemme Størrelsen af Faldet, sker det sikrest ved Hjælp af Aflejringsens laveste Dele ude i Midten af Dalen, idet man saa nogenlunde kan angive, hvor de forskellige Horizontalkurver oprindeligt har gaaet tværs over Dalbunden. Saaledes maa man antage, at 155 Fods Kurven (49 M.) har passeret Dalen sammen med Isranden Nord for Vestbirk

og 150 Fods Kurven (47 M.) ca. 2 Km. nordligere samt endelig, at 135 Fods Kurven (42 M.) har gaaet over Terrassen straks udenfor Dalens Munding i Salten Aa's Dalstrøg. Man har altsaa et samlet Fald af ca. 20 Fod (6,3 M.) paa det omtrent 9 Km. lange Dalstykke eller i Gennemsnit 1 : 1400.

Dette Resultat er for saa vidt forbavsende, som det viser, at Faldet af Smeltevandsaflejringen her er større end i den nærmest sydligere Del af Gudena Dalen, paa Strækningen imellem Aale og Vestbirk, og Forøgelsen af Faldet er ret betydelig, nemlig fra 1 : 2000 til 1 : 1400 eller godt 40 %. Der synes herved at fremkomme en Bekræftelse paa den tidligere gennem andre Forhold begrundede Antagelse, at Isen i Egnen omkring Vestbirk har strakt sig frem som en lokal, lille Istunge i det store Dalstrøg og derved presset det sydfra kommende Vandløb over imod Dalens Vestside. Thi kun en saadan Hæmning i Udløbet til det nordligere Dalstrøg kan have bevirket Aflejringen af den temmelig svagt faldende Terrasse i Dalen ovenfor Indsnævringen, samtidig med at Floden, efter at den havde passeret Snævringen og faaet frit Løb ned igennem den store Dal, i Forening med det nytillkomne Smeltevand har kunnet danne en Terrasse med betydeligt større Fald. Man ledes saaledes til paa en Maade at betragte hele det sydlige System af Smeltevandsaflejringer som en selvstændig Dannelse svarende til et Tilløb til Hovedfloden ganske sideordnet med de øvrige Vandløb, der fra den nordligere Del af Isranden ligeledes søgte ud til Gudena Dalen. Selve Hovedfloden er da repræsenteret ved en Terrasse, som lader sig følge ned igennem Gudena Dalen fra *Vestbirk til Randers Fjord* med et Fald, der aftager jævnt og uden Spring fra den her betragtede Egn ned igennem Dalen, medens de forskellige Aflejringer, som skyldes Tilløbene til denne, har et større eller mindre Fald, der kun er betinget af de lokale Forhold og ikke staar i nogen Forbindelse med Faldet af Hovedflodens Terrasse paa det Sted, hvor de støder til denne. Det har i denne Sammenhæng ingen Betydning, at det sydfra kommende og største Tilløb er opstaaet ved Forening af adskillige større og mindre Vandløb fra Isranden, og at ogsaa det ved Ullum Kær paa en Maade deles i to forskellige Afsnit.

Terrassen ved Vestenden af Mossø. Vest for Mossø munder den ovenfor beskrevne Dal ud i det langstrakte, lave Strøg, i hvis østlige Del Mossø og Skanderborg Sø ligger, og som imod Vest fortsætter sig som en smal og dalagtig Lavning, der dog har en stærkt kuperet Bund, ind i det høje Terrain Syd for Silkeborg. Smeltevandsaflejringen, som her er endnu mere opløst i enkelte Terrassestykker end

længere sydpaa, strækker sig tværs over denne Lavning, bøjer derefter brat imod Øst og følger dens Nordside norden om Vestenden af Mossø hen til Gudensø. Sammen med denne sidste bøjer ogsaa Smeltevandsaflejringen atter imod Nord ind igennem den smalle Forbindelsesdal, som Gudenaa endnu benytter for at naa det store Dalstrøg Nord for Himmelbjerget.

Saa vel det, at Smeltevandsflejringen deler sig i enkelte Terrassestykker, som det ejendommelige Forhold, at den strækker sig tværs over og derefter langs med Nordsiden af et lavere liggende Omraade, maa skyldes, at der under dens Dannelse endnu fandtes meget betydelige „døde“ Ismasser i denne Egn. Thi man maa ikke alene betragte Lavningerne og Hullerne i selve Grusterrassen som Steder, hvor der har ligget mindre Isrester, men ogsaa Salten Aa's Dal og hele det store Mossø Bassin maa have været isfyldte paa det her betragtede Tidspunkt, og det drejer sig saaledes om saa store Ismasser, at man virkelig kunde fristes til at anvende Betegnelsen „døde Bræer“ paa dem.

Angaaende Højdeforholdene kan det siges, at Terrassefladen her danner en direkte Fortsættelse af Terrassen i den sydligere Dal. Faldet er omtrent det samme, dog nærmest lidt mindre, idet Højden aftager omtrent 13 Fod (4 M.) paa den ca. 7 Km. lange Strækning. I denne Forbindelse er der naturligvis set bort fra, at Overfladen stiger endog ret betydeligt ind imod den nordfor liggende Skraaning, idet der er aflejret en Del Materiale foran Munden af de større og mindre Erosionskløfter i denne paa ganske lignende Maade, som det saa ofte ses. Naar det nævnes her, er det kun, fordi man sjældent træffer saa store Aflejringer som paa dette Sted; navnlig Syd for Rye findes en imponerende Kogle, som dog tildels gaar over i lignende Dannelser ud for de vestligere Kløfter.

D. Udviklingen af de nuværende Vandløb i Horsens Egnen.

I de foregaaende Afsnit er der gjort Rede for, hvorledes Indlandsisen paa et vist sent Tidspunkt af Istiden strakte en Arm ind igennem Horsens Fjord, og der er givet en Skildring af de Randmoræner og Smeltevandsdannelser, som skyldes denne Gletscher. Det vil heraf være fremgaaet, at den beskrevne Isstrøm kun har foraarsaget forholdsvis smaa Forandringer af Overfladeforholdene, idet Højdepar-

tierne og de store Lavninger indenfor denne Egn allerede eksisterede paa det her betragtede Tidspunkt og senere kun er undergaaede mindre Forandringer. Horsens Fjord Gletscherens Virksomhed har nemlig i Hovedsagen været indskrænket til en lokal Omformning af Overfladen, og kun undtagelsesvis er der ved dens Rand bleven dannet større Bakkepartier, og selv om Smeltevandets Virkninger er mere iøjnefaldende, saa naar de af Smeltevandsfloderne nydannede Dale dog hverken i Bredde eller Dybde op ved Siden af det gamle Dalstrøg, som fra Horsens Fjord strakte sig imod Nordvest ind i det midtjydske Højland. Ikke desto mindre har Opholdet af Isranden langs med den beskrevne Israndslinje haft en meget væsentlig Indflydelse paa Udviklingen af Vandløbene, og man ser, hvorledes Vandet den Dag idag saa godt som overalt følger de samme Veje som de gamle Gletscherfloder for ligesom disse at samles til et enkelt Vandløb og ad den lange Omvej igennem Gudena Dalen at naa ud til Havet.

Det nuværende Vandskel imellem Gudena og Vandløbene til Horsens Fjord følger for største Delen Israndens Moræneaflejringer, og det er saaledes disse, der nu — i Stedet for som tidligere selve Isen — forhindrer Vandet i at løbe direkte til Horsens Fjord. Dette er til Trods for Randmorænerne ringe Størrelse bleven muligt ved, at Smeltevandet langs med disse havde banet Veje, som de senere Vandløb naturligt har kunnet benytte. Det eneste Sted, hvor der oprindeligt var en dyb Forbindelse imellem Horsens Fjord og det Indre af Jylland, nemlig igennem Hansted Lavningen til Gudena Dalen Nord for Vestbirk, er tillige et Sted, hvor Forholdene maatte begunstige en rigelig Aflejring af Morænemateriale i Isens Randzone, saa at Isranden har formaaet at danne Vandskel ogsaa tværs over denne store Dal. Resultatet blev derfor, at Afvandingen, efter at Isen var smeltet bort, skete paa samme Maade, som medens Horsens Fjord endnu var isspærret.

Hvad endelig den postglaciale Erosion angaar, da har den i den her betragtede Egn kun været ringe. Efterhaanden har en Del mindre Vandløb fra Horsens Fjord gravet sig Smaadale ind i det omgivende Terrain, men kun et enkelt af disse har naaet at over-skære Israndslinjen og overtage Afvandingen af en Strækning udenfor denne. Det er Gjesager Aa, som fra Bygholm Aa's smalle, men dybe Dal har gravet sig en bugtet Erosionskløft ind igennem det lave Parti nærmest bagved Israndslinjen Nordøst for Krollerup og videre sydpaa et Stykke ind i Løsning Hedesletten, saa den efterhaanden har overtaget Afvandingen af denne og det nærmest vestligere Terrain samt et kort Stykke af Krollerup-Ullum Dalen. Den Forandring, der herved er sket, faar man maaske bedst et Begreb om ved at be-

tragte den tilsvarende Forskydning af Vandskellet imellem Gudenaa og Vandløb til Horsens Fjord. Medens det umiddelbart efter Isens Forsvinden maa have fulgt Israndslinjen fra det udstrakte Højdeparti Nord for Vejle først Syd om Engom Dalen og derefter nordpaa langs med Hedeslettens Østgrænse, strækker det sig nu ned ad det nævnte Højdepartis Nordøstskraaning til Krollerup-Ullum Dalen og gaar tværs over denne til Skjelhøj Morænen, som det derefter følger imod Nordvest.

III. Indlandsisen i Aarhus Egnen.

A. Almindelige Bemærkninger.

1. Højdeforholdene i den mellemste Del af Østjylland.

Igennem en stor og bugtet Dal løber Gudenaa fra Egnen Nordvest for Horsens nordpaa igennem Jydland. Først naar den kommer op i Nærheden af Viborg, bøjer den i østlig Retning for igennem Randers Fjord at naa Forbindelse med Kattegat. Den afskærer paa denne Maade et stort Stykke af det østjydske Højland, der, naar man foreløbig ser bort fra Grenaa Halvøen, kan karakteriseres som et højtliggende Omraade, gennemgaaende med store og rolige Former. Dog deles det ved forskellige langstrakte Lavninger og Dalstrøg i mere eller mindre adskilte Partier, selv om dette sidste Forhold ikke er slet saa fremtrædende her som i den nærmest nordfor liggende Egn.

Det er allerede nævnt, at der Nord for det tidligere beskrevne Terrain findes et udpræget lavt, i Vest—Øst gaaende Strøg, som huser Sørækken: Salten Langsø, Mossø og Skanderborg Sø. Dette lave Omraade har dog ikke nogen egentlig Dalkarakter, og navnlig fremtræder den østlige Del som store og dybe, noget uregelmæssigt formede Lavninger, ja imellem Mossø og Skanderborg Sø ligger der endog en ikke helt ubetydelig Bakkeknude. I Overensstemmelse hermed fortsættes det heller ikke ud til Kysten, men afbrydes ved, at Terrainet Øst for Skanderborg Sø stiger til en betydelig Højde, saaledes at der her dannes et bredt Overgangsled imellem det forholdsvis høje Land Nordøst for Horsens og det udstrakte Højdeparti Syd for Aarhus Dalen.

Et iøjnefaldende højt Omraade, hvis højeste Punkt ØNØ. for Landsbyen Fruering naar op til 421 Fod (132 M.), strækker sig saaledes med en Længderetning i Nordvest—Sydøst igennem Terrainet Øst for Skanderborg Sø til henimod Odder, og det er her et ikke ubetydeligt Areal, som ligger mere end 300 Fod (94 M.) over Havet. Længst imod Sydøst er Højden mindst og varierer omkring 300 Fod (94 M.). Herfra sydpaa, i Terrainet Vest for Odder, falder Højden yderligere noget, saa at Forbindelsen med Partiet omkring Møgelbjerg Nord for Horsens Fjord er lidt lavere. Tillige indsnævres denne Forbindelse ved, at hele den Kyststrækning, der ligger Øst for den Dal, som fra Kysinge Nor strækker sig over Odder til Horsens Fjord, er et udpræget lavt Omraade, og ved at der fra den anden Side, fra Skanderborg Sø, strækker sig en stor Lavning af samme Type som selve Søbækkenet imod Sydøst ind i denne Forbindelse.

Imod Nord adskilles Fruering Højdepartiet ved Solbjerg Sø og dennes dalagtige Forlængelser til begge Sider fra et udstrakt, plateauagtigt Omraade Syd for Aarhus Dalen. Dette er bredest imod Øst, hvor det naar helt ud til Kysten imellem Kysinge Nor og Munden af Aarhus Dalen, men bliver noget smallere vestpaa ind imod Gudena Dalen. Højden er gennemgaaende størst imod Vest, hvor betydelige Strækninger ligger mere end 300 Fod (94 M.) over Havet. Af Højdepunkter her skal nævnes Ravnehøj Vest for Dover Kirke; den naar op til 366 Fod (115 M.), og omtrent lige saa høje er flere Punkter i Terrainet nærmest Nordøst herfor. Den største Højde naar dog Toppen af Bakkeknuden Bjørnehjerge, der ligger umiddelbart Syd for Aarhus Dalen og 17 Km. VSV. for Aarhus, med 411 Fod (129 M.). Længere østpaa aftager Højden noget, men ogsaa her hæver enkelte Punkter sig til betydelige Højder, saaledes Bavnehøj i Nærheden af Hasselager Station til 308 Fod (97 M.), og længst imod Øst rager det ejendommelige Bakkeparti Holme Bjerger betydeligt op over Omgivelserne og naar i Jelshøj 407 Fod (128 M.). Syd herfor er Terrainet lavere; der kan her nævnes Mandshoved paa 282 Fod (89 M.) og en Bakke Øst for Malling paa 258 Fod (81 M.).

Det er allerede nævnt, at dette Terrain imod Nord begrænses af et stort Dalstrøg, nemlig den store Aarhus Dal, som fra Aarhus strækker sig imod VSV. ind i Landet for ved Rye Station at naa Gudena Dalen, der paa det følgende Stykke herfra til Silkeborg gaar næsten i Forlængelse af den. Den danner saaledes en direkte Forbindelse imellem Kattegat og Gudena Dalen; men dens Bund ligger paa en kort Strækning lidt højere end Gudena's Vandspejl og hindrer derved denne i at slippe ud her. Det nuværende Vandskel passerer Dalen over en kun godt 1 Km. bred Morænebarriere, hvis

højeste Punkt er 136 Fod (43 M.) over Havet, og hvori det laveste Pas ligger paa godt 110 Fod (35 M.).

I meget minder Aarhus Dalen om de sydligere Fjordlavninger. Med jævne, afglattede Skraaninger falder Højlandet fra begge Sider ned imod den brede Dalfure, og baade de morænedækkede Skraaninger og hele Dalstrøgets Form bærer tydelige Vidnesbyrd om Isens omformende Virksomhed. Et saadant Præg af en udvisket Dal udmærker de østligste to Tredjedele af det ca. 30 Km. lange Dalstrøg. I Modsætning hertil har det sidste Stykke meget mere af den Karakter, som kendetegner Dalene i Silkeborg Egnen; Dalsiderne bliver stejle Erosionsskraaninger, og Dalbunden er udpræget gruset samt rummer mange større og mindre Søer og tørvefyldte Lavninger; Aarhus Dalen gaar saaledes paa den naturligste Maade over i Gudena Dalen ved Rye Station.

I en Afstand af 3—6 Km. Nord for Aarhus Dalen og omtrent parallelt med den løber et andet, dog ikke slet saa betydeligt, Dalstrøg, som for største Delen nu afvandes af Lygumgaard Aa, der igennem en smal og dyb, ganske ung Erosionskløft ca. 11 Km. Vest for Aarhus løber ned til Aarhus Dalen. Ogsaa dette Dalstrøg sammensættes af Stykker med væsentlig forskellig Karakter. Den vestligste Del gennemskærer som en smal Dal det høje Terrain noget Øst for Silkeborg og afvandes paa en lang Strækning af Linæa, der falder i Gudena 7 Km. ØNØ. for Silkeborg. Længere imod Øst breder Dalstrøget sig ud til en flad, langstrakt, dalagtig Lavning, hvorigennem den øvre Del af Lyngbygaard Aa løber. Ved den østlige Ende heraf bøjer Strøget imod Nordøst for som en smal, men temmelig dyb, dallignende Rende, der gaar forbi Mundelstrup, og igennem hvilken man har ført Hovedbanen fra Aarhus til Lillea Dalen, at danne en Forbindelse med den udprægede Fortsættelse af den sidstnævnte Dal imod Øst til Aarhus Bugt.

Det beskrevne Dalstrøg samt Aarhus Dalen og et Stykke af Gudena Dalen afskærer saaledes et langt og smalt Parti af Højlandet. Dette danner dog ikke et ensartet Højdedrag, men deler sig naturligt i tre forskellige Afsnit, som ganske svarer til de tre Dele af det nordfor liggende Dalstrøg. Længst imod Vest er det et højtliggende Bakkeland, der strækker sig vestpaa helt hen til Silkeborg, og som slutter sig meget nær til det nordfor liggende Terrain. Her findes betydelige Højder; saaledes er en Bakke Nord for Vestenden af Julsø 365 Fod (115 M.) høj, og længere imod Øst naar Klankhøj Vest for Laasby 382 Fod (120 M.). Øst herfor og svarende til den brede og flade Del af Lyngbygaard Aa's Dalstrøg træffer man derimod kun et temmelig lavt og fladt Terrain imellem de to Dale. Højden er som Regel omkring 150 Fod (47 M.). Det højeste Punkt er

Toppen af det lille Højdeparti ved Klank, som naar 213 Fod (67 M.), og østligere kan nævnes en lille Bakke ved Labing paa 187 Fod (59 M.). Endelig har man længst imod Øst igen et udpræget Højdeparti, idet Terrainet Sydøst for Mundelstrup Dalen og imellem Aarhus Dalen og Forlængelsen af Lilleaa Dalen danner en stor, afrundet Bakkeknude. Højden er her atter større, og det højeste Punkt, som ligger NNV. for Aarhus, hæver sig til 284 Fod (89 M.) over Havet.

Nord for Lygumgaard Aa's Dalstrøg og iøvrigt begrænset af Gudena Dalen og Lilleaa Dalen findes et udstrakt, temmelig ensartet, højtliggende Terrain. Ganske vist gennemskæres det af en smal, men dyb Kløft, der gaar fra Nordvestenden af Lilleaa Dalen til Gudena Dalen Nordøst for Silkeborg og saaledes deler dette Omraade i to omtrent lige store Dele, men da den nævnte Kløft i den her betragtede Sammenhæng ingen Betydning har, og da de to Dele slutter sig meget nøje til hinanden, skal de her behandles under ét.

Ser man bort fra de Uregelmæssigheder, som er betingede af større og mindre Erosionskløfter, fremtræder dette Terrain med overordentlig flade, store og rolige Overfladeformer. Kun længst imod Syd er det lidt mere bakket, og man træffer ogsaa her de største Højder. Det højeste Punkt er Sorring Loddenhøj, der naar 470 Fod (148 M.), og et Stykke ØNØ. herfor ligger den 401 Fod (126 M.) høje Bakkeryg Nord for Skjøring. I det øvrige Terrain gaar Højden kun sjældent op over 300 Fod (94 M.), og den aftager som Regel svagt fra de centrale Partier ud imod Siderne og navnlig imod Vest henimod Gudena Dalen. Af andre høje Punkter kan nævnes en ganske flad Bakke ved Frijsenborg paa 335 Fod (105 M.) og den 345 Fod (108 M.) høje Dejhøj Sydvest for Langaa.

Nordøst for dette Terrain findes en smuk Dal, igennem hvilken Lilleaa løber for ved Langaa at forene sig med Gudena. Det er allerede antydet, at denne Dal kan følges ud over den Strækning, som benyttes af den nuværende Lilleaa, idet den fortsætter sig som et bredt Dalstrøg i østlig Retning ud til Aarhus Bugt ca. 6 Km. NNØ. for Aarhus. Den danner saaledes, ligesom Aarhus Dalen, en naturlig Forbindelsesvej imellem Kattégat og Gudena Dalen, og den over-skæres nu paa ganske lignende Maade af et Vandskel, der gaar over Dalen langs med nogle flade Smaabakker, som ved Landsbyen Søften hæver sig til 151 Fod (47 M.) over Havet. Den Del af Dalstrøget, der gaar herfra ned til Aarhus Bugt, staar ligesom Østenden af Aarhus Dalen med jævne, udviskede Skraaninger, medens hele den øvrige, nordvestligere Strækning fremtræder som en udpræget Smeltevandsdal.

Nordøst for Lilleaa Dalen og strækkende sig ud imod Grenaa

Halvøen findes et lignende højt Terrain som paa den modsatte Side af Dalen. Ogsaa her er Overfladeformerne for det meste store og jævnt afrundede, og endvidere lægger man Mærke til, at de flade Bakkedrag ofte antager en bestemt Længderetning i omtrent NV. t. V. —SØ. t. Ø. Særligt iøjnefaldende er dette, naar man ser paa den lange, svagt hvælvede, men mægtige Bakkeryg, som fra Egnen Nord for Hadsten strækker sig hen imod Kalvø Vig, og i hvis Forlængelse til den modsatte Side den mægtige Bakkeknude Lysnet Nord for Lerbjerg Station hæver sig til den anselige Højde af 417 Fod (131 M.). Af høje Punkter paa det nævnte Bakkedrag kan endvidere fremhæves Digrhøj Nordøst for Spøring paa 325 Fod (102 M.) samt Ballehøj og lidt Øst herfor Kampehøj ved Vorre, begge de to sidste paa 372 Fod (117 M.). Længere sydpaa er Terrainet ikke saa højt, men dog ingenlunde lavt; saaledes naar f. Eks. Byhøj ved Trige 306 Fod (96 M.). Ogsaa imod Nordøst aftager Højden efterhaanden, saa at man i det af Daldannelser noget sønderdelte nordøstligste Terrain kun sjældent træffer Punkter, der naar op over 200 Fod (63 M.), saaledes som f. Eks. Sorthøj Vest for Hørning, der er 206 Fod (65 M.) høj, og den iøjnefaldende, fremspringende, 252 Fod (79 M.) høje Bakke Helligbjerg straks Vest for Gl. Estrup.

2. Oversigt over Israndsdannelser.

Medens Indlandsisen laa i den sydlige Del af Kattegat og herfra strakte sig langt imod Vest ind igennem Horsens Fjord og dens vestlige Forgreninger, er den ogsaa naaet et Stykke ind i den nordfor liggende Del af Østjylland; men her fandtes ingen store Lavninger eller Dalstrøg, der som Horsens Fjord kunde fremme Isens Bevægelse ind i Landet. Ganske vist har man i Aarhus Dalen en lignende bred, fjordagtig Lavning, men dennes Retning i ØNØ.—VSV. var saa afvigende fra Isens Hovedbevægelsesretning — i denne Egn fra Sydøst til Nordvest —, at den kun i ringe Grad har kunnet begunstige Isens Fremtrængen her, og det samme gælder den sydøstlige Ende af Lilleaa's Dalstrøg Nord for Aarhus. Isen er derfor ingen Steder i det nordligere Terrain naaet blot tilnærmelsesvis saa langt imod Vest som i Horsens Egnen, og Grænsen for dens Udbredelse følger saa nogenlunde Kysten, dog saaledes, at den nordpaa nærmer sig mere og mere til denne, for sluttelig at bøje ud igennem Grenaa Halvøen.

Paa store Strækninger har Isen strakt sig frem over temmelig højtliggende Terrain. Hvor dette har været Tilfældet, var dens Mægtighed i Randzonen kun forholdsvis ringe, og den Ismasse og

dermed den Mængde af Morænemateriale, som førtes helt ud til Isranden, blev paa saadanne Steder mindre betydelig. Man kan derfor ikke vente at finde Israndslinjen fremhævet ved store Randmorænevolde paa Steder, hvor den gaar hen over højtliggende Strækninger. Har Terrainforholdene tillige bevirket, at Isranden kom til at staa i en Retning, der afveg kendeligt fra den Vinkelrette paa Isens Hovedbevægelsesretning, spredtes det sparsomme Morænemateriale langs med Isranden yderligere over en længere Strækning.

I Omstændigheder som de antydede maa man se Forklaringen paa, at man i den her betragtede Del af Østjylland paa Strækninger kun finder forholdsvis sparsomme og i landskabelig Henseende lidet fremtrædende Israndsdannelser, som ikke taaler Sammenligning med de ganske vist ofte smaa, men dog saa smukt udviklede Randmoræner i Horsens Egnen eller med Grenaa Halvøens storslaaede Randmorænelandskaber.

I et saadant Terrain, hvor Randmorænedannelserne paa Steder kun er svagt udviklede, saa at man ofte kan staa i Tvivl om, hvorvidt Fortsættelsen er at søge til den ene eller den anden Side, kunde det maaske synes betænkeligt at angive en bestemt, sammenhængende Israndslinje, idet der ingen Garanti er for, at man ikke ved at kombinere forskellige, slet ikke sammenhørende Randmorænestrøg faar et falskt Helhedsbillede frem. Men findes der udenfor Isranden et System af Smeltevandsdannelser, der samler sig til en sammenhængende Flodaflejring, kan disse give værdifulde Oplysninger om Samtidigheden af spredte Randmorænedannelser, og noget saadant er netop Tilfældet i denne Egn. Gudena Dalen, som førte den fra Horsens Egnen kommende Smeltevandsflod i en stor Bue udenom Isranden til den isfri, nordlige Del af Kattegat, har tillige tjent som Samlerende for det Smeltevand, som strømmede ud fra Isen længere imod Nord. Man ser derfor paa adskillige Steder, hvorledes der fra Grusterrassen i Gudena Dalen strækker sig Smeltevandsaflejringer ind i det østligere Terrain, og de øverste Ender af disse betegner saaledes en Række Punkter af den søgte Israndslinje. Studiet af Moræneaflejringerne giver da som Regel tilstrækkelig sikre Oplysninger om Isens Udbredelse paa de mellemliggende Strækninger, og ad denne Vej bliver det muligt at bestemme en sammenhængende Israndslinje igennem den her betragtede Del af Østjylland.

Moræner. Den forskellige Karakter af Randmorænedannelserne i denne Egn giver en naturlig Deling af Israndslinjen i flere Afsnit. Længst imod Syd træffer man en Strækning, hvor Isranden har staaet nogenlunde paa tværs af Isens Bevægelsesretning, og da tillige

det bagved liggende Terrain ikke kan have virket særlig stærkt hæmmende paa Isens Udbredelse, finder man her Israndslinjen betegnet ved smukke Randmorænedannelser. Hertil hører den store Morænevold, som forbi Hylke Station strækker sig nordpaa ned til Skanderborg Sø, samt et overordentlig stenet, smaabakket Rand-

Fig. 2. Oversigtskort over Israndslinje og Smeltevandsfloder i Aarhus Egnen.
1 : 500000.

morænestrøg, der fra Skaarup ved Sydøstenden af Søen gaar i nord-østlig Retning op ad Skraaningen til lidt Øst for Fruering.

Ved dette sidste Punkt bøjer Israndslinjen fremad og fortsætter sig nu paa en Strækning af ca. 12 Km. imod NNV. hen over det høje Terrain Nordøst og Nord for Skanderborg, forbi Landsbyen Mesing, Vest om Bjørnebjerg og ned i Aarhus Dalen Syd for Høver. Paa hele dette Stykke er Israndens Morænedannelser kun lidet iøjne-

faldende, idet de som Regel kun fremtræder som et meget smaat kuperet Bælte nærmest bagved Israndslinjen.

I Aarhus Dalen har Isen naaet sin største Udbredelse imod Vest i dette nordlige Terrain, og Israndslinjen bøjer herfra atter tilbage imod Nordøst. Den passerer foruden Aarhus Dalen ogsaa Lygumgaard Aa's Dalstrøg, idet den gaar skraat over den laveste Del af det mellemliggende Terrain. Nord for Lygumgaard Aa fortsætter den sig et Stykke imod ØNØ. omtrent til Mundelstrup. Paa den angivne Strækning har Isranden staaet i et Terrain, der var betydeligt lavere end den nærmest sydligere Egn, og da tillige Aarhus Dalen dannede en nogenlunde bekvem Vej ind til en Del af dette Terrain, finder man i Israndszonen her betydelige Moræneaflejringer, der ikke blot danner en Barriere tværs over Aarhus Dalen, men som ogsaa fremtræder som et bredt, uroligt kuperet Bælte med betydelige Aflejringer af stærkt stenet Materiale. Ydergrænsen for dette Bælte betegner den egentlige Israndslinje, og denne danner tillige paa store Strækninger Grænse for forskellige Smeltevandsaflejringer.

Fra Mundelstrup maa Isranden antages atter at have bøjet fremad ind i Lilleaa Dalen, som den har krydset paa det Sted, hvor Morænebarrieren ved Søften nu danner Vandskel i Dalen. Videre herfra bøjer Israndslinjen noget tilbage op ad Skraaningen imod det nordøstligere, høje Terrain og kan følges hen over dette som en udpræget Grænse imellem et Omraade med en smaa kuperet og meget uroligt formet Overflade bagved Isranden og de store, jævne Bakkedrag udenfor. Retningen er her VSV.—ØNØ. ud imod den sydlige Del af Grenaa Halvøen.

Smeltevandsdannelser. Den angivne Israndslinje forbinder en Række Punkter, hvorfra forskellige Smeltevandsaflejringer strækker sig ud imod Gudena Dalen. Thi overalt, hvor Isranden har krydset et Dalstrøg eller staaet frem i en Lavning, der havde Forbindelse med Gudena Dalen, er Smeltevandet strømmet til for ad denne Vej at naa ud til Havet.

Det sydligste Sted, hvor man træffer Smeltevandsaflejringer, er i Egnen omkring Skanderborg Sø. Saavel Øst for Søen som navnlig i Terrainet nærmest omkring Skanderborg findes udprægede Terrassedannelser, der fortsætter sig ud til det nordøstlige Hjørne af Mossø. Herfra maa Vandet antages at have fulgt den lille Dal, hvori Vessø ligger, ud til Gudena Dalen.

Det næste Punkt, hvor der er kommen Smeltevand ud fra Isen, finder man i den store Aarhus Dal Syd for Høver. Herfra vestpaa har Dalen ganske den samme Karakter som den Del af Gudena

Dalen, der strækker sig i dens Forlængelse til Silkeborg, og i dens Bund finder man Sand og Grus afsat af Smeltevand, der her har haft frit Løb imod Vest.

Helt anderledes har Forholdene været i den nordfor liggende Dal, der nu afvandes af Lygumgaard Aa. Den brede Del af dette Dalstrøg stod kun ved en smal og temmelig højt liggende, lille Dal i Forbindelse med Gudena Dalen, og da Isen spærrede dets Østende, opstod der her en stor Smeltevandssø, i hvilken der bundfældedes Sand og Ler. Disse Jordarters Udbredelse viser, at Søens Begrænsning paa temmelig store Strækninger dannedes af selve Isen.

Baade det Smeltevand, der kom fra Skanderborg Egnen, og det, som fulgte Aarhus Dalen, naaede i Nærheden af Rye Station ud til Gudena Dalen og forenede sig her med den fra Horsens Egnen kommende Smeltevandsflod. Denne fulgte Gudena Dalen videre nedad og modtog noget nedenfor Silkeborg Afløbet fra den ovenfor nævnte Smeltevandssø. Derefter følger en lang Strækning, paa hvilken Gudena Dalen ikke har modtaget noget Tilløb fra den østligere staaende Isrand; først ved Langaa munder den næste Smeltevandsdal, Lilleaa Dalen, ud i den. Paa hele Strækningen igennem Gudena Dalen har Smeltevandet afsat Sand og Grus, der nu danner en Terrasse i Dalen. Noget nordpaa, hvor der paa flere Steder optræder endog tre Terrasser, er den her betragtede den laveste og yngste.

Det nordligste Sted, hvor der er strømmet Smeltevand ud fra Isranden er dér, hvor denne stod tværs over Lilleaa Dalen. Fra dette Punkt strækker en smuk Smeltevandsdal med en flad, gruset Terrasse sig imod Nordvest til Gudena Dalen ved Langaa. Herfra er de forenede Vandløb løbet videre imod Nordøst forbi Randers og ud igennem den nuværende Randers Fjord.

B. Morænedannelser.

1. Isen Sydøst for Skanderborg.

Sammenstødet mellem Horsens Fjord Gletscheren og Isen nordfor. Imod Nordøst stødte Horsens Fjord Gletscheren sammen med den Del af den nordfor liggende Is, som fra Odder Egnen trængte frem over det smalle og ikke særligt høje Omraade, der forbinder Højdedraget ved Fruering med Partiet omkring Møgelbjerg Nord for Horsens Fjord. Dette forholdsvis lave og smalle Pas har tilladt Isen her at overskride Højdedraget og flyde ned i den fra Skander-

borg Sø imod Sydøst udgaaende Lavning, og denne Del af Isen har derfor dannet en næsten selvstændig lille Isstrøm, der, hvad Bevægelsen angik, var nogenlunde uafhængig af Horsens Fjord Gletscheren, men gik mere jævnt over i det nordligere Isdække.

Til Gunst for en saadan Antagelse taler Forholdene i Terrainet bagved det Punkt, hvor Randen af den her betragtede Is stødte til Isranden paa Nordsiden af Elbjerg Højdepartiet. Thi ikke blot træffer man her det allerede tidligere omtalte Morænegrusomraade ved Ustrup, der dog nærmest slutter sig til den sidstnævnte Isrand, men fra den sydlige Ende af Hylke Morænen kan man imod Sydøst følge et Strøg af toppede Bakker maaske endog saa langt imod Sydøst som til selve Partiet omkring Møgelbjerg, der har en ganske lignende Overfladeform. Det forekommer rimeligt at tyde disse Dannelser gennem Antagelsen af to her sammenstødende, parallel flydende Isstrømme, og det er muligt, at man her staar overfor de efterladte Rester af en i Sømmen imellem disse fremsmeltende Overflademoræne.

Hylke Randmorænen. Paa langt sikrere Grund befinder man sig dog, naar man vil undersøge Morænedannelserne ved selve Randen af denne Isstrøm. Man træffer nemlig her en overordentlig smuk og udpræget Randmoræne, der forbi Hylke Station strækker sig nordpaa ned imod Skanderborg Sø. Med en Længde af noget over 2 Km. hæver den sig som en sammenhængende, høj Vold op over Omgivelserne og er meget iøjnefaldende i Terrainet. Da Størrelsen tiltager noget nedad Skraaningen, er den absolute Højde meget nær den samme hele Vejen. Syd for Hylke Station er saaledes det højeste Punkt 247 Fod (78 M.) over Havet, og nøjagtigt den samme Højde har Toppen Øst for Hylke Kirke. Endelig hæver Morænen sig længst imod Nord i Faarbjerget til 253 Fod (79 M.).

Materialet i Randmorænen er for en stor Del sorteret, idet der findes en Del rullet Grus og noget Sand; dog træffer man ogsaa saavel Morænegrus som Moræneler. Den hurtige Maade, Jordbunden kan veksle paa, antyder meget uregelmæssige Lejringsforhold.

Imod Nord breder Randmorænestrøget sig noget, idet der bagved den nordlige Ende af den omtalte Morænevold begynder at optræde mere isolerede Bakker, der dog endnu har meget af Randmorænekarakteren, og som saadanne ikke helt sammenhængende Bakker fortsætter Strøget sig, bøjende imod Nordøst, ud til den sydøstlige Gren af Skanderborg Sø. Jordbunden er ogsaa paa dette sidste Stykke en Del vekslende, men dog overvejende gruset og sandet.

Ved Skanderborg Sø afbrydes Randmorænen; man maa antage,

at Isranden her har fortsat sig i østlig Retning til Landsbyen Skaarup, thi fra denne By strækker der sig imod Nordvest langs med Søbredden et smukt Terrassestykke, som ifølge sin Højde slutter sig til Terrasselandskabet paa den modsatte Side af Søen — noget, som senere skal blive udførligere omtalt. Grusterrassen Nordvest for Skaarup maa være dannet af Smeltevand foran Isranden, og følgelig maa denne have bøjet bagom den. Den nævnte Terrasse og lignende Dannelser foran Hylke Morænen antyder, at der i denne Egn er strømmet en Del Smeltevand ud fra Isen, og flere Ting i det bagved liggende Terrain peger i samme Retning.

Ser man saaledes paa Bakkedraget Vest for Odder, vil man lægge Mærke til, at der her findes nogle Smaadale, hvis Bund dannes af adskilte, langstrakte, nu tørvefyldte Lavninger, og som ved denne Form røber en Erosion af subglacialt Smeltevand. Den smukkeste og mest udprægede af disse Smaadale strækker sig over Snerild forbi Fensholt til Torrild og herfra i en imod Nord vendt Bue til Gjesing og saa videre imod Nordvest til Skaarup. Samme Sted udmunder en lignende Rende, som dog ikke strækker sig helt igennem Bakkedraget, men kun kan følges østpaa til Svinsmark. Muligvis kan dog en Rende Syd for Rantzausgave opfattes som en Fortsættelse heraf. Endelig har ogsaa den Lavning, der imellem Rathlovsdal og Vedslet passerer Højdedraget, noget af den samme Karakter.

Ad disse Veje maa Smeltevandet inde under Isen have søgt ud imod dens Rand ved Skanderborg Sø for herfra at løbe videre ud til Gudenaa Dalen.

Randmorænestrøget Nordøst for Skaarup. Fra Landsbyen Skaarup og opad Skraaningen af Bakkepartiet ved Fruering er Israndens tidligere Beliggenhed angivet ved et Randmorænestrøg, der ganske vist ikke udmærker sig ved voldformede Morænebakker, men hvor den ganske overordentlige Stenrigdom i det uroligt kuperede Terrain er meget iøjnefaldende. Saaledes træffer man i Partiet Sydvest for Storhøj en Strækning, der endnu ligger uopdyrket hen paa Grund af Mængden af store Sten, og i det mere kuperede Omraade ca. 1 Km. Sydøst for Fruering er Stenrigdommen ret imponerende. Tavle XI, Fig. 1 viser et Parti af dette sidste, stærkt stenede og uregelmæssigt formede Terrain.

Ydergrænsen for dette stenede Bælte strækker sig fra Plateauranden Øst for Skaarup i en Linje, der efterhaanden bøjer imod Nord til et Punkt ca. $\frac{1}{2}$ Km. Øst for Fruering. Højden af denne Del af Israndslinjen er ret betydelig og stiger efterhaanden fra ca. 300 Fod (94 M.) til ca. 350 Fod (110 M.).

2. Isen Nordøst og Nord for Skanderborg.

Lidt Øst for Fruering bøjer Israndslinjen brat om og strækker sig op mod Aarhus Dalen med en Retning, der i det hele og store er SSØ.—NNV. Denne Retning er egentlig ret ejendommelig for Randen af en Is, i hvilken Bevægelsen allerede et kort Stykke indenfor Isranden maa antages at have været fra Sydøst til Nordvest. Den maa være betinget af, at Isen i Aarhus Dalen og det temmelig lave Terrain nærmest Nord herfor har formaaet at trænge forholdsvis langt frem imod Vest, og at Mægtigheden af Isen har været saa stor, at denne har kunnet flyde frem til en omtrent lige Forbindelseslinje imellem det vestligste Punkt af Israndslinjen i Aarhus Dalen og den nordligste Del af den ovenfor skildrede Isstrøm Sydøst for Skanderborg. En medvirkende Aarsag til Fremkomsten af denne Retning af Israndslinjen maa man for den sydlige Dels Vedkommende tillige se i en lokalt stærkere Isbevægelse igennem det lave Strøg, der findes Nord for Fruering Højdepartiet, og hvori Solbjerg Sø ligger.

Den angivne Retning af Israndslinjen har været i høj Grad ugunstig for Dannelsen af betydelige Randmoræner, idet Aflejringen af Morænemateriale langs med Isranden maa være desto større, jo mere dennes Retning nærmer sig til den Vinkelrette paa Isens Hovedbevægelsesretning, naar alle andre Forhold er lige. Hertil kommer, at ikke blot Isens Randparti paa dette Sted har ligget højt, men ingen andre Steder indenfor hele det undersøgte Omraade findes der højtliggende Terrain bagved Israndslinjen paa en saa stor Strækning som her. Det er derfor kun naturligt, at Moræneaflejringerne langs med denne Del af Isranden er blevne ubetydelige og saaledes danner en skarp Modsætning til Israndsdannelserne paa den nærmest ovenfor skildrede Strækning Sydøst for Skanderborg, hvor Betingelserne for Transport af Morænemateriale ud til Isranden var langt gunstigere. Ikke desto mindre giver et Studium navnlig af Overfladeformerne tilstrækkelig sikre Holdepunkter til Bestemmelse af Israndens Beliggenhed paa Strækningen nordpaa til Aarhus Dalen, i hvilken saavel Smeltevandsaflejringerne som en pludselig Forandring af Dalstrøgets hele Karakter giver det næste, meget udprægede Punkt af Israndslinjen.

Israndslinjen fra Fruering til Mesing. Fra den bratte Ombøjning af Israndslinjen ved Fruering strækker denne sig først i nordvestlig Retning i en flad Bue hen imod Illerup Aa's Dal. Den følger saaledes nogenlunde Vestsakraaningen af Fruering Højdepartiet, men er dog lidet fremtrædende i Terrainet, idet man kun finder Israndszonen

betegnet ved et meget smaat kuperet Bælte med en Mængde ganske smaa Mosehuller og talrige Smaatoppe, der overvejende bestaar af Moræneler. Langs med Ydergrænsen for dette Bælte kan man dog ogsaa træffe mere langstrakte Forhøjninger i Terrainet, og Jordbunden kan her variere noget mere, idet der paa flere Steder findes rullet Grus og Sand. Dette er saaledes iagttaget i Nonnebjerg 1 Km. SSØ. for Mallings Gaard samt i den flade Ryg Syd for denne Gaard.

Højden af denne Del af Israndslinjen aftager jævnt fra ca. 350 Fod (110 M.) Øst for Fruering til ca. 250 Fod (78 M.) paa det Sted, hvor den naar Illerup Aa's Dal NNV. for Mallings Gaard. I selve denne ejendommelige Dal finder man ingen Spor af Isranden, som har staaet tværs over den og videre nordpaa fortsat sig paa det første Stykke med nordlig Retning til ca. $\frac{1}{2}$ Km. Øst for Landsbyen Mesing. Ogsaa paa dette sidste Stykke, hvor Højden igen tiltager noget, nemlig til ca. 300 Fod (94 M.) Øst for Mesing, fremgaar Israndens tidligere Beliggenhed af en meget urolig Overfladeform i Terrainet nærmest bagved Israndslinjen, men denne er her ikke videre iøjnefaldende, fordi Overfladen i Terrainet nærmest udenfor den heller ikke er særlig regelmæssigt formet, selv om de enkelte Bakker dér er en Del større og mere jævnt afrundede. Endvidere bør det bemærkes, at Jordbunden i selve Israndszonen er betydeligt mere vekslende end i det, ganske overvejende af Moræneler bestaaende, vestligere Terrain. Man træffer saaledes i det smaa kuperede Bælte foruden Moræneler en Del Grus, saavel rullet Grus som Morænegrus, samt lidt Sand; det kan f. Eks. nævnes, at den langstrakte, randmoræneagtige, lille Bakke ca. 700 M. Sydøst for Mesing næsten udelukkende bestaar af Grus, der længst imod Syd er tydeligt afrullet, men som i Nordenden af Bakken synes at gaa over til Morænegrus.

Den beskrevne Israndslinje mellem Fruering og Mesing danner en Bue fremad, svarende til en forholdsvis rigtig Tilførsel af Is igennem det noget lavere Strøg omkring Solbjerg Sø. Selve denne Sø bærer dog ikke noget særligt Præg af Iserosion, men minder snarere om „Langsøerne“ i de subglaciale Dale, og den samme Karakter har flere Smaadale i Nærheden. Dog taler Manglen af Smeltevandsaflejringer i Illerup Aa's Dal imod, at der her skulde være strømmet en større Smeltevandsflod ud fra Isen, og det forekommer i det hele taget rimeligere at antage, at Solbjerg Sø og Illerup Aa's Dal samt muligvis den vestligere Dal, hvori Vessø ligger, er sammenhørende Dannelser, der skyldes subglacial Erosion paa et tidligere Tidspunkt, da hele denne Egn var isdækket. At man kan træffe saadanne „ældre“ Dalstrøg saa velbevarede, turde muligvis skyldes, at der ogsaa i dem har ligget døde Ismasser, hen over hvilke det her kun tynde, „yngre“ Isdække har bevæget sig, og maaske ogsaa mindre Smeltevandsbække

udenfor Isranden har løbet, saa at Dalstrøgets oprindelige Karakter paa denne Maade er bleven bevaret. Dette sidste er dog ret hypotetisk, og det nævnes kun, fordi man muligvis ad denne Vej igennem mere indgaaende Undersøgelser i Marken kan naa til Forstaaelse ogsaa af et andet ejendommeligt Forhold. I den Barriere, der afdæmmer Solbjerg Sø fra Illerup Aa's Dal, og hvis flade, terrasseliggende Overflade ligger 80 Fod (25 M.) over Søen og ca. 140 Fod (44 M.) over Tørven i Dalbunden Vest derfor, findes nemlig stenfrit Ler med tydelig, vandret og uforstyrret Lagdeling. Et smukt Profil heri er iagttaget ind i det øverste af Skraaningen ned imod Illerup Aa's Dal og $1\frac{1}{2}$ Km. Nordvest for Stilling Station, og det er sandsynligt, at Leret herfra strækker sig ind under det flade, terrasseagtige Terrain imod Nordøst, hvor Overfladen bestaar af temmelig groft, rullet Grus. Dannelsen af dette Ler synes uforklarlig, hvis man ikke vil antage en Ispærring Vest for det, og Forekomsten af Gruset sandsynliggør en Sammenhørighed enten med Fremrykningen eller med Tilbagesmeltningen af den her betragtede Isrand.

Israndslinjen fra Mesing til Aarhus Dalen. Ved Mesing bøjer Israndslinjen atter lidt fremad og lader sig nu følge videre imod NNV., til den ca. 6 Km. længere fremme naar ned i den store Aarhus Dal. Paa Strækningen Syd for Bakkeknuden Bjørnebjergerne danner den en umiddelbar Fortsættelse af det nærmest sydligere Stykke. Det omtalte, smaaakuperede Bælte Sydøst for Mesing strækker sig nemlig videre nordpaa op imod Bjørnebjergerne, og Israndslinjen danner saaledes endnu paa et Stykke Grænsen imellem dette Bælte, hvor Jordbunden er temmelig vekslende, og et noget mere roligt formet Morænelersterrain udenfor.

Videre nordpaa, Vest om Bjørnebjergerne og ned imod Aarhus Dalen, ændres Karakteren af Israndszonens Aflejringer noget, idet den smaaakuperede og uregelmæssige Overfladeform efterhaanden bliver mindre udpræget, men til Gengæld begynder der at optræde langstrakte, randmoræneagtige Smaabakker, og samtidig bliver Jordbunden i det hele taget mere gruset i Israndszonen. Længst imod Syd findes der saaledes en Del Morænegrus. Denne Jordart er f. Eks. iagttaget sammen med Moræneler og lagdelt Sand i en temmelig tilgroet Grav omtrent 1 Km. Nordøst for Haarby, og en randmoræneagtig, langstrakt Bakke $1\frac{1}{2}$ Km. N. t. Ø. for denne By bestaar udelukkende af Morænegrus. Videre nordpaa bliver Gruset i Israndsafljejringerne mere afrullet og sorteret, og det forekommer nu ofte i smaa, toppede Bakker. En udpræget randmoræneagtig Bakke har man i den langstrakte Gaashøj omtrent $1\frac{1}{2}$ Km. Sydvest for Søballe. Ogsaa denne

Bakke bestaar af rullet Grus og Sand, hvori der er iagttaget et, dog temmelig tilskredet, Profil i Bakkens Sydende. Paa nogle Steder kunde Gruset her se noget moræneagtigt ud, og løst i Graven laa flere store Sten, hvoraf en enkelt endog var 1 M. stor. Saa vidt det kunde ses, var Lagene ikke ganske uforstyrrede og gjorde Indtryk af at være noget udtværede. — Endelig skal det nævnes, at man i den nederste Del af Skraaningen ned imod Aarhus Dalen, i det grusede Terrain Vest for Søballe, træffer nogle iøjnefaldende, dybe, runde Huller, som i Udseende minder noget om de for Randmorænelandskabet i den sydøstlige Del af Grenaa Halvøen saa karakteristiske Kedler.

Den sidst beskrevne Del af Israndslinjen strækker sig fra det plateauagtige, høje Terrain Syd for Aarhus Dalen ned imod denne; Israndslinjens Højde er derfor i den sydlige Del ret betydelig, men aftager efterhaanden nordpaa. Saaledes er Højden nærmest Mesing omkring 300 Fod (94 M.), men allerede langs med Vestsiden af Bjørnebjerg begynder den at blive mindre, først langsomt, senere noget hurtigere, ned imod Bunden af Aarhus Dalen, hvor de flade Grusbakker kun naar op til ca. 120 Fod (38 M.), og Tørven imellem dem ikke ligger mere end 80 Fod (25 M.) over Havet. Lidt anderledes er Højdefordelingen i Terrainet bagved Israndslinjen. Man træffer her de største Højder umiddelbart Syd for Aarhus Dalen, idet Bakkeknuden Bjørnebjerg her hæver sig som en stor, flad Kuppel til over 400 Fod (126 M.). Naar Isens Randparti har formaaet at overskride dette saa vestligt beliggende Højdeparti, er det i Virkeligheden det samme Fænomen som Fremkomsten af den ejendommelige Retning af hele den her betragtede Del af Israndslinjen. Grunden dertil maa nemlig søges i Tilstedeværelsen af den store Aarhus Dal, igennem hvilken en forholdsvis betydelig Ismasse bevægede sig frem og bevirkede en i Forhold til Terrainhøjden paa-faldende langt imod Vest fremskudt Stilling af Isranden nærmest Syd for Dalen.

Paa en ejendommelig Maade gennemskæres Toppen af Bakkeknuden Bjørnebjerg af en ca. $4\frac{1}{2}$ Km. lang og ca. 200 M. bred Dal. Den er i den midterste Del af Højdepartiet skaaret mere end 100 Fod (31 M.) ned i dette, men ude paa Skraaningerne taber den sig næsten fuldstændigt, efterhaanden som Bakkesiderne nærmer sig til Dalbundens Niveau. Dalen gennemløbes ikke af noget Vandløb, men er fuldstændig tør. Dens Bund har en væsentlig forskellig Karakter i de to Ender. Imod Øst, hvor Dalen er forholdsvis smal, er der paa en Strækning ikke noget tydeligt Fald i den ene eller den anden Retning, og den sandede Dalbund er noget kuperet, idet der findes en Række tørvefyldte Huller, som det er antydnet paa omstaaende Skitse,

paa hvilken den nederste Linje betegner Dalbunden og den øverste Bakkekonturen langs med Dalens Nordside. Længere imod Vest bliver Dalbunden derimod flad og med regelmæssigt Fald imod Vest, saa at Udseendet her ganske minder om en almindelig Smeltevandsdal. Tavle XI, Fig. 2 viser et Parti af denne Del af Dalen; Billedet er taget fra et Punkt ca. $\frac{1}{2}$ Km. Vest for Rammel Aas imod ØSØ. Faldet er til at begynde med ca. 1 : 80, men aftager hurtigt til ca.

Fig. 3. Længdeprofil af Dalen igennem Bjørnebjerg.

Maalestocken er for Længder 1 : 40000 og for Højder 1 : 400. Højderne er angivne i Fod over Havet.

1 : 130 for endelig, naar Dalen kommer ud imod Bakkepartiets Skraaning, atter at tiltage. Følger man Dalen imod Vest, bliver Dalbunden efterhaanden overordentlig stenet, og paa flere Steder, hvor Markerne ikke er rensede for Sten, kan man endnu se adskillige store Blokke, der kun rager ubetydeligt op over Jordoverfladen.

Den beskrevne Dal maa antages at være dannet af et under Isen fremstrømmende Vandløb, der søgte ud imod den store Aarhus Dal. Allerede det, at Dalen kun gennemskærer Toppen af Bakkeknuden, viser, at den er dannet indenfor Isens Omraade, og det samme antyder den store Stenrigdom imod Vest i Dalbunden, idet de mange Sten her maa betragtes som den udslæmmede Rest af det stærkt stenede Morænemateriale i Isens Randparti. Det flade og regelmæssige Stykke af Dalbunden betegner maaske et Sted, hvor dette Vandløb har fulgt en aaben Kanal i Isen. En saadan har dog sikkert ikke kunnet holde sig i længere Tid, saa længe der var rigelig Tilførsel af Is ud imod denne Del af Israndszonen. Den flade Dalbund er derfor næppe opstaaet, førend Isdækket begyndte at smelte af, og Dannelsen af den er muligvis fortsat, efter at Toppen af Bjørnebjerg som en lille Nunatak dukkede frem i Isoverfladen.

3. Isen Vest for Aarhus.

Israndslinjen i Egnen Vest for Aarhus faar sit særlige Præg ved, at den strækker sig hen over et forholdsvis lavt Omraade. Den krydser ikke blot Aarhus Dalen og Lygumgaard Aa's Dalstrøg, men

passerer tillige Terrainet imellem de to Dale netop paa den Strækning, hvor dette kun har en ubetydelig Højde. Ind til dette lavere Omraade fører den store Aarhus Dal, og den maa i hvert Fald have begunstiget Isens Bevægelse ind i Landet noget, selv om det paa Grund af Dalens Retning ikke har været i saa høj en Grad, som Tilfældet var med de sydligere Fjordlavninger. Man maa nemlig antage, at den Is, som er naaet længst imod Vest i Aarhus Dalen, hovedsagelig er trængt frem over Terrainet imellem Bjørnebjergerne og Jelshøj, og at den østlige Del af Aarhus Dalen kun har ført Isen ind til Østenden af Lygumgaard Aa's Dalstrøg. Ikke desto mindre maa Aarhus Dalen, som det fremgaar af Israndslinjens Form i det store og hele, have bevirket en rigelig Tilførsel af Is og dermed af Morænemateriale ud imod den lavt liggende Isrand, og da tillige dennes Retning var nogenlunde vinkelret paa Isens Bevægelsesretning, er der i den her betragtede Del af Israndszonen sket en langt betydeligere Aflejring af Morænemateriale end i det nærmest sydfor liggende Terrain. Navnlig i selve Aarhus Dalen og op over det noget højere Omraade umiddelbart Nord for denne træffer man forholdsvis mægtige Morænedannelser, der dog ikke har nogen egentlig Randmoræne-karakter, men nærmest maa tænkes opstaaede inde under Isens Randparti.

Israndslinjen fra Aarhus Dalen til Framlev. Syd for Landsbyen Høver og umiddelbart Vest for Pittersø har Isranden staaet tværs over Aarhus Dalen med en Retning, der var vinkelret paa Dalens Længderetning. At man her har et tydeligt Punkt af Israndslinjen, fremgaar af, at Dalen paa dette Sted fuldstændig skifter Karakter. De stejle Erosionsskraaninger, som begrænser den vestlige Del af Dalen, afløses her af de jævne og afrundede Dalsider videre imod Øst, og den Grusaflejring, der fra Gudena Dalen lader sig følge østpaa igennem Aarhus Dalen, standser ogsaa paa dette Sted. Israndslinjen i Aarhus Dalen danner saaledes baade den yderste Grænse, hvortil man kan spore Isens afhøvlen og udglattende Virksomhed paa Dalskraaningerne, og tillige den øverste Ende af en, ganske vist kun daarligt bevaret, Smeltevandsaflejring, der imod Vest staar i Forbindelse med Terrassen i Gudena Dalen. Nogen egentlig Randmoræne finder man derimod ikke.

Ved Nordsiden af Aarhus Dalen svinger Israndslinjen hurtigt tilbage og antager nu en Retning imod Nordøst, idet den følger Sydøstsiden af det lille Klank Højdeparti til Skovby. Her bøjer den yderligere noget tilbage, og strækker sig videre med østlig Retning til et Punkt godt $1\frac{1}{2}$ Km. Nordvest for Framlev. Højden af Israndslinjen er, som

allerede nævnt, ikke stor. Den varierer paa det sidstnævnte Stykke imellem 125 og 160 Fod (39 og 59 M.).

Heller ikke paa denne ca. 8 Km. lange Strækning finder man egentlige Randmorænevolde, men Israndslinjen danner, som det saa ofte er Tilfældet, Ydergrænsen for et Terrain, hvor Overfladen er mere uroligt kuperet end i den tilstødende Egn imod Nordvest. Et andet Forhold viser dog Israndsstillingen med større Tydelighed. Som det senere skal blive udførligt omtalt, har der nemlig i den brede Del af Lygumgaard Aa's Dal og dens nærmeste Omgivelser staaet en stor Smeltevandssø, i hvilken Vandstanden var saa høj, at man nødvendigvis maa antage en Afspærring fra Aarhus Dalen ved Is saavel paa et kortere Stykke Sydvest for Klank Højdepartiet som paa hele Strækningen Øst for Skovby. Israndslinjen danner saaledes Grænse imellem Søbundens flade Aflejringer af Sand og Ler og det mere kuperede Moræneomraade, og den fremhæves, ved at Søaflejringerne gennemgaaende ligger noget højere end selve Israndszonen. Paa den mellemliggende Strækning langs med Klank Højdepartiet antydes Israndens Beliggenhed ved en pludselig Forandring af Jordbunden. Det velafrundede og jævne Højdeparti bestaar normalt af Moræneler, men kommer man et Stykke ned ad Sydøstskraaningen, træffer man overalt Sand og Grus, og det er, som om Overfladeformen allerede her bliver noget uroligere.

Som det allerede ovenfor er antydnet, er der ud imod den her betragtede Del af Isranden sket en betydelig Transport af Morænemateriale, der er aflejret i et temmelig bredt Bælte bagved den skildrede Israndslinje. Det er overvejende Morænegrus og stærkt stenet Moræneler, som ligger i uregelmæssige Smaabakker, der ikke har nogen udpræget Længderetning og ikke kan opfattes som egentlige Randmoræner, men som nærmest maa tænkes dannede inde under Isens Randparti eller til Dels maa opfattes som Resterne af en i Randzonen fremsmeltet Overflademoræne. Thi baade den urolige Overfladeform og den ganske usædvanlige Stenrigdom viser, at man her staar overfor en Israndsdannelse. I samme Retning peger ogsaa det Forhold, at det højeste Strøg af dette Bælte danner en udpræget Barriere tværs over Aarhus Dalen, men her, ligesom videre nordpaa, ligger de højeste Punkter et Stykke bagved den egentlige Israndslinje. Saaledes træffer man i Aarhus Dalen, godt 2 Km. Øst for Pittersø, Højder paa indtil 136 Fod (43 M.), og videre nordpaa er Højden ved Storing 170 Fod (53 M.); $1\frac{1}{2}$ Km. Nordøst herfor naar et Punkt 189 Fod (59 M.), og lidt Nordøst for Lillering er en flad Bakke 184 Fod (58 M.) høj.

Det mest karakteristiske for dette Strøg er den store Stenrigdom, men næsten overalt er Markerne efterhaanden blevne rensede, saa at

man ved at færdes i Terrainet kun faar en daarlig Forestilling om den Mængde Sten, som oprindelig maa have ligget i Jordoverfladen. Der skal i det følgende kortelig nævnes en Del Punkter, hvor der har været Lejlighed til at iagttage paafaldende Mængder af store Sten eller Profiler i stærkt stenede Jordarter. — I selve Aarhus Dalen kan Stenrigdommen forfølges i det mindste saa langt imod Øst som til Tostrup Sø. En særlig stenet Overflade iagttoges i 1903 Nord for Vestenden af denne Sø og ca. 400 M. Øst for Brandbjerg, paa en Terrainhøjde af 50—55 Fod (16—17 M.). Her var for ganske nylig ryddet et lille Krat, og man var allerede i Færd med at brække Stenene op og føre dem bort for at rense Overfladen. Tavle XII, Fig. 1 viser denne Forekomst. — Terrainet Vest herfor og videre imod Nordøst, østen om Storing og op imod Hovedlandevejen, er hele Vejen overordentlig stenet, og den Mængde vældige Stenhegn, der her findes, vidner om, at den oprindelige Overflade har været meget rig paa store Sten. Nu er Markerne saa temmelig rensede, og kun ved at stikke i Jorden med Boret faar man et Indtryk af, hvor stenet Undergrunden er. Kun enkelte Steder har der været Lejlighed til at se store Sten paa deres oprindelige Plads saaledes som f. Eks. i et mindre Profil i en lille, 134 Fod (42 M.) høj Top straks Vest for Kolkjær Gaard. Her bestod Jordbunden af en Del store Sten, hvorimellem der fandtes Moræneler; ganske lignende maa Jordbunden i hele det omliggende Terrain antages at være. — Videre imod Øst vedbliver Stenrigdommen. Det er saaledes paafaldende, at mange af Husene i Lillering er opførte af naturlige Sten, og ca. 700 M. Syd for Lillering findes der inde i Skoven, paa en Terrainhøjde af ca. 120 Fod (38 M.), en Strækning, hvor en Del større og mindre Sten rager op igennem Overfladen. — Et stort og smukt Grusprofil har man omtrent 700 M. ØSØ. for Lillering paa en Højde af 160—170 Fod (50—53 M.). Her er der til Aarhus-Hammel Banen gravet en Mængde Grus, og da man har ladet de større Sten blive liggende, findes der i Gravens Bund en imponerende Mængde Sten. Hele Øst-væggen i den omtrent 200 M. lange Grav stod i 1903 nogenlunde ren, og her saas vekslende Lag af Sand og groft Grus. Lagene var nogenlunde vandrette, hist og her lidt skraanende til forskellige Sider; kun enkelte Steder saas smaa Forstyrrelser i Lagdelingen. Det finere Materiale (Sandlagene) var godt sorteret, men det grovere saa mange Steder ud som typisk Morænegrus med indtil meterstore Sten. Is-skurede Blokke var ingenlunde sjældne, og i det hele taget gjorde Stenene ikke Indtryk af at være rullede. I Gravens Sydende iagttoges endog lidt Moræneler. Aflejringen maa opfattes som vekslende Lag af grovere Morænemateriale og finere fluvioglacialt Materiale. Fig. 2 paa Tavle XII viser et Sted, hvor Gruset havde overvejende

Morænekarakter. I en nyaabnet Grav lige Vest for den her beskrevne var Materialet væsentlig finere og mere sorteret.

Det vil af det foregaaende være fremgaaet, at det mest stenede Bælte ligger et Stykke bagved Israndslinjen, og at det nogenlunde følger det højeste Strøg indenfor Israndszonen eller maaske endog dennes Inderside. Det er muligt, at dette Forhold tildels skyldes, at Isranden i Aarhus Dalen, da Isen var begyndt at smelte af, en Tid lang har opholdt sig ved en lidt mindre fremskudt Stilling end tidligere og f. Eks. har staaet langs med en Linje fra Sydsiden af Bjørnehjergerne lige østen om denne Bakkeknudes højeste Parti, herfra fremad i Dalen til det nævnte højeste Strøg og videre med dette over Store-ring til Framlev.

Fra det mest stenede Bælte og ud imod den yderste Israndslinje aftager Stenrigdommen, og der optræder ogsaa pletvis andre Jordarter end egentlige Moræneaflejringer, f. Eks. rullet Grus og Sand. Endvidere er der paa adskillige Steder, navnlig i Aarhus Dalen, men ogsaa i Terrainet imellem Hovedlandevejen og den østligste Del af den skildrede Israndslinje, iagttaget stenfrit Ler, hvis Tilstedeværelse kunde tyde paa, at der engang, maaske under Isens Fremrykning, har været opdæmmet Vand ogsaa i Aarhus Dalen, samt at den østlige Ende af Søen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg har haft en lidt større Udbredelse imod Syd.

Israndslinjen fra Framlev til Mundelstrup. Ved Framlev er man naaet til et Punkt, hvor man kan begynde at spore Virkningen af den stærkere Tilførsel af Is ind igennem Østenden af Aarhus Dalen, idet Israndslinjen nu atter bøjer fremad og paa den følgende Strækning danner en ny Bue frem i Lygumgaard Aa's Dalstrøg. Paa det første, 1 Km. lange Stykke er Retningen dog foreløbig kun imod Nordøst henimod Labing, men derefter strækker Israndslinjen sig imod NNV. ned imod Bunden af det nævnte Dalstrøg, som den krydser ved Borum Bro. Her bøjer den atter brat tilbage og følger nu paa de næste 4 Km. Dalens Nordskraaning imod Ø. t. N. til et Punkt lidt Syd for Landsbyen Mundelstrup.

Højden af Israndslinjen er paa denne Strækning noget varierende, idet den retter sig efter de oprindelige Terrainforhold. Paa det første Stykke stiger Israndslinjen fra ca. 150 Fod (47 M.) til godt 170 Fod (53 M.) straks Sydvest for Labing. Derefter falder den atter, først ganske langsomt, men senere hurtigt, ned imod Bunden af Lygumgaard Aa's Dalstrøg, hvor Smaabakkerne ikke naar fuldt 100 Fod (31 M.). Videre fremad tiltager Højden hurtigt med ca. 100 Fod (31 M.), og paa hele den sidste Strækning varierer den omkring 200

Fod (63 M.). Det højeste Punkt her naar 229 Fod (72 M.); det ligger $1\frac{1}{2}$ Km. Øst for Borum og danner Toppen af en langstrakt, flad Ryg, der strækker sig langs med Dalsiden umiddelbart ovenfor Skraaningen.

Israndens tidligere Beliggenhed langs med den angivne Linje antydes allerede ved den forskellige Overfladeform paa de to Sider af Linjen, men fremgaar iøvrigt tydeligere af Jordbundsforholdene. Det ovenfor omtalte, stenede Bælte indenfor Israndsaflejringerne i Aarhus Dalen og nærmest Nord for denne fortsætter sig nemlig endnu et Stykke nordpaa. Karakteren af det ændres dog noget; det bliver hurtigt betydeligt smallere og gaar tillige helt ud til Israndslinjen; endvidere kan Morænegruset her antage noget af den for Randmoræner karakteristiske Voldform.

Allerede ved Ombøjningen af Israndslinjen og dér, hvor Vejen imellem Hørslev og Framlev gaar over en lang, lav Bakkeryg, er der iagttaget Grus, som dog var temmelig fint og nærmest gjorde Indtryk af at være afrullet. Men kun et kort Stykke bagved dette Sted og ca. 500 M. Nordvest for Framlev fandtes et Par Grave i grovere Grus. I den sydvestligste Grav, lige ved Vejen, gjorde Gruset nærmest Indtryk af at være Lokalmoræne af rullet Grus, men i det andet Profil, der laa ca. 100 M. længere imod Nordøst, fandtes Morænegrus, hvori dog endnu lidt af Materialet var afrullet. — Gruset synes fra dette Sted at fortsætte sig i nordlig Retning. Der er saaledes iagttaget et lille Profil i typisk Morænegrus straks Sydvest for Labing. Graven fandtes i en lille, langstrakt og ikke særligt fremtrædende Bakke lige Vest for Landevejen. Iøvrigt synes hele Terrainet omkring Labing at være usædvanlig stenet. — Medens der i den nordligste, stejle Del af Skraaningen ned imod Lygumgaard Aa's Dalstrøg er iagttaget noget Sand, der vel nok strækker sig ind under de omtalte, stenede Aflejringer imod Syd, træffer man endnu i de smaa Bakker i Bunden af Dalen og Øst for Landevejen Morænegrus og stærkt stenet Moræneler, men hermed ophører ogsaa de udpræget stenede Israndsdannelser foreløbig.

Paa den følgende Strækning, Øst for Borum, har Israndsdannelserne en helt anden Karakter. Isranden har her fulgt den ret stejle Skraaning Nord for Lygumgaard Aa's Dalstrøg, og dens Beliggenhed markeres ved et smalt Sandbælte, som danner en tydelig Modsætning til de af Moræneler opbyggede, store og jævne Højdepartier Nordvest herfor. Det er højest imod Syd lige ved Dalskraaningen og kan her antage Form af en flad Vold. Det drejer sig dog ikke om nogen egentlig Randmorænedannelse, men Sandet maa nærmest tænkes afsat af lokalt Smeltevand, der rislede ned over Isranden for derefter at løbe langs med denne imod Vest til Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg. For en saadan Tydning taler Forholdene i det

eneste iagttagne Profil, der fandtes længst imod Øst i den 205 Fod (64 M.) høje Byhøj straks Sydøst for Mundelstrup Gaard. Her saas et Par Meter lagdelt Sand, med Lagdelingen parallel med Overfladen, hvilende paa groft, rullet Grus. Løst i Bunden af Graven laa flere Sten, der var over 1 M. store.

4. Isen Nord for Aarhus.

Israndslinjen fra Mundelstrup til Søften. Søger man at følge Israndslinjen videre imod Nordøst, viser det sig, at den atter bøjer fremad og danner en stor Bue udenom det forholdsvis lave Terrain omkring Kvottrup ind i Lilleaa Dalen, hvor man ved Søften igen har et iøjnefaldende Punkt af Israndslinjen, idet en udpræget Smeltevandsaflejring her tager sin Begyndelse og følger Dalen imod Nordvest til Gudenaa Dalen ved Langaa.

Fra Ombøjningen ved Mundelstrup maa man antage, at Isranden paa en Strækning af ca. $2\frac{1}{2}$ Km. har staaet med en Retning imod NNV. henimod Østsiden af Bakkeknuden omkring Sabro. Paa de næste 2 Km. buer Israndslinjen atter lidt tilbage og strækker sig lige Øst om Ristrup og tværs over den lille Dal, hvorfra den øverste Ende af den nuværende Lilleaa kommer, for at naa ud til det store Dalstrøg paa samme Sted som nu Lilleaa. Med en lokal Bue fremad strækker den sig videre over det $1\frac{1}{2}$ Km. brede Dalstrøg til Søften ved dettes Nordside. Højden af denne Del af Israndslinjen er paa det første Stykke lidt over 200 Fod (63 M.) og stiger ved Smaabakkerne Øst for Sabro til ca. 250 Fod (78 M.). Derefter aftager den, først hurtigt, senere langsomt, til ca. 110 Fod (35 M.) i Lilleaa Dalen Vest for Søften.

Langs med den sydlige og største Del af den angivne Linje har Isranden kun efterladt sig utydelige Spor, og det er interessant at lægge Mærke til, at Manglen paa udprægede Israndsdannelser ogsaa her falder paa et Sted, hvor Israndens Retning har afveget væsentligt fra den Vinkelrette paa Isens Bevægelsesretning. Israndsstillingen fremgaar paa denne Strækning egentlig kun af en Grænse imellem et smaat kuperet Terrain imod Øst og de store, roligt formede Bakkepartier imod Vest. Paa et Par Steder, som f. Eks. straks Nordvest for Mundelstrup samt ca. 1 Km. Øst for Sabro, træffer man dog nogle Smaabakker, der i Udseende kan minde noget om Randmoræner, men de bestaar, ligesom hele det omgivende Terrain, alle af Moræneler af normal Beskaffenhed.

Længst imod Nord, hvor Israndslinjen bøjer tilbage og krydser Lilleaa Dalen, træffer man derimod langt tydeligere Israndsdannelser,

og i det hele taget minder Forholdene paa dette Sted i høj Grad om det midterste Stykke af Aarhus Dalen. Allerede et flygtigt Blik paa Kortet viser, at den udprægede Smeltevandsdal, som Lilleaa nu følger ud imod Gudena, har en tydelig Fortsættelse imod Øst, der som en langstrakt, dalagtig Lavning, hvis Bund saa godt som overalt ligger mere end 100 Fod (31 M.) lavere end Omgivelserne, danner en direkte Forbindelse imellem Lilleaa's Dal og de lave, alluviale Strækninger, som gaar ud til Aarhus Bugt ca. 5 Km. NNØ. for Aarhus. Man har altsaa ogsaa her et Dalstrøg, der ligesom Aarhus Dalen strækker sig fra Kattegat til Gudena Dalen tværs igennem det østjydske Højland. Den Smeltevandsaflejring, som danner Dalbunden i hele den nordvestlige Del af Dalstrøget, gaar sydpaa til det Sted, hvor Lilleaa nu kommer ud i Dalen. Umiddelbart Syd herfor stiger Dalbunden noget for dog straks efter at falde, idet der her strækker sig en tydelig Morænebarriere tværs over Dalen. Samtidig hermed antager Overfladen en helt anden Karakter, idet Dalbunden nu dannes af et smaa kuperet Morænelersterrein, der fortsætter sig videre imod Øst, og Erosionsskraaningerne, der i den nordvestlige Del af Dalen begrænser denne, afløses af udjævnede og afglattede, noget uregelmæssigt formede Dalsider. Israndens Beliggenhed fremgaar altsaa ogsaa her af, at Dalen paa et bestemt Sted fuldstændig forandrer Karakter; den nævnte Morænebarriere, som netop ligger paa dette Sted, maa opfattes som en Israndsaflejring. I Overensstemmelse hermed staar ogsaa, at den for en Del opbygges af stærkt stenet Materiale. Det kan saaledes nævnes, at der i og nærmest Nord for et lille Krat umiddelbart Nord for Jernbanen og Sydvest for Søften er iagttaget en stærkt stenet Overflade med ikke faa store, jordfaste Sten. — Endvidere fandtes der straks Vest for Søften Præstegaard et stort Grusprofil. I den sydvestlige Ende af dette saas i 1903 smukt Morænegrus med mange isskurede Blokke. Midterpartiet i Graven var tilskredet, men i den østlige Ende iagttoges temmelig groft, rullet Grus med svagt hældende Lag. — Iøvrigt maa det siges, at Jordbunden i denne Randaflejring er stærkt vekslende, idet der foruden de udpræget stenede Aflejringer tillige findes Moræneler og paa flere Steder ogsaa Morænesand.

Endnu skal kun omtales en ejendommelig, dalagtig Lavning, som i Terrainet bagved Israndslinjen paa en Maade danner en Fortsættelse af Lyngumgaard Aa's Dalstrøg og forbinder dette med den sydøstlige Ende af Lilleaa Dalen, og hvori Mundelstrup Station ligger. Den er i sin nuværende Skikkelse ikke udformet af et Vandløb udenfor Isen, thi dens Bund er ujævn og kuperet og indeholder en Del lukkede Lavninger og Huller som f. Eks. Geding Sø. Paa den anden Side synes dens Retning i Sydvest—Nordøst at udelukke, at den er

dannet ved subglacial Erosion. Det er sandsynligt, at man i denne Lavning har en ikke helt udfyldt Rest af en gammel Dal, igennem hvilken Afvandingen af Lygumgaard Aa's Dalstrøg oprindeligt har fundet Sted til den sydøstlige Ende af Lilleaa Dalen. I saa Fald maa Isen have flydt frem tværs over Dalen, som den ikke formaaede at udfylde helt med Morænemateriale, og det er muligt, at den bølgeformede Bevægelse, som herved maatte fremkomme i Isens nedre Lag, kan have givet Anledning til Aflejring af Materiale ogsaa „i Læ“ af Dalen, saa at man maaske paa denne Maade kan forklare Dannelsen af den ejendommelige, langstrakte Morænelersbakke, som følger Dalens Nordskraaning og, da den ligger umiddelbart over denne, tager sig ret imponerende ud, naar man ser den østfra. I det hele minder denne Bakke i Udseende meget om en Randmoræne, og selv om de i det foregaaende fremdragne Forhold viser, at Isranden har staaet noget længere fremme, kan den Mulighed dog ikke helt udelukkes, at man her har en Randmoræne, som er dannet, da Isen i Lilleaa Dalen begyndte at trække sig tilbage.

Israndslinjen fra Søften til Hestehave. Imod Nordøst begrænses Lilleaa Dalen af et temmelig højt Terrain, og et Stykke op over dette er Isen trængt frem, saa at dens Rand stod langs med en svagt bugtet Linje, der fra Morænebarrieren i Lilleaa Dalen strækker sig imod ØNØ. ud imod Grenaa Halvøen. Dette Stykke af Israndslinjen udmærker sig ikke ved Forekomsten af tydelige Randmoræner, men paa den anden Side danner det en meget iøjnefaldende Grænse imellem to Omraader med væsentlig forskellig Overfladeform. Terrainet Nord for Israndslinjen har overordentlig store og rolige Former, medens Overfladen imod Syd er meget uregelmæssigt smaa kuperet, og selv om man i det hele og store kan følge de udenfor liggende, mægtige Bakkedragss Former ind i dette Terrain, saa er Overfladen dog ganske anderledes toppet og urolig. Dette Forhold giver sig smukt tilkende paa Kortet ved Horizontalkurvernes uregelmæssige Forløb i Modsætning til de store, rolige Linjer, som disse danner i Terrainet udenfor. Man har her, bagved Israndslinjen, et smukt Eksempel paa den smaatoppede og uregelmæssige Overfladeform, som paa saa mange Steder er karakteristisk for Israndszonens Aflejringer. Man vil derfor kunne forstaa, at der i Indledningen til Belysning af dette Forhold er valgt netop den her betragtede Egn som Eksempel, men dette er dog ogsaa sket af den Grund, at Tydningen af den omtalte Landskabsform som en Israndsdannelse her ikke kan være underkastet nogen som helst Tvivl, idet Ydergrænsen for det smaa kuperede Terrain tydeligt danner en Forbindelseslinje imellem to ud-

prægede Punkter af Israndslinjen, nemlig Morænebarrieren i Lilleaa Dalen og Hestehave SSØ. for Hornslet, paa hvilket sidste Sted der begynder at optræde lange og store Randmorænevolde, som herfra lader sig følge østpaa igennem hele den sydlige Del af Grenaa Halvøen.

I Enkelthederne er Israndslinjens Forløb følgende. Fra Søften strækker den sig først omtrent 2 Km. imod ØSØ. skraat op ad Dalsiden og betegner herved den nordlige Begrænsning af den lille Istunge, som flød frem i Lilleaa Dalen. Lidt Nord for Havshøj Gaard skifter Retningen pludseligt og er nu paa de følgende 6 Km. nordøstlig. Linjen er her svagt bugtet, idet den buer ubetydeligt frem imod det lavere Terrain Sydvest for Trige og tillige bøjer noget tilbage op over Byhøj Øst for denne By. Syd for Petersminde antager Israndslinjen en omtrent østlig Retning, som den beholder ca. $4\frac{1}{2}$ Km. til Syd for Ballehøj. Strækningen fra Byhøj til det sidstnævnte Punkt kommer derved til at danne en flad Bue fremad paa den svagt hældende Skraaning ned imod den store, flade Lavning Nord for Petersminde. Videre fremad strækker Israndslinjen sig omtrent retlinjet godt 5 Km. imod ØNØ. til Hestehave, idet den gaar igennem det laveste Parti imellem Ballehøj og Bakkeknuden ved Vorre.

Hvad Højden af den angivne Israndslinje angaar, da kan det siges, at den varierer noget, men altid langsomt, et Forhold, som ogsaa afspejles i Linjens Forløb i flade, regelmæssige Buer fremad paa de Steder, hvor Terrainet er lavest. Paa det første Stykke fra Søften op ad Dalskraaning stiger Israndslinjen godt 100 Fod (31 M.), saa at dens Højde umiddelbart Nord for Dalen er 230—240 Fod (72—75 M.). Derefter aftager den ned imod Lavningen Sydvest for Trige omtrent til 200 Fod (63 M.) og stiger saa atter til 306 Fod (96 M.) paa Toppen af Byhøj. Herfra nordpaa gaar det igen nedad imod Lavningen Nord for Petersminde, saa at Højden paa den følgende Strækning imellem Petersminde og Todbjerg kun er ca. 170 Fod (53 M.). Nord for Todbjerg begynder Israndslinjen atter at stige, til den Syd for Ballehøj naar godt 280 Fod (88 M.). Derpaa strækker den sig næsten vandret ind igennem det lave Pas imellem Ballehøj og Bakkeknuden ved Vorre, til den naar Nordsiden af det store Højdedrag; her falder den efterhaanden ca. 100 Fod (31 M.) paa Strækningen ned til Vestsiden af Hestehave.

Hele Terrainet bagved den skildrede Israndslinje er et uregelmæssigt kuperet Morænelerterrain, hvor større og mindre Bakker veksler regelløst med smaa Lavninger og Mosehuller. Overfladeformerne er størst noget indenfor Ydergrænsen, medens Terrainet ud imod denne bliver mere smaatskaaret. Endvidere kan det fremhæves, at det yderste Bælte overalt, hvor jeg har haft Lejlighed til

at passere det eller følge det over kortere eller længere Strækninger, har vist sig at være overordentlig rigt paa Sten, saaledes at den angivne Linje ogsaa herigennem fremhæves som en Israndslinje. Jeg skal i det følgende nævne de Punkter, hvor jeg har iagttaget saadanne usædvanlige Mængder af Sten. Dog skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom paa, at mine Undersøgelser i Terrainet ikke har været saa detaillerede, at ikke nogle lignende Forekomster kan have unddraget sig min Opmærksomhed, og yderligere kan det nævnes, at Stenrigdommen ofte er bleven betydeligt mindre iøjnefaldende derved, at Befolkningen overalt har anvendt en ganske forbavsende Omhu paa at rense Markerne for Sten, saa at man nu de fleste Steder ser et ganske almindeligt Morænelerterrain, hvori kun en Del store Stenhegn røber den tidligere Rigdom paa Sten.

Længst imod Sydvest, i Terrainet straks ovenfor Dalskraaning, træffer man et overordentlig stenet Omraade med en Del Morænegrus, der endog kan optræde i, ganske vist kun smaa, men dog ret iøjnefaldende Randmorænebakker. Der sigtes til saadanne Smaabakker, som den lyngklædte Top 400 M. NNØ. for Havshøj Gaard, den langstrakte Vold ved Tværbakke Gaard og den Bakke, hvorpaa Vester-mølle ligger. Den førstnævnte, 249 Fod (78 M.) høje Top bestaar udelukkende af Morænegrus, som kunde ses i flere Smaahuller, der var gravede ind i Bakkens Sider. — Ogsaa den lange, 256 Fod (80 M.) høje Vold, der gaar lige Vest om Tværbakke Gaard, er opbygget af typisk Morænegrus. I et Profil i dens Sydende saas i 1903 en fuldstændig Pakning af større og mindre Sten; det er dette Profil, som er afbildet i Ussing's Danmarks Geologi, 2den Udg. S. 239. — Den 246 Fod (77 M.) høje Bakke, hvorpaa Vester-mølle ligger, indeholder derimod en Del Moræneler, men dette bliver dog paa sine Steder saa stenet, at det fuldstændig gaar over til Morænegrus. Tavle XIII, Fig. 1 viser dennes Bakkens Udseende; i Forgrunden ses et lille Profil i stærkt stenet Moræneler.

Videre imod Nordøst er der i det lave Terrain straks Nordøst for Byhøj Øst for Trige og paa en Højde af ca. 230 Fod (72 M.) iagttaget en meget stenet Overflade. Endvidere kan det nævnes, at Østskraaning af selve Byhøj bestaar af usædvanlig stenet Moræneler. — Det næste Observationspunkt ligger SSV. for Petersminde. Her er Overfladen paa to Steder Syd for Vejen fra Thomasminde til Todbjerg helt oversaaet med store Sten, der i Reglen ligger noget ned i Jorden, og som synes at umuliggøre Opdyrkningen. Fig. 2 paa Tavle XIII viser den sydøstligste af disse Forekomster. Terrainhøjden er her ca. 185 Fod (58 M.). — Endelig er der i det forholdsvis lave Terrain SSØ. for Ballehøj iagttaget en lignende stenet Overflade. Her findes paa en Terrainhøjde af ca. 280 Fod (88 M.) nogle

endnu uopdyrkede, mindre Strækninger, hvor en Del større og mindre Sten rager op igennem Overfladen. Det er dog sikkert kun et Tidsspørgsmaal, hvorlænge denne Forekomst vil blive bevaret, da der synes at forekomme Moræneler umiddelbart under det stenede Dække.

C. Smeltevandsdannelser.

1. Smeltevandet fra Skanderborg Egnen.

Terrasselandskabet omkring Skanderborg Sø. Paa en Jernbanetur igennem det sydøstlige Jydland kører man igennem veldyrkede og frugtbare Egne, hvor Jordbunden øjensynlig ganske overvejende bestaar af Moræneler. Kun et enkelt Sted overraskes man ved, at Naturen pludselig skifter Karakter, og de frodige Marker paa en Strækning afløses af golde, lyngklædte eller beplantede Bakker. Det er i Egnen omkring Skanderborg Sø. Naar man kommer sydfra, lægger man Mærke til Forandringen, allerede inden man naar Søen, og videre helt op til Skanderborg Station har Landskabet den samme, triste Karakter. Da Jernbanen her løber paa temmelig lavt Niveau, dels igennem kunstige Gennemskæringer og dels igennem Lavninger i Terrainet, faar man, hvis man kun har Lejlighed til at se dette fra Banen, Indtrykket af, at man her passerer et Parti af uregelmæssige Sand- og Grusbakker. Men helt anderledes bliver Billedet, hvis man færdes ude i Terrainet. De enkelte Bakker antager ofte et meget betydeligt Omfang og er alle fladt afskaarne foroven, og man ser, at deres plane Overflader flugter og ligger paa omtrent samme Højde. Med andre Ord, man staar her overfor et udpræget Terrasselandskab.

Saadanne Terrassestykker træffer man med større eller mindre Udstrækning saa godt som hele Vejen rundt om Skanderborg Sø, og de giver Egnen her noget af den samme Karakter, som kendetegner den vestligere Gudena Dal med dens mange Søer og tørvefyldte Lavninger nedsænkede i den flade Dalterrasse. I Virkeligheden staar man her overfor det samme Fænomen, og Dannelsen af Terrasserne umiddelbart langt med Siderne af det dybe Søbassin lader sig heller ikke for denne Egns Vedkommende forklare undtagen gennem Antagelsen af, at der har ligget „død“ Is i den dybe Lavning endnu paa det Tidspunkt, da Sandet og Gruset paa Siderne aflejredes. Det ejendommelige Forhold, at Aflejringen skete langs med Siderne af og til dels ovenpaa saadanne døde Ismasser, som senere maatte forsvinde, har bevirket, at man nu kun har et meget sønderdelt og daarligt

bevaret Terrasselandskab tilbage, saa at det ikke er muligt med samme Sikkerhed som andre Steder at rekonstruere de gamle Smeltevandsfloder.

I størst Udstrækning og smukkest udviklet finder man Terrasselandskabet i Egnen nærmest Vest for Skanderborg. I Modsætning til de omgivende Højdepartier, der alle bestaar af Moræneler, er Terrainet her meget sandet, og det synes, som om Materialet er finest længst imod Nord og noget mere gruset sydpaa. Profiler har der saa godt som ikke været Lejlighed til at se; kun i et Par Smaa-grave er der iagttaget fint Sand eller Sand med fine Gruslag i svagt hældende Lag med nogen diskordant Parallelstruktur. Højden af Terrassen i dette Terrain lader sig forholdsvis let bestemme, idet Terrassefladen paa flere Steder gaar fladt ind til jævnt stigende Morænelersskraaninger. Grænsen mellem Sand og Moræneler løber saaledes umiddelbart Vest for Landsbyen Vrold paa en Højde af ca. 160 Fod (50 M.), og ganske den samme Højde har man f. Eks. ved Gaarden Nørlund, hvor to smaa Morænelerstoppe rager op igennem Terrassefladen.

Ikke engang det omtalte Terrasseomraade Vest for Skanderborg danner et sammenhængende Hele, men Fladen brydes af uregelmæssige Lavninger eller større og mindre Erosionsrender. Man maa dog tænke sig, at de adskilte Terrassestykker oprindelig har udgjort en samlet Flade, som opstod paa et Sted, hvor flere mindre Vandløb, der kom fra den Sydøst for Skanderborg Sø staaende Isrand, samlede sig. Selv om de senere Forandringer i denne Egn, som nævnt, har været forholdsvis betydelige, kan man dog endnu i Hovedtrækkene se, hvilke Veje disse Vandløb har fulgt. Et Vandløb maa saaledes være kommet fra den Del af Isranden, ved hvilken Hylke Randmorænen dannedes. Udenfor denne træffer man nemlig et Grusomraade med temmelig flad, men dog noget uregelmæssigt formet Overflade, der i det mindste gaar op til en Højde af ca. 180 Fod (56 M.). Dette Grus fortsætter sig, om end med Afbrydelser, langs med Sydsiden af Søen og derefter imod Nord op til Terrasselandskabet ved Vrold. Til denne Grusaflejring hører f. Eks. det udprægede Terrasseparti, som ligger umiddelbart Øst for Banen, lige før den gaar over Søen.

Ogsaa paa den modsatte Side af Skanderborg Sø maa der have løbet et Vandløb. Som det allerede er nævnt under Omtalen af denne Egns Morænedannelser, findes der nemlig langs med Søens østlige Bred, paa Strækningen fra Skaarup til Vestermølle, et udpræget Terrassestykke, bestaaende af Grus og Sand og derved skarpt adskilt fra det højere liggende Morænelerterrain. Dette Terrassestykke gaar imod Syd op til en Højde af 170 Fod (53 M.). Imod Nord lader

det sig ikke følge længere end til Vestermølle; man maa derfor antage, at Vandet herfra er løbet tværs over det nuværende Søbassin til Skanderborg, og det synes, som om det finere Sand i den nordlige Del af Terrasselandskabet her nærmest maa henføres til dette Vandløb. Endelig taler Sandsynligheden for, at der endnu har været et tredje, mindre Vandløb, som har haft sin Vej tværs over Sølavningen paa det Sted, som nu betegnes ved Indsnævringen af Søen imellem Dyrehave og en fremspringende Pynt paa Sydkysten.

Vil man paa Grundlag af det ovenfor sagte danne sig et samlet Billede af Forholdene, saaledes som de antagelig har været paa det her betragtede Tidspunkt, maa man altsaa tænke sig, at der i Søbassinet har ligget en forholdsvis mægtig, død Ismasse. Søens Form tyder paa, at den døde Is i Hovedsagen har bestaaet af to, dog ikke helt adskilte Partier, som sandsynligvis har naaet op til en større Højde end Vandafløbene. Langs med Siderne af og tværs over denne Is har det fra Isranden kommende Smeltevand løbet, og det har her afsat sit medførte Grus og Sand. Det hele er derfor nærmest at ligne med en Hedeslette, op over hvilken der ragede et Par morænedækkede, men isfyldte Bakkeøer.

Forbindelsen med Gudenaa Dalen. Lavningen, hvori Skanderborg Sø ligger, adskilles imod Vest fra det store Mossø Bassin ved to Bakkeknuder, der rager omkring 100 Fod (31 M.) op over det ovenfor beskrevne Terrasselandskab. Den sydligste og største af disse danner en jævnt afrundet Morænelerskuppel, hvis højeste Punkt, der ligger $1\frac{3}{4}$ Km. Vest for Landsbyen Vrold, naar op til 245 Fod (77 M.) over Havet. Den nordlige Bakkeknude er ikke saa stor, men til Gengæld noget højere, idet dens Top ved Legaardslyst, $2\frac{1}{2}$ Km. Vest for Skanderborg Station, naar op til 271 Fod (85 M.). Paa begge Sider af disse Bakkeknuder og ind imellem dem har man tre lave Forbindelsesveje imellem de to store Sølavninger. Igennem det sydligste af disse lave Strøg gaar det nuværende Afløb fra Skanderborg Sø, men ingen Terrassedannelser strækker sig ind herigennem, og Moræneleret gaar f. Eks. ved Fuldbro helt ned til Tørven langs med Aaen. Heller ikke paa anden Maade bærer det noget Præg af at have været gennemløbet af et større Vandløb; saaledes staar de omgivende Højdepartier med jævnt hældende Skraaninger ned imod Lavningen, og der findes ingen Antydning af Erosionsskraaninger langs med dens Begrænsning. Man maa derfor antage, at der ogsaa i denne Lavning har ligget død Is, eller i det mindste, at Isen i Mossø ganske har hindret Afløb ad denne Vej paa det her betragtede Tidspunkt.

Helt anderledes er Forholdene derimod i det lave Parti, som adskiller de to Bakkeknuder. Fra det østligere Terrasselandskab strækker Smeltevandsaflejringen sig herind igennem, og imod Nord begrænses Lavningen endog af en udpræget Erosionsskraaning, saa at den, trods sin ringe Længde og forholdsvis store Bredde (paa det smalleste Sted 600 M.), faar noget af den almindelige Dalkarakter. Ad denne Vej maa Hovedmængden af Smeltevandet fra Egnen omkring Skanderborg Sø have søgt ud imod Vest, men en ringe Del er dog maaske løbet Nord om den nordlige af de to Bakkeknuder, idet der synes at strække sig en smal Sandaflejring ind igennem det nordligste lave Strøg til Nordøstenden af Mossø Bassinet.

Hvilken Vej Smeltevandet har benyttet videre fremad imod Gudena Dalen er det vanskeligere at afgøre med fuld Sikkerhed. Den Mulighed, at det kan have løbet over den i Mossø liggende Ismasse og naaet Gudena Dalen ved Sydenden af Gudensø, kan vel ikke helt udelukkes, men langt sandsynligere er det, at Vandet har fulgt den Dal, som fra Nordøsthjørnet af Mossø strækker sig imod VNV. over Vessø til Gudena Dalen. For denne Antagelse taler ikke blot den Omstændighed, at Fortsættelsen af Terrasserne fra Egnen Vest for Skanderborg peger hen imod den nævnte Dal, men tillige, at man endnu ved Indgangen til den træffer et tydeligt Terrassestykke. Ind igennem Dalen findes derimod ingen egentlige Terrasser; kun paa en Strækning Øst for Vessø ligger der paa Nordsiden nedenfor den stejle Dalside et terrasselignende Parti, men da det for en stor Del bestaar af Moræneler, kan det i det mindste kun opfattes som en Erosionsterrasse. Ellers ligger hele Dalbunden paa et meget lavt Niveau og er tørvefyldt med Undtagelse af det Stykke, som indtages af Vessø. Det er derfor muligt, at heller ikke denne Dal har været helt fri for isolerede Ismasser, medens den blev gennemløbet af Smeltevandet fra Skanderborg Egnen.

Manglen paa en sammenhængende Smeltevandsaflejring gør, at man vanskelig kan danne sig et Overblik over den her skildrede Smeltevandsflod, og der kunde maaske rejses Tvivl om, hvorvidt Terrasselandskabet omkring Skanderborg Sø var samtidigt og sammenhørende med de tidligere beskrevne Smeltevandsdannelser. En nærmere Betragtning af Højdeforholdene turde dog tydeligt vise Sammenhørigheden. Som tidligere nævnt er Højden af Terrassefladen Vest for Skanderborg ca. 160 Fod (50 M.), og Højden af Gudena Terrassen er ud for Vessø godt 120 Fod (38 M.). Faldet er altsaa ca. 40 Fod (13 M.) paa en Strækning af omtrent 10 Km. og svarer til et Gennemsnitsfald af 1:800. Dette stemmer temmelig godt med det lokale Fald indenfor Terrasserne omkring selve Skanderborg Sø, for saa vidt det lader sig bestemme nogenlunde nøjag-

tigt. Det skal dog bemærkes, at Faldet her synes at være lidt forskelligt for de tre omtalte Vandløbs Aflejringer og nærmest noget mindre end 1 : 800.

Paa den anden Side er Højden af Terrasserne omkring Skandeborg Sø ikke saa stor, at de kan betragtes som sammenhørende med en af de ældre og højere Terrasser i den nedre Del af Gudenaa Dalen, noget, som ogsaa den temmelig østlige Beliggenhed paa Forhaand turde udelukke.

2. Aarhus Dalen.

Kun 3 Km. nedenfor det Sted, hvor Vessø Dalen munder ud i Gudenaa Dalen, har denne modtaget endnu et Tilløb fra Isranden, nemlig fra den store Aarhus Dal. Dette Dalstrøgs betydelige Størrelse og den Omstændighed, at det strækker sig østpaa helt ud til Kattegat, maa have bevirket, at det allerede inde under Isen har tjent som Samlerende for Smeltevandet, saa at man allerede paa Forhaand kan formode, at et ikke helt ringe Vandløb har forladt Isen paa det Sted, hvor Isranden stod tværs over Dalen. I Overensstemmelse hermed har man paa Strækningen Vest for Israndslinjen en stor og bred Dal, begrænset af høje og stejle Erosionsskraaninger, og som med Hensyn til Størrelse ikke staar meget tilbage for Gudenaa Dalen. I meget minder den ogsaa om den sidstnævnte Dal. Iøjnefaldende er det saaledes, at Himmelbjergsøerne fortsætter sig østpaa herind med de store Søer Knudsø og Ravnsø; desuden findes et Par mindre Søer og en Mængde tørvefyldte Lavninger, saa at Smeltevandsaflejringer i Dalbunden opsaa her opløser sig i Smaapartier, der som oftest endog kun har en temmelig ringe Udstrækning og derved faar Udseende af smaa, flade Sand- og Grusbakker. Man maa derfor antage, at der ogsaa i Bunden af denne Dal har ligget ret betydelige, døde Ismasser.

Smeltevandsaflejringer i Dalbunden bestaar overalt af Sand med indlejrede Gruslag og synes kun at variere lidet med Hensyn til Kornstørrelsen. Paa Grund af, at hele denne Dannelse nu kun repræsenteres af lutter Smaapartier, er det vanskeligt at danne sig et Billede af dens oprindelige Udseende, og Faldet af Terrassen lader sig derfor ikke angive med absolut Sikkerhed. Man kan nemlig ikke gaa ud fra, at de isolerede, flade Grusbakker, der ligger i Dalbunden, nu gaar op til samme Højde som den oprindelige Terrasseflade, og kun paa ganske enkelte Steder er Partier af denne endnu bevarede. Her skal f. Eks. nævnes, at Terrassehøjden ved Landsbyen Javngyde Nord for Vestenden af Ravnsø synes at være ca. 130 Fod (41 M.), hvilket

omtrent svarer til et Fald af 1 : 1400 ud imod Gudena Dalen. Faldet skulde altsaa kun have været lidt større end i den tilstødende Del af Gudena Dalen og saaledes meget lille; dette turde maaske staa i Forbindelse med, at Smeltevandet i Aarhus Dalen fandt en dyb og bred, imod Vest aaben Afløbsdal.

Helt uhindret kan Afløbet imod Vest dog ikke antages at have været. Baade Knudsø og Ravnsø strækker sig over hele Dalens Bredde, og Smeltevandet maa derfor have banet sig Vej henover de Ismasser, hvis tidligere Plads nu angives af Søerne. For Ravnsø's Vedkommende er der endog Forhold, som kunde tyde paa, at den døde Is her har raget saa højt op, at den i det mindste til at begynde med har dannet en væsentlig Hindring for Afløbet. I Skovene paa Dalskraaningens Syd for Søen findes der nemlig nogle ejendommelige Erosionsformer og terrasselignende Afsatser, hvis Dannelse det forekommer mig, at man naturligtst kan forklare gennem Antagelsen af, at Isen i Ravnsø til at begynde med helt har lukket Dalen, saa at Vandet en Tid lang maatte søge sig Vej imellem Ismassen og den sydlige Dalside og derved frembragte de nævnte, ejendommelige Terrasseformer.

Dette maa dog foreløbig betragtes som noget forholdsvis usikkert, og det hele var næppe Omtalen værd, hvis der ikke var et andet Forhold, som muligvis lader sig forklare ad den samme Vej. Ved en Undersøgelse af Jordbundsforholdene træffer man i Dalbunden Øst for Ravnsø og under det rullede Grus, som fortsætter sig et Stykke østpaa indenfor Israndslinjen til henimod Dalbundens højeste Parti, paa adskillige Steder fedt, stenfrit Ler. Dette er f. Eks. iagttaget et Par Steder Nordvest og Nord for Pittersø, i Terrainet Syd for Vestergaard og i Lindgaard Bakke Nord for Søballe. Ingen af disse Steder er der dog set ordentlige Profiler i Leret. Dette er kun Tilfældet i Bunden af en lille Erosionsrende omtrent midt imellem Søballe og Vænge; umiddelbart Nord for Vejen imellem de to Byer og ind i Nordsiden af Kløften fandtes et smukt, lille Profil i stenfrit Ler, som navnlig foroven viste tydelig, vandret og uforstyrret Lagdeling. Det samme Ler kunde ses paa flere Steder ned langs med Bækken, i Foden af Sydskrænten. Denne Leraflejrning, hvis store Udstrækning man kun kan ane, da den saa godt som overalt er dækket af Sand og Grus, maa sandsynligvis være dannet i Vand, som dæmmedes op i Dalstrøget imellem den spærrende Ismasse i Ravnsø og den østfra fremrykkende Indlandsis, eller maaske under en midlertidig Tilbagerykning af denne, og Forholdene her minder saaledes en Del om en tidligere omtalt Forekomst af stenfrit Ler ved Stilling Station (S. 108). Det er sandsynligt, at Vandsamlingen i denne Del af Aarhus Dalen en Tid lang har staaet i Forbindelse med en stor,

isdæmmed Sø, som opstod i det lidt nordligere Dalstrøg, der nu gennemløbes af Lygumgaard Aa. Senere maa Isranden være rykket frem til den paa Kortet angivne, yderste Stilling, og Dalbundens Sand og Grus aflejredes af det fremstrømmende Smeltevand, efter at dette havde banet sig Vej hen over den døde Ismasse i Ravnø.

3. Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg.

Lidt Nord for Aarhus Dalen strækker der sig et betydeligt, i Vest—Øst gaaende Dalstrøg, hvis bredeste og dybeste Strækning nu gennemløbes af Lygumgaard Aa. I Modsætning til Aarhus Dalen er dette Dalstrøg ikke aabent imod Vest ud imod Gudena Dalen, men staar kun ved en smal og temmelig højtliggende Dal i Forbindelse med denne, og man maa antage, at den oprindelige Afvanding er sket igennem en dyb og bred Forbindelse forbi Mundelstrup Station til den sydøstlige Ende af Lilleaa Dalen.

Da Isen stod med sin Rand i den her betragtede Egn, var kun den vestlige Del af Dalstrøget isfrit, medens Isen spærrede for Afløb imod Øst, og da den tillige strakte sig saa langt frem i den sydfor liggende Aarhus Dal, at den lukkede for de forholdsvis lave Pas imellem de to Dalstrøg, saa at Vandet heller ikke kunde løbe bort til Aarhus Dalen, dæmmedes det op i Lygumgaard Aa's Dal til en Højde, som var bestemt ved Pashøjden i den vestlige Forlængelse af Dalstrøget ud til Gudena Dalen. Der opstod derfor en stor og dyb Smeltevandssø, i hvilken der aflejredes stenfrit Ler og Sand, og ved hvis Bred der paa flere Steder dannedes tydelige Strandmærker. Ved Studiet af disse Forhold kan man danne sig et Billede af de ejendommelige Tilstande, som herskede dengang, og i det følgende skal der blive gjort et Forsøg paa at skildre disse paa Grundlag af de Iagttagelser, som er gjorte ude i Terrainet. Jeg undlader dog ikke at gøre opmærksom paa, at mine Undersøgelser i Marken ikke har været saa detaillerede, som dette Dalstrøgs interessante geologiske Forhold kunde friste til, og en i alle Enkeltheder tilfredsstillende Besvarelse af de mange Spørgsmaal, der her rejser sig, maa være en fremtidig, mere indgaaende Undersøgelse forbeholdt.

Smeltevandssøen. I Lygumgaard Aa's Dalstrøg Vest for Borum Bro og i det omgivende Terrain op til 150 Fods Kurven bestaar Jordbunden for største Delen af stenfrit Ler og Sand. Kun paa enkelte Steder, som f. Eks. paa de stejle Skraaninger, kan Moræneleret, der normalt opbygger de omgivende Højdepartier, gaa frem i

Overfladen, idet der paa saadanne Steder enten ikke er afsat noget Materiale, eller det dannede Ler- eller Sandlag har været saa tyndt, at det i Tidernes Løb er enten fuldstændig forsvundet eller ved Opdyrkningen gjort ganske ukendeligt. Men bortset fra saadanne ubetydelige Morænelersforekomster er stenfri, finkornede Aflejringer det, der karakteriserer Dalstrøget, og Manglen paa Sten i Overfladen i hele det nævnte Omraade er meget fremtrædende og falder navnlig i Øjnene ved en Sammenligning med de tilgrænsende, stærkt stenede Israndsaflejringer.

Allerede disse Forhold røber den tidligere Tilstedeværelse af en stor Sø, og en Bekræftelse af denne Antagelse kan man se i, at der overalt, hvor der har været Lejlighed til at se Profiler i Søbundens Aflejringer, er iagttaget regelmæssig og uforstyrret, vandret Lagdeling. Eksempelvis skal nævnes, at der i en indtil 1 M. dyb Teglværksgrav ca. 500 M. SSV. for Galten Station fandtes stenfrit, lidt sandet Ler med vandret, ganske svagt bølget Lagdeling. — Ganske lignende Ler i vandrette Lag er iagttaget ved Udgravning af en Byggegrund i Galten By ca. 150 M. SSV. for Kirken. Paa dette sidste Sted saas enkelte Smaasten i Leret, og der fandtes endog en lille Klump Grus indesluttet i det, Forhold, som kan tyde paa, at der har været lidt Drivis i Søen. — I Nordsiden af Nederskov og godt 1 Km. Nordøst for Galten er iagttaget et smukt Profil i fedt, stenfrit Ler med tydelig vandret Lagdeling. — Sand med vandret Lagdeling er f. Eks. set i Profil i en lille Grav ved Vejen igennem Hørslev.

Saadanne Aflejringer træffer man, som allerede ovenfor antydet, i hele den brede Del af Lygumgaard Aa's Dalstrøg Vest for Borum Bro. De gaar som Regel op til en Højde af 150—155 Fod (47—49 M.) over Havet og aldrig højere; over denne Højde træffer man næsten altid Moræneler. Heraf fremgaar det, at Søens højeste Vandstand har været godt 150 Fod (47 M.) over den nuværende Havoverflade. Det nævnte Forhold er dog ikke konstateret hele Søen rundt, og navnlig er Observationspunkterne paa Nordsiden kun faa; det er endog tvivlsomt, om man paa denne forholdsvis stejle Skraaning, hvor Aflejringen af Materiale kun kan have været ringe, vil kunne følge en sammenhængende, vandret Grænse imellem Moræneler foroven og Søens lagdelte Dannelse forneden. Men til Gengæld findes der andre Steder, hvor Betingelserne for en paalidelig Bestemmelse af Vandstandens Højde synes at være særlig gunstige, og hvor man endog kan vente at finde tydelige Spor af den tidligere Søbred. Jeg har ved Arbejdet i Marken foretrukket paa et saadant Sted at følge den øverste Kystlinje uafbrudt over en længere Strækning frem for at samle en Del spredte og isolerede Iagttagelser, hvoraf hver enkelt saa ifølge Sagens Natur maatte blive mere eller mindre upaalidelig,

idet man først har Garanti for at staa over for en virkelig Kystlinje, naar man kan følge denne over en længere Strækning.

Et Omraade, der paa Forhaand kan antages at være særlig egnet til Udførelsen af en saadan Bestemmelse, maa man have paa den jævne og kun svagt hældende Skraaning af Klank Højdepartiet imod Nordvest og Nord ned imod Dalstrøget. Og her er det i Virkeligheden lykkedes paa en Strækning af ca. $3\frac{1}{2}$ Km. at følge den gamle Søbred. Denne fremtræder som en vandret Grænse paa godt 150 Fod (47 M.) imellem vel sorteret Sand forneden og Moræneler højere op ad Skraaning. Sandet ude paa Søbunden er i Reglen temmelig fint, men bliver langs med Kysten grovere, og der kan ligefrem optræde et lille Gruslag med Smaasten paa et Par Centimeter. Paa en stor Del af Strækningen fremtræder Kystlinjen som en i Terrainet tydelig Linje, idet Morænelersskraaning oven over staar med en noget stærkere Hældning end den senglaciale Søbund. Det Sted, hvor Overgangen fra den fladere til den stærkere hældende Skraaning findes, har dog ligget en Smule under Vandspejlet, idet Sandet altid gaar lidt op ad den stejlere Skraaning.

Denne Kystlinje lader sig følge langs med hele Nord- og Nordvestsiden af Klank Højdepartiet og ubetydeligt over 150 Fods Kurven. Den strækker sig fra Østenden af Skovby, hvor den støder til Israndslinjen (se nedenfor), i en lille Bue først i nordlig, derefter i vestlig Retning, Syd om Christinedal og videre paa hele det følgende og længste Stykke i Hovedsagen imod Sydvest, omtrent til den naar Aarhus-Silkeborg Landevej. Ca. 300 M. Nord for denne standser Kystlinjen, og længere imod Sydvest gaar Moræneleret ned paa det lavere Terrain. Dette Forhold skal jeg senere komme tilbage til.

Spørgsmaalet om Søens Begrænsning paa det Tidspunkt, da den havde sin største Udbredelse, turde i Hovedsagen være løst gennem det, der er sagt i det foregaaende, idet 150 Fods Kurven paa det nærmeste har dannet Grænsen imod de omgivende Højdepartier. Ganske udtømmende er dette Svar dog ikke, thi 150 Fods Kurven lukker sig ikke helt sammen omkring den langstrakte, store Lavning, men der findes to Steder, hvor Terrainet imellem denne og Aarhus Dalen er lavere end 150 Fod (47 M.). Allerede dette Forhold fører til den Slutning, at Isen i Aarhus Dalen har dæmmet op for Vandet og hindret Afløb ad denne Vej, og endvidere maa man antage, at Isen er trængt frem i den østlige Ende af Lygumgaard Aa's Dalstrøg, saa det er over forholdsvis betydelige Strækninger, at selve Indlandsisen dannede Begrænsningen af Søen. Dette har været Tilfældet ved Søens østlige Ende paa den ca. 6 Km. lange Strækning fra Skovby først imod Øst og derefter imod Nord tværs over Dalstrøget, samt paa et kortere Stykke Sydøst for Høver.

Allerede i et tidligere Afsnit er Grænsen for Isens Udbredelse angivet paa Grundlag af Israndens Morænedannelser; paa de ovenfor nævnte Steder danner Israndslinjen tillige Grænsen for Smeltevands-søens Aflejring. Særlig smukt træder dette frem paa Strækningen Øst for Skovby. Søaflejringerne Nord for Israndslinjen ligger her over et stort Areal med en ganske flad, næsten vandret Overflade og danner herved en tydelig Modsætning til den smaakuperede Israndszone, og Forskellen fremhæves yderligere ved, at den gamle Søbund paa en forholdsvis lang Strækning ligger indtil 20 Fod (6 M.) højere end det bagved liggende Terrain, der tidligere dækkedes af Isen. Selv om det hele her kun er smaat, svarer Forholdene dog ganske til, hvad man kender fra flere Steder, hvor Smeltevandsdannelserne foran Isranden ligger højere end selve Israndszonen som f. Eks. ved Nordsiden af den store Karup Hedeslette eller ved Sydsiden af Tistrup Hedesletten i Grenaa Halvøen (se iøvrigt nærmere herom Side 182—183). Der er dog den Forskel, at de højtliggende Flader de nævnte Steder opbygges af Flodaflejringer, medens Seditet her er afsat under Vand paa en Søbund.

Det andet Sted, hvor Isen har dannet Søens Begrænsning, er paa en ca. $1\frac{1}{2}$ Km. lang Strækning Sydøst for Landsbyen Høver ved den sydlige Ende af et i Nord—Syd gaaende, lavere Strøg, der adskiller Klank Højdepartiet fra det vestligere Højland, og som danner en, ganske vist temmelig højtliggende, Forbindelse imellem det her betragtede Dalstrøg og Aarhus Dalen. Fra Terrainet omkring Galtens strækker Søbundens Aflejringer af stenfrit Ler og fint Sand sig sydpaa ind i dette lave Parti og begrænses imod Øst af et Stykke af den tidligere beskrevne Kystlinje. Dette gælder dog kun saa langt imod Syd som omtrent til Aarhus-Silkeborg Landevej. Syd for denne fortsætter Bakkepartiernes Moræneler sig ned paa lavere Niveau og gaar som et Bælte paa ca. 800 M.s Bredde tværs over det lavere Strøg. Længere imod Syd og umiddelbart foran Israndslinjen træffer man dog igen en Aflejring af fint, ensartet Sand med flad og jævn Overflade, der tildels ligger højere end det bagved liggende Terrain. Imod Vest grænser dette Sandomraade til et højere liggende Morænelerterrain, og Grænsen, der gaar fra Høver imod SSV., synes at forløbe vandret og paa omtrent samme Højde som den omtalte Kystlinje.

Den Omstændighed, at Søbundens Aflejringer ikke fortsætter sig uafbrudt igennem hele det omtalte lavere Strøg, kunde maaske ved første Øjekast tale imod den fremsatte Tydning af Forholdene, at Søen her skulde have strakt en Arm sydpaa, som imod Syd var begrænset af Isen i Aarhus Dalen. En nærmere Betragtning vil dog vise, at denne Uregelmæssighed kun betyder lidet. Det nævnte

Morænelersbælte, som danner Afbrydelsen i Søaflejringerne, ligger nemlig paa det Sted, hvor den oprindelige Lavning imellem de to Dalstrøg har været højest, idet Klank Højdepartiet her skyder sig ud imod Vest over imod det høje Terrain Vest for Lavningen. Det er derfor rimeligt, at Aflejringen af Materiale paa dette Sted har været mindst, og at der kun er bleven afsat et tyndt Lag Sand. Dette højtliggende, tynde Sanddække kan let paa et senere Tidspunkt være skyllet næsten helt bort, og mulige Rester af det kan være gjorte ukendelige ved den senere Opdyrkning. Dette forekommer saa meget mere sandsynligt, som en Betragtning af hele Egnens Højdeforhold viser, at netop den her betragtede Lavning var det Sted, hvor Vandet fra Smeltevandssøen først maatte løbe over, da Isen i Aarhus Dalen begyndte at trække sig tilbage.

Gennem det i det foregaaende sagte kan man danne sig et Begreb om Smeltevandssøens Udstrækning og Form. Det, at den er opstaaet i en Dal, har betinget, at den blev af en betydelig Længde, men kun forholdsvis smal. Bredden var størst længst imod Øst, nemlig omkring $2\frac{1}{2}$ Km., og derfra nogenlunde jævnt aftagende vestpaa. Ved Galten strakte Søen den tidligere omtalte Arm imod Syd, og herved kom Klank Højdepartiet til paa en Maade at danne en Ø, paa den ene Side begrænset af Indlandsisen og iøvrigt omgivet af Søen. Vest for Galten aftog Søens Bredde hurtigt, og den sendte herfra en lang og ganske smal Arm ind i den lille Dal, som strækker sig vestpaa ud til Gudena Dalen. Her gik Bredden ned til mindre end $\frac{1}{2}$ Km., men paa den anden Side var Dybden i den østlige Ende heraf saa stor, at man endnu maa henregne dette Stykke til Søen.¹⁾

Søens Tilløb. Til Trods for, at Isen, som det ovenfor er vist, paa forholdsvis store Strækninger stod ud i Søen, har denne dog ikke modtaget store Mængder af Smeltevand. Dette fremgaar af, at Søaflejringerne er meget finkornede, endog helt ind til Israndslinjen. Paa Strækningen Sydøst for Høver findes saaledes fint Sand, hvori der endog kan findes indlejret Lerlag. Paa den forholdsvis lange Strækning Øst for Skovby varierer Søbundens Aflejringer noget mere. Nærmest Skovby, hvor Dybden af Søen kun har været ringe, findes der rent Sand, men østpaa bliver dette efterhaanden ganske fint og veksler med Ler; længst imod Øst, i Terrainet omkring Hørslev, findes dog atter grovere Sand. I det hele taget er det forbavsende

¹⁾ Dette er saaledes ogsaa gjort paa Profiltegningen paa Tavle III. Herved kommer Søen paa denne Tegning dog til at se uforholdsmæssig stor ud, navnlig hvis man tænker paa dens Vandareal, i Sammenligning med de andre, paa samme Tavle angivne Smeltevandssøer.

finkornede Aflejringer, i Betragtning af, at de er afsatte umiddelbart foran Isranden.

Et lille Tilløb har Søen modtaget ved det nordøstlige Hjørne. Det er allerede tidligere omtalt, at der langs med Israndslinjen paa Strækningen fra Borum til Mundelstrup Gaard og umiddelbart ovenfor Dalskraaningens findes en lav og ganske flad Vold bestaaende af Sand. Man maa tænke sig, at denne Vold, tillige med lidt Sand, der ligger foran den, er afsat af lokalt Smeltevand, som rislede ned over Isranden og derefter løb langs med denne imod Vest til Smeltevandssøen. At det dog ogsaa her kun har drejet sig om en meget ringe Vandmængde, turde fremgaa af, at der ikke engang er bleven tilført saa meget Sand, at den Lavning, hvori Døvmose nu ligger, er bleven helt udfyldt.

Søens Afløb. I Overensstemmelse med, at der kun er tilført Smeltevandssøen en ringe Vandmængde, er ogsaa de Dannelser, som knytter sig til dens Afløb, forholdsvis ubetydelige. Vandet er, medens Søen havde sin største Udbredelse, løbet imod Vest til Gudenaa Dalen igennem den smalle Dal, som med et noget bugtet Forløb strækker sig forbi Laasby, Møllerup og Linaa og munder ud i Gudenaa Dalen ca. 7 Km. ØNØ. for Silkeborg.

Vandet fra Smeltevandssøen har ikke selv nedgravet den nævnte Dal, men denne forefandtes allerede paa det Tidspunkt, da Søen opstod, omtrent i samme Skikkelse som nu. Den har engang tidligere, da en Isrand krydsede Dalen omtrent ved Landsbyen Møllerup, tjent som Afløb for Smeltevand, og dette har givet den dens særlige Karakter. Paa Strækningen Vest for Møllerup træffer man nemlig hele Vejen større og mindre Partier af en ældre Terrasse, der er opbygget af meget groft, rullet Grus, og som efter sin Højde svarer til en ældre (mellemste) Terrasse i den nedre Del af Gudenaa Dalen. Man har derfor her et Dalstykke med regelmæssigt Fald imod Vest. Den østlige Del af Dalen er væsentlig forskellig herfra. Den er smallere og er skaaret dybt ned i det omgivende Højland; dens Bund falder imod Øst ind imod den brede Del af Lygumgaard Aa's Dalstrøg, og hele dette Stykke af Dalen maa tænkes dannet af det subglaciale Tilløb til Gletscherporten ved Møllerup. Der opstod saaledes en Dal, hvis Bund var højest omtrent midtvejs imellem Gudenaa Dalen og det brede Dalstrøg længere imod Øst.

Paa et senere Tidspunkt, da Isen var forsvunden fra dette vestlige Terrain, og den store Smeltevandssø i Lygumgaard Aa's Dal dannedes, var den eneste Vej, Vandet herfra kunde løbe bort, igennem den skildrede Dal. Ind igennem den østlige, dybe Del af denne

strakte Søen, som allerede tidligere nævnt, en ganske smal Arm. Herfra løb Vandet over Paspunktet i Dalen og havde nu frit Løb imod Vest til Gudena Dalen. Paspunktets Højde maatte derfor betinge Vandstanden i Søen, og man faar herigennem en Kontrol paa den ad anden Vej bestemte Vandstandshøjde. Der viser sig her en saa stor Overensstemmelse, som man overhovedet kan vente. Det nuværende Vandskel passerer nemlig Dalen paa 160 Fod (50 M.), men paa dette Sted findes der Tørv i Dalbunden, saa det er ikke urimeligt at antage, at denne ved Tørvedannelsen er bleven højnet de faa Fod, som udgør Højdeforskellen mellem den nuværende Dalbund og den senglaciale Sø's Vandspejl, hvis Højde ovenfor bestemtes til lidt over 150 Fod (47 M.).

Vest for Paspunktet i Dalen træffer man en normalt udviklet Smeltevandstal, igennem hvilken der hele Vejen strækker sig en Aflejring af Sand, som gaar over i Gudena Dalens nederste Terrasse og derved røber sin Samtidighed med alle de tidligere beskrevne Smeltevandstal. Dette Sand er afsat af Afløbet fra Smeltevandssøen, og til Trods for, at Dalbundens Fald er ret betydeligt, er Sandet overalt temmelig fint og bekræfter saaledes den Antagelse, at det kun var et mindre Vandløb, som kom fra Smeltevandssøen. Faldet af Dalbunden, i hvilken den nuværende Linaa kun har nedskaaret sig en ubetydelig Rende, er overordentlig ensartet og tillige stort, f. Eks. 40 Fod (13 M.) paa de sidste $4\frac{1}{2}$ Km. eller omtrent 1:350. Dette Fald er større end Faldet af den ældre Terrasse, saa at Højdeforskellen imellem de to Dannelser tiltager ud imod Gudena Dalen til henimod 40 Fod (13 M.). Iøvrigt giver ikke blot Højden, men ogsaa den meget forskellige Kornstørrelse, en skarp Adskillelse imellem de to Terrasser.

Naar det ovenfor er sagt, at den eneste Vej, ad hvilken Vandet fra Smeltevandssøen kunde komme bort, var igennem den beskrevne Dal, er der dog set bort fra, at Søen muligvis til Tider kan have faaet Afløb over eller under Isen — eller maaske langs med Isranden — til Aarhus Dalen. Det er ikke usandsynligt, at noget saadant af og til kan have fundet Sted igennem det lavere Strøg Syd for Galten, ja det er endog, som det ved en anden Lejlighed er omtalt, muligt, at Søen paa et forholdsvis tidligt Tidspunkt her har haft Forbindelse med en mindre Smeltevandssø, som en Tid lang og under ret ejendommelige Forhold opdæmmedes i en Del af Aarhus Dalen, men herom lader sig foreløbig intet sige med absolut Sikkerhed. Derimod kan man nok gaa ud fra, at Søen, da Isen begyndte at trække sig tilbage i Aarhus Dalen, har faaet et yngre og lavere Afløb netop igennem Lavningen Syd for Galten, idet man her har det laveste Sted i hele det Terrain, der omgav Søen. Den smalle

Erosionskløft, igennem hvilken Lyngbygaard Aa nu løber til Aarhus Dalen, maa nemlig være yngre. Denne Kløft kan ikke være en „Gennembrudsdal“, nedgravet ved et Gennembrud af Vandet fra Søen, efter at Isen var begyndt at trække sig tilbage, fordi den gennemskærer et Parti, der ligger højere end ikke alene Lavningen Syd for Galten, men ogsaa et Par andre lave Steder imellem de to store Dalstrøg. Følgelig maa den være dannet paa normal Maade af et Vandløb, der fra Aarhus Dalen har gravet sig baglængs op igennem Terrainet, til det fik Forbindelse med det store, i Øst—Vest gaaende Dalstrøg, hvis Afvanding det har bemægtiget sig paa Grund af sit større Fald. En saadan Erosion kan ikke have fundet Sted, førend Isen havde trukket sig et godt Stykke tilbage, og nogen Tid har Nedgravningen af Kløften vel ogsaa taget. I denne Mellemtid har det lave Strøg Syd for Galten tjent som Afløb for Søen, og Vandet, der er løbet igennem det, har nedgravet sig en Rende midt i Lavningen. Det højeste Punkt i denne Erosionsrende ligger nu godt 115 Fod (36 M.) over Havet, og det er ikke umuligt, at man i Søen har en Kystlinje svarende til dette Afløb. Der synes saaledes at gaa en Kystlinje paa godt 120 Fods (38 M.) Højde fra Vestsiden af Smedskovhen imod Galten. Denne sidste lagttagelse er dog temmelig usikker, og før der foreligger et detailleret Kort over Fordelingen af Sand og Ler, eller maaske over Observationer af grovere og finere Sand, kan man næppe danne sig et paalideligt Begreb om, hvorledes Vandspejlet i Søen efterhaanden sænkedes. At Søen, inden den helt forsvandt, har staaet med et lavere Vandspejl end oprindeligt, synes ogsaa at fremgaa af, at det stenfrie Ler nede i Dalen paa mange Steder dækkes af endog temmelig groft Sand.

4. Den nedre Gudena Dal.

Alle de fra de forskellige Punkter af Isranden kommende Vandløb, som er skildrede i de foregaaende Afsnit, løb imod Vest ud til Gudena Dalen. Her stødte de til den fra Horsens Egnen kommende Smeltevandsflod, og de forenede Vandløb fulgte derefter det store Dalstrøg videre imod Nord og senere imod Nordøst til Randers Fjord. At dette har været Tilfældet, fremgaar tydeligt af de geologiske Forhold i Gudena Dalen, og i det følgende skal der derfor blive omtalt Hovedtrækkene i denne Dals Bygning.

Gudena Dalen mellem Gudensø og Silkeborg. I et tidligere Kapitel er der skildret den øvre Del af Gudena Dalen, og Beskrivelsen er

ført saa langt nordpaa som til Egnen Nord for Vestenden af Mossø. Paa dette Sted bøjer den nuværende Gudenaas imod Nord og løber igennem Gudensø og Rye Mølleø, der begge ligger i det smalle og forholdsvis uanselige Dalstykke, som imod Øst afgrænser det høje Terrain Syd for Himmelbjerget og adskiller det fra Plateaulandet Syd for Aarhus Dalen. Den samme Vej har den senglaciale Gudenaas benyttet for at naa ud i det store Dalstrøg, som fra Aarhus strækker sig vestpaa ind igennem Jydland til helt forbi Silkeborg, og hvis østlige Del flere Gange tidligere er omtalt under Benævnelsen Aarhus Dalen. Det Stykke af dette Dalstrøg, som gennemløbes af Gudenaas, er i landskabelig Henseende en af Danmarks smukkeste Dale. De høje og stejle, skovbevoksede eller lyngklædte Dalsider, de flade Dalterrasser og de talrige større og mindre Søer giver denne Egn en rig Afveksling og en fra andre danske Landskaber afvigende Karakter.

De nævnte Terrainformer staar i nøje Forbindelse med Dalens Udviklingshistorie, og man har i Virkeligheden her ganske de samme Forhold som i den nærmest sydligere Del af Gudenaas Dalen; kun falder Fordybningerne i Dalterrassen mere i Øjnene i denne Egn, fordi de danner Søer, medens de tilsvarende Lavninger i det sydligere Terrain for største Delen er tørvefyldte. Man har altsaa ogsaa her en udpræget Smeltevandsdal; den er udformet af den fra Horsens Egnen kommende, store Smeltevandsflod, hvis Vandmængde endog var bleven noget forøget ved de modtagne Tilløb fra Skanderborg Egnen og Aarhus Dalen. Og de mange større og mindre Søer, som ligger spredte igennem hele Dalbunden og endog kan fortsætte sig ind i Lavninger i det omgivende Højland, maa tænkes opstaaede paa samme Maade som de tidligere beskrevne Fordybninger i Dalterrassen; de betegner saaledes Steder, hvor isolerede Ismasser er blevne liggende i det dybe Dalstrøg og har hindret den fuldstændige Udfyldning med Sand og Grus.

En Del af Søerne i denne Egn er af en ret betydelig Størrelse og har en ikke ringe Dybde. Størst er Juelsø, der ligger Nord for Himmelbjerget, og som strækker sig over hele Dalens Bredde ligesom Knudsø og Ravnsø i Aarhus Dalen, saa at Smeltevandsfloden maa have løbet henover den begravede Ismasse. Derefter følger Borresø, der ligger ved Dalens Sydside og herfra sender en stor Bugt ind i en smal og dyb, noget uregelmæssigt formet Dal, som strækker sig imod Vest, Syd om Vesterskov Bakkepartiet. Den næste store Sø er Brassø, ligeledes ved Dalens Sydside, og derefter følger nogle Smaasøer i Nærheden af Silkeborg.

I den Del af Dalbunden, der ikke indtages af Søerne, findes der saavel smaa som store og sammenhængende Partier af en Dalterrasse,

der er et tydeligt Vidnesbyrd om den Tid, da Dalen blev gennemløbet af den sydfra kommende Smeltevandsflod. Thi til Trods for de beskrevne Sødannelser er der dog endnu bevaret saa meget af Terrassen, at man let kan danne sig et Billede af dennes oprindelige Udseende og Højdeforhold, saa at man kan se, at den baade med Hensyn til den absolute Højde og til Faldets Størrelse danner en direkte Fortsættelse af Terrassen i den sydligere Del af Gudena Dalen.

Ved Vurderingen af disse Forhold gaar man, som det allerede ved en tidligere Lejlighed er fremhævet, bedst ud fra de lavere og flade Dele af Terrassen ude midt i Dalen, idet der ofte langs med Dalsiderne findes betydelige Aflejringer af Materiale udenfor de Erosionskløfter, som ses overalt i de sandede Dalskraaninger, og noget saadant er netop i stor Udstrækning Tilfældet i den her betragtede Del af Gudena Dalen. Men ser man paa de flade Terrassestykker ude i Dalen, faar man et Billede af en regelmæssig og svagt skraanende Dalbund i Forlængelse af den sydligere Terrasse. Størrelsen af Faldet er stadig langsomt aftagende; det kan saaledes ved Gudensø anslaaes til at være ca. 1:1800, medens det ved Silkeborg er aftaget til ca. 1:2000.

Det skal endnu nævnes, at der allerede i den her beskrevne Del af Gudena Dalen synes at forekomme spredte Rester af en højere og ældre Terrasse, og det ikke alene i det store Dalstykke imellem Silkeborg og Rye Station men ogsaa i Forbindelsesdalen Syd for det sidstnævnte Sted f. Eks. paa begge Sider af Vessø Dalens Munding. Disse Terrasserester, der viser hen til, at Dalen allerede paa et tidligere Tidspunkt har været benyttet af en Smeltevandsflod, er dog endnu meget sparsomme og ikke paa langt nær saa tydelige som tilsvarende Dannelser længere nordpaa.

Gudena Dalen nedenfor Silkeborg. Efter at Gudena Dalen paa hele Strækningen fra Rye Station til Silkeborg har haft en Retning i ØSØ.—VNV., danner den ved Silkeborg en meget brat Ombøjning og antager endog paa en kort Strækning en Retning imod ØSØ. og parallel med det foregaaende Stykke, saa at de to Dele af den kun adskilles af en ca. 1 Km. bred, tilbagestaaende Kam af Højlandet. Snart bøjer Dalen dog atter imod Nord og antager efterhaanden en mere og mere nordlig Retning — ja paa den anden Side af Tvillum Kirke endog imod NNV. Derefter følger en Strækning, hvor Dalen har et meget bugtet Forløb, idet den danner to store, hinanden modsat rettede Buer, hvorved den faar en iøjnefaldende S-Form. Den første af disse Buer vender imod Nordøst, og her er Ombøjningen

brattest; derefter følger den anden, noget større og imod Sydvest konvekse Dalbue. Fra denne fortsætter Dalen sig paa et langt Stykke imod ØNØ. forbi Bjering Bro til henimod Langaa, hvor den atter danner en lille Bue imod Syd over imod Lilleaa Dalens Munding. Paa den følgende Strækning er Dalen svagt bugtet og Retningen nordøstlig til Randers.

Hele den sidst beskrevne Del af Gudenaa Dalen er en typisk Smeltevandsdal med smukke Terrassedannelser, der ikke, som længere sydpaa, brydes af Søer og dybe Lavninger. Kun nærmest Silkeborg har man endnu en Sø af den sædvanlige Type, nemlig Silkeborg Langsø, men længere nedad Dalen gennemskaeres den yngste Terrasse kun af Gudenaa og det Bælte af alluviale Dannelser, der følger denne; imod Syd er dette dog kun smalt, og først længere nordpaa breder det sig ud over Dalbunden.

Igennem hele Dalstrøget findes smukke Terrasser, et Stykke nede ad det endog tre forskellige. Af disse tilhører de to højeste dog ældre Afsnit af Dalens Dannelseshistorie¹⁾, og de findes kun som spredte Terrassestykker langs med Dalsiderne og ind i de tilstødende Dale. Den yngste og laveste Terrasse, som her interesserer mest, fordi det er den, som danner Fortsættelsen af den tidligere beskrevne Smeltevandsaflejring, kan derimod følges uafbrudt igennem Dalen. Dog er det ikke altid helt let at angive den nøjagtige Højde af Terrassefladen ude i Dalen, da den postglaciale Erosion her har været ret betydelig, navnlig for den nordligste Stræknings Vedkommende. Man kan dog let se, at Terrassen stadig danner en svagt skraanende Flade ned igennem Dalen. Højden, der ved Silkeborg er noget over 90 Fod (28 M.), er saaledes ved Tvillum Kirke godt 70 Fod (22 M.), ved Bjering Bro lidt under 40 Fod (13 M.) og ved Langaa ca. 20 Fod (6 M.) Nedenfor Langaa bliver Terrassehøjden saa ringe, at hele Dalbunden dækkes af Alluvium. Af de nævnte Tal fremgaar det, at Faldet kun er ringe, og at det stadig aftager noget nedad. Medens det ved Silkeborg endnu er ca. 1:2000, er det ved Langaa aftaget til ca. 1:2500.

Medens Gletscherfloderne fra Skanderborg Egnen og Aarhus Dalen allerede naaede ud i et tidligere beskrevet Afsnit af Gudenaa Dalen, modtog derimod den her betragtede Del af denne Afløbet fra den store Smeltevandssø i Lygumgaard Aa's Dalstrøg. Det mundede ud i Dalen 7 Km. ØNØ. for Silkeborg og paa en Højde af ca. 80 Fod. Fra dette Sted fjernede Gudenaa Dalen sig ved sin nordlige Retning paa

¹⁾ USSING, N. V. 1903. Geologi og Overfladeforhold. TRAP, J. P. Kongeriget Danmark. 3die Udg. Bd. 1. S. 21.

USSING, N. V. 1904. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. 2den Udg. S. 258—267.

en lang Strækning saa meget fra Isranden, at intet Vandløb herfra kunde naa Forbindelse med den. Først ved Langaa modtog den, paa en Højde af ca. 20 Fod (6 M.), endnu en betydelig Gletscherflod, som igennem den smukke Dal, der nu bliver gennemløbet af Lilleaa, søgte denne Vej ud. Men dette var ogsaa det sidste Vandløb, som forenede sig med den senglaciale Gudena, førend denne mundede ud i Kattegat i Egnen Nordøst for Randers. Her mødte den dog en anden stor Smeltevandsflod, der kom fra Egnen Syd for Grenaa og en Tid lang løb tværs igennem hele Grenaa Halvøen for ligeledes at naa Havet ved Randers Fjords Munding.

5. Lilleaa Dalen.

Endnu staar tilbage at gøre Rede for det sidste og nordligste af Smeltevandstilløbene til Gudena Dalen, nemlig Gletscherfloden igennem Lilleaa Dalen. Som det allerede ved en tidligere Lejlighed (S. 117) er fremhævet, danner dette Dalstrøg paa en lignende Maade som Aarhus Dalen en direkte Forbindelse imellem Kattegat og Gudena Dalen, og det er omtalt, at ogsaa her den imod Gudena rettede Del af Dalen er en udpræget Smeltevandsdal, medens den sydøstlige Ende med sine afglattede og udjævnede Dalsider bærer tydeligt Præg af Isens Omformning. Trods sin afhøvlende og udfyldende Virksomhed har Indlandsisen dog ikke formaaet at udslutte den dybe Dalfure, og man maa antage, at denne, ligesom Østenden af Aarhus Dalen, ikke blot har fremmet Isens Bevægelse, men ogsaa har tjent som Samlerende og Vej for det under Isen fremstrømmende Smeltevand.

Som en Dannelse, der muligvis kan henføres til et saadant subglacialt Vandløb skal nævnes en ejendommelig, aasalignende Bakke, den 172 Fod (54 M.) høje Stenshøj, som ligger i Bunden af den sydøstlige Ende af Dalstrøget straks Øst for Landsbyen Kasted. Ved sin skarpe Form og ved udelukkende at bestaa af Sand og rullet Grus adskiller den sig tydeligt fra de jævnt skraanende, moræneler-dækkede Dalsider. Dertil kommer, at Bakken har en udpræget Længderetning, der falder sammen med Dalstrøgets Retning paa dette Sted, nemlig i Øst—Vest, saa alt synes at tyde paa, at man her har en aasagtig Dannelse knyttet til et subglacialt Tilløb til Lilleaa Dalen, men noget sikkert lader sig dog næppe sige.

Med langt større Sikkerhed kan man derimod følge Smeltevandet udenfor Isens Omraade. Paa det Sted, hvor Isranden stod tværs over Dalstrøget, har et betydeligt Vandløb forladt Isen og er løbet imod Nord og derefter imod Nordvest. Udenfor Israndslinjen og videre ned igennem Lilleaa Dalen finder man nemlig en smuk Smeltevands-

aflejring, som lader sig følge uafbrudt igennem hele Lilleaa Dalen, til den Syd for Langaa gaar over i Gudenaa Dalens nederste Terrasse. Denne Smeltevandsaflejring falder dog paa en Maade i to forskellige Dele, ved at Smeltevandsfloden i Nærheden af Lerbjerg mundede ud i en stor Lavning, i hvilken der paa dette Tidspunkt maa have staaet en Sø. Den nederste Del af Lilleaa Dalen, hvorigennem Afløbet herfra skete, afviger, som det senere skal blive vist, i flere Henseende fra det foregaaende Stykke, og ved den mere indgaaende Beskrivelse vil det derfor være hensigtsmæssig at behandle hver Del for sig.

Lilleaa Dalen mellem Søften og Lerbjerg. Fra Israndslinjen ved Søften strækker Lilleaa Dalen sig med et bugtet Forløb imod Nord; først ned imod Hadsten Stationsby begynder den at bøje imod Vest, og lidt nedenfor denne By drejer den pludselig imod Sydvest og danner en stor, imod Syd rettet Bue, inden den med nordlig Retning munder ud i den store Lavning Øst for Lerbjerg. Denne Bue bliver dog ikke gennemløbet af den nuværende Lilleaa; den har ved Ombøjningen Vest for Hadsten nedgravet sig en lille Rende igennem den lave Barriere, som her adskiller Dalen fra Lavningen Øst for Lerbjerg, for igennem denne at naa ad den korteste Vej til den nederste Del af Dalen.

Det skildrede Stykke af Lilleaa Dalen har en Længde af omtrent 18 Km. Bredden er ret betydelig, men noget forskellig de forskellige Steder; den varierer saaledes for den senglaciale Dalbunds Vedkommende fra $\frac{1}{2}$ Km. til over 1 Km. Navnlig udmærker den sidste store Dalbue sig ved sin anselige Bredde, men ogsaa omtrent midt imellem Hinderup og Hadsten er der en Strækning, hvor Dalen breder sig betydeligt.

Smeltevandsaflejringen, som strækker sig ned igennem Lilleaa Dalen, er paa den beskrevne Strækning meget smukt udviklet, og i det hele taget er Forholdene her overordentlig klare. Hele Vejen finder man en flad og regelmæssig Sandflade, ned i hvilken den nuværende Lilleaa har gravet sig en yngre, smal Dal. Lilleaa's Fald er større end Faldet af Terrassen, saa jo længere man kommer imod Nord, des større bliver Højdeforskellen imellem Terrassefladen og den alluviale Tørveflade langs med Aaen. Noget nordpaa træffer man derfor meget smukke Terrasselandskaber. Det kan saaledes nævnes, at det Fotografi, som er gengivet i Ussing's Danmarks Geologi, 2den Udg. S. 245, er fra et Sted i Lilleaa Dalen omtrent midt imellem Hinderup og Hadsten. Til yderligere Oplysning om Dalens Udseende meddeles her (Tavle XIV, Fig. 1) et andet Billede, der er taget fra det

samme Sted men i modsat Retning (imod Øst), og som viser selve den sandede Terrasseflade samt i Baggrunden Dalens stejle Østskraaning.

I det foregaaende er der skildret det umiddelbare Indtryk, man faar af den øverste Del af Lilleaa Dalen. Paa de følgende Sider skal der blive gjort Rede for en mere indgaaende Undersøgelse af dens Smeltevandsaflejring. Naar denne undtagelsesvis underkastes en forholdsvis vidtløftig Behandling, er det fordi Lilleaa Dalens Terrasse i Virkeligheden indbyder til en saadan Detailundersøgelse. Thi kun faa Steder træffer man en saa regelmæssig og velbevaret Dalaflejring; dertil kommer, at Forholdene ikke er større, end at de let lader sig overse, og dog paa den anden Side saa store, at Resultaterne af en Undersøgelse maa kunne paaregne almindelig Interesse ved muligvis at kaste Lys over flere Sider af vore Smeltevandsdales Dannelseshistorie. Endvidere skal det fremhæves, at det nævnte Stykke af Dalen paa en Maade danner et samlet Hele fra Udspringet ved Isranden, til den munder ud i Søen ved Lerbjerg.

Hvad først Overfladeforholdene angaar, da kan det siges, at Faldet af Terrassen ikke er synderlig stort. Udenfor Israndslinjen ligger Terrassefladen ude midt i Dalen paa ca. 110 Fod (35 M.)¹⁾, og Syd for Lerbjerg er Højden ca. 55 Fod (17 M.). Højden aftager altsaa med ca. 55 Fod (17 M.) paa den omtrent 18 Km. lange Strækning, hvilket svarer til et Gennemsnitsfald af ubetydeligt under 1:1000.

En nærmere Betragtning viser, at Faldet ikke er ens paa hele Strækningen, selv om det dog ikke varierer meget. Det er saaledes paafaldende, at det første Stykke af Smeltevandsaflejringen er forholdsvis fladt, idet Faldet paa de første 7 Km. kun er 20 Fod (6 M.) eller ca. 1:1100. Derefter følger en Strækning paa $8\frac{1}{2}$ Km. med temmelig ensartet, men lidt større Fald, idet Højden her aftager med 30 Fod (9 M.) svarende til et Fald af 1:900. Endelig er Faldet paa det sidste, korte Stykke, før Dalen munder ud i Lavningen ved Lerbjerg, igen aftagende.

Naar det er sagt, at Faldet først er mindre og derefter større, maa det dog ikke forstaaes saaledes, at der er en skarp Grænse imellem de to Dele af Terrassen. Tværtimod findes der en jævn Overgang fra det svagere til det stærkere Fald, saa at Dalprofilen

¹⁾ Højdeangivelserne gælder her ligesom tidligere for Terrassefladen ude i Dalbunden, idet man ogsaa i Lilleaa Dalen træffer Steder, hvor Terrassen stiger ud imod Dalsiderne og danner smaa »Aflejringskraaninger« ved Foden af de egentlige Dalskraaninger, som paa saadanne Steder bestaar af Sand eller Grus og er gennemfurede af smaa Erosionsrender. For at have ganske bestemte Udgangspunkter for Angivelserne af Faldets Størrelse regnes der med Afstandene mellem de Steder, hvor Horizontalkurverne har overskredet den oprindelige Dalbund. Disse Steder lader sig nemlig som Regel angive med temmelig stor Nøjagtighed, da den postglaciale Erosion ikke har været synderlig stor, og Lilleaa's alluviale Dalrende oftest kun er ganske smal.

danner en opadbuget Linje — et Forhold, som skal blive berørt ved en senere Lejlighed.

Ser man dernæst paa selve Smeltevandsaflejringen, viser det sig, at Terrassen, som det allerede tidligere er antydnet, overvejende bestaar af Sand, der dog næsten overalt indeholder Gruslag i større eller mindre Mængde og med vekslende Grovhed. Overalt, hvor der har været Lejlighed til at se rene Profiler, har Aflejringen udvist diskordant Parallelstruktur. Et særlig smukt Profil i Sand med underordnede Gruslag iagttoges i 1903 ved Sydsiden af Dalen Syd for Hadsten Station, idet der her i Anledning af Banens Udvidelse var aabnet en stor Grav. Ved mit Besøg stod den indtil 5 M. høje Østvæg i Graven ren. Fig. 2 paa Tavle XIV giver et Begreb om dens Udseende, der altsaa viser et „Tværnsnit“, hvori de overskaarne Lag ses at hælde uregelmæssigt til begge Sider. Et tilsvarende „Længdeprofil“, hvori de forskellige Partier i Aflejringen havde Hældninger af forskellig Størrelse men i omtrent samme Retning, nemlig imod Vest og Nordvest, fandtes ubetydeligt længere nede i Dalen og ca. 500 M. Vest for Hadsten Station.

Ved at færdes ude i Dalen lægger man Mærke til, at Grovheden af Smeltevandsaflejringen varierer en Del, og der synes ogsaa her at være en vis Sammenhæng imellem Kornstørrelsen og Dalens Bredde. For nærmere at belyse dette Forhold er der indsamlet en Række Prøver ned igennem Dalen, og i disse er der ved Sigtning foretaget Kornstørrelsesbestemmelser. Men inden jeg meddeler Resultaterne af disse, skal jeg give en kort Beskrivelse af de Steder, hvorfra Prøverne stammer.

Nr. 1. Prøven toges omtrent 1 M. under Overfladen ved at grave ned paa flad Mark 300 M. Sydøst for Elbæk Gaard — altsaa umiddelbart ved Israndslinjen. Dalaflejringen var her noget sandet og ikke fuldstændig vandsorteret. Der fandtes Sten paa indtil et Par Decimeter, og enkelte af disse viste endnu Spor af Isskuring.

Nr. 2. 400 M. Sydvest for Damsbro gravedes ligeledes et Hul, og her toges en Prøve godt 1 M. nede. Jordbunden havde endnu her et lidt moræneagtigt Præg og var iøvrigt ganske overvejende sandet.

Nr. 3. 400 M. SSV. for Gl. Hinderup stod der rullet Grus frem i en lille Afgravning ind i den her kun lave Terrasse-skraaning. Prøven toges saa vidt muligt overalt i en ca. $\frac{3}{4}$ M. høj Pille.

Nr. 4. Prøven stammer fra en lille Grav i Sand med Gruslag 500 M. VNV. for Gl. Hinderup; den er taget ligeligt i en 1 M. høj Pille og ca. $1\frac{1}{2}$ M. under Overfladen.

Nr. 5. I Sydskraaningen af en lille Sidekløft til den alluviale Lilleaa Dal og 900 M. Sydvest for Grundfør Vandmølle fandtes en noget tilskreden Grav i vekslende Lag af Sand og Grus. En Prøve heraf toges i en $\frac{3}{4}$ M. høj Pille ca. $1\frac{1}{2}$ M. under Overfladen.

Nr. 6. I den stejle Terrasseskraaning 300 M. Nordvest for Frøkær stod lignende vekslende Lag af Sand og Grus frem. En Prøve heraf toges nogenlunde ligeligt i en godt $\frac{1}{2}$ M. høj Pille omtrent halvt nede ad Skraaning.

Nr. 7. 400 M. Vest for Haraldslund gravedes et Hul ind i den her mindre stejle Terrasseskraaning omtrent halvt nede ad denne. Her toges en Prøve af Sand med Gruslag.

Nr. 8. 1100 M. NNW. for Haraldslund og straks Øst for Broen over Lilleaa imellem Haar og Tostrup staar Terrassen paa et kort Stykke med en stejl Skraaning ned imod Aaen. Smeltevandsaflejringen bestaar her af fint Sand med enkelte ganske tynde Lag med grovere Korn. Det er uvist, om der ogsaa her findes diskordant Parallelstruktur. En Prøve toges i et Hul omtrent midt paa Skraaning.

Nr. 9. Prøven bestaar af lignende fint Sand; den er taget 1400 M. ØSØ. for Sandby i Foden af Terrasseskraaning og ikke fuldt 1 M. over Tørvens Overflade.

Nr. 10. I en Grav 1000 M. Nordøst for Sandby saas vekslende Lag af Sand og fint Grus med smuk diskordant Parallelstruktur. En Prøve toges ligeligt i en 1 M. høj Pille, hvis Midte var ca. $1\frac{3}{4}$ under Overfladen.

Nr. 11. Prøven er taget 1100 M. Sydøst for Kollerup paa Terrasseskraaning ca. $2\frac{1}{2}$ M. over Tørvens Overflade og i en $\frac{3}{4}$ M. høj Pille med vekslende Sand- og Gruslag.

Nr. 12. I en flad Grusgrav 450 M. NNW. for Kollerup iagttoges vekslende Lag af Sand og paafaldende groft Grus. Tilstedeværelsen af dette grove Grus turde skyldes en Tilførsel af Materiale fra Dalsiden; Graven ligger nemlig nær ved Dalsiden og desuden ud for Mundingen af en Kløft ind i denne. Ogsaa det Forhold, at der i Gruset forekommer adskillige norske Blokke, peger i samme Retning. En Prøve toges i en 1 M. høj Pille $1\frac{1}{2}$ under Overfladen.

Nr. 13. Prøven stammer fra den tidligere omtalte Grav i Sand med Gruslag 500 M. Vest for Hadsten Station. Den er taget ligeligt i en 1 M. høj Pille.

Nr. 14. I en lille Grav midt i Dalen og 800 M. Øst for Henriettesminde fandtes Sand med fine Gruslag. En Prøve heraf toges i en 1 M. høj Pille 1 M. under Overfladen.

I de indsamlede Prøver er de grovere Bestanddele og deres indbyrdes Mængdeforhold blevne bestemte ved Sigtning, og Resultaterne findes anførte i hosstaaende Tabel I. I samtlige Analyser er Adskillelserne ved 50, 20, 10 og 5 Mm. foretagne paa hele Prøven, hvis samlede Vægt derfor ogsaa er angivet i Tabellen. Af det, som havde passeret 5 Mm.'s Sigten, afvejedes 100 Gr., som sigtedes igennem 2 og 1 Mm.'s Sigterne¹⁾, og af Korn mindre end 1 Mm. afvejedes sluttelig 10 Gr., der adskiltes ved 0,5 Mm.

Tabel I.

Nr.	Sted	Procentindhold af Korn:							Prøvens Vægt i Gram
		50 Mm. ∧	50—20	20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,5	
1	Sydøst for Elbæk Gaard	16,0	12,2	4,2	2,7	4,0	2,7	10,2	11550
2	Sydvest for Damsbro	0	5,5	3,6	3,7	6,8	6,2	7,8	6986
3	SSV. for Gl. Hinderup	6,4	18,9	9,8	7,2	11,2	9,6	19,0	8155
4	VNV. for Gl. Hinderup	0	0,5	2,8	4,0	8,8	8,5	24,7	3986
5	Sydvest for Grundfør Vandmølle .	0	5,3	7,0	6,2	8,5	4,1	11,3	6509
6	Nordvest for Frøkær	0	3,8	6,0	5,8	8,7	8,0	13,4	3186
7	Vest for Haraldslund	0	2,2	2,8	2,1	5,2	8,5	17,2	2198
8	NNV. for Haraldslund	0	0	1,4	1,7	1,2	1,4	3,9	425
9	ØSØ. for Sandby	0	0	0	0	0,6	0,6	3,2	217
10	Nordøst for Sandby	0	0,3	1,5	2,3	7,5	13,7	29,0	1904
11	Sydøst for Kollerup	0	3,2	6,4	4,0	7,0	9,5	20,6	1996
12	NNV. for Kollerup	10,1	11,9	4,8	3,1	3,7	2,5	18,2	11109
13	Vest for Hadsten Station	0	5,5	5,0	4,1	8,9	11,1	24,1	2679
14	Øst for Henriettesminde	0	0	1,8	1,5	4,9	9,5	38,4	1330

Tallene i Tabellen giver et Begreb om Smeltevandsaflejringens Sammensætning og fortjener derfor en lidt nærmere Betragtning. De to første Prøver, der endnu har noget af Morænekaraktern, udviser et forholdsvis stort Sandindhold i Forbindelse med en Indblanding af Sten, der navnlig i Nr. 1 er temmelig betydelig. Først i Prøven Nr. 3 har man en fuldstændig vandsorteret Aflejring, hvis meget ringe Sandindhold, der navnlig falder i Øjnene ved en Sammenligning med den følgende Prøve, som er taget kun 600 M. længere nede ad Dalen, dog synes at tyde paa, at man endnu saa langt fra Is-

¹⁾ For de to fineste og kun smaa Prøvers Vedkommende (Nr. 8 og 9) anvendtes dog ogsaa her den hele Prøve.

randen har haft en uregelmæssig Afsætning af Materiale, underkastet tilfældige Variationer. Alle de øvrige Prøver viser derimod større Regelmæssighed; saaledes varierer Indholdet af fint Sand med Korn mindre end 0,5 Mm. for de 7 af de 11 Prøvers Vedkommende kun imellem ca. 40 og 60%, medens 2 (Nr. 8 og 9) er kendeligt finere. Disse to Prøver stammer ikke fra det nederste Stykke af Aflejringen, men tværtimod fra dennes mellemste Del, og i det hele taget maa det fremhæves som det første iøjnefaldende Resultat af

Tabel II.

Nr.	Procentindhold af Korn:				Dalbundens Bredde i Meter	Afstand fra foregaaende Sted i Meter	Terrasseover- fladens Gennem- snitsfald
	50 Mm. ∧	50—5	5—0,5	0,5 Mm. ∨			
1	16	19	17	48	1100		
2	0	13	21	66	800	800	
3	6	36	40	18	800	800	
4	0	7	42	51	600	600	
5	0	18	24	58	500	1100	
6	0	16	30	54	600	1500	
7	0	7	31	62	700	800	
8	0	3	7	90	1000	1000	
9	0	0	4	96	1000	700	
10	0	4	50	46	600	1100	
11	0	14	37	49	500	1100	
12	0	10	31	59	700	1400	
13	0	15	44	41	600	1400	
14	0	3	53	44	1100	1800	

Undersøgelsen, at der ikke er Tale om nogen regelmæssig Aftagen i Kornstørrelsen ned igennem Dalen.

Det næste Spørgsmaal, som rejser sig, er, om det da er muligt at paavise nogen anden Grund til Variationen af Kornstørrelsen. Svaret er allerede tidligere antydnet, ved at det er sagt, at der synes at bestaa en Forbindelse imellem Dalens Bredde og Aflejringens Grovhed. Analyserne bekræfter dette. Det er dog vanskeligt gennem Tabellens mange Tal at danne sig et klart Billede af Forholdene, og jeg har derfor søgt paa Grundlag af den første Tabel at sammenstille en anden og mere overskuelig ved at sammenfatte de enkelte Bestemmelser i større Grupper samt afrunde Procentmængderne heri til hele Tal. For en enkelt Prøves Vedkommende er der foretaget en

yderligere Ændring. Det er med Nr. 12. Allerede under Beskrivelsen af Findestederne er det nævnt, at der her er en tydelig Indblanding af fremmed Materiale, og Analysen (Tabel I, Nr. 12) viser det samme, idet den store Mængde af de groveste Dele staar i et udpræget Misforhold til de smaa Procenttal for det finere Grus. Man maa i Virkeligheden tænke sig, at der her er tilført en ikke ringe Mængde af saavel groft som fint Materiale fra Dalsiden; men medens Sandet og det finere Grus kunde transporteres af Smeltevandsfloden og derfor kom til at indgaa som et normalt Led i Aflejringen, blev de større Sten tilbage. De høje Procenttal for de større Sten er Resultatet af denne Indblanding, og man maa derfor tilnærmelsesvis kunne faa Begreb om, hvad man kunde kalde Aflejringens normale Sammensætning paa dette Sted, ved at se bort fra de Sten, der er større end 20 Mm., og regne de øvrige Tal om i Procent. Dette er gjort i hosstaaende Tabel II. I denne er tillige til Sammenligning angivet Bredden af den senglaciale Dalbund samt for Fuldstændighedens Skyld Afstandene imellem Findestederne, maalte langs med Dalens Midtlinje. Da man kan vente, at ogsaa Dalbundens Fald har haft Indflydelse paa Strømhastigheden og derved paa Kornstørrelsen i det aflejrede Materiale, er endelig Terrasseoverfladens omtrentlige Fald ogsaa anført.

Ser man bort fra de første Prøver, hvis uregelmæssige Sammensætning maa forklares ved Israndens Nærhed, viser Tabellen, at Smeltevandsaflejringens Kornstørrelse aftager tydeligt, hvor Dalen breder sig, og omvendt. Særligt iøjnefaldende er det, at Aflejringen i den store Bredning af Dalen omtrent midt imellem Hinderup og Hadsten er meget finkornet og endog finere end i den lidt bredere Del af Dalen noget nedenfor Hadsten. I det hele taget synes Aflejringen at være ubetydeligt grovere i Forhold til Dalbredden paa hele Strækningen nedenfor den nævnte Bredning, og det er muligt, at dette Forhold staar i Forbindelse med, at Faldet her er lidt større, men iøvrigt skal det fremhæves, at man selvfølgelig maa være forsigtig med at drage Slutninger paa Grundlag af saa smaa Variationer som disse. For det første kan tilfældige Forskelligheder, bl. a. hidrørende fra, at de indsamlede Prøver ikke kan stamme fra absolut samtidige Lag i Aflejringen, virke forstyrrende, og for det andet maa man ved Bestemmelsen af Faldet gaa ud fra Terrasseoverfladen, der slet ikke behøver at være parallel med Aflejringens Underlag, saa at Faldet godt kan have forandret sig under Dannelsen af Smeltevandsaflejringen, og noget saadant er endog sandsynligt for Lilleaa Dalens Vedkommende.

Resultaterne af den foretagne Detailundersøgelse kan sammenfattes i følgende: Paa Strækningen nærmest Isranden er Aflejringen af

Materiale foregaaet temmelig uregelmæssigt, men allerede lidt nede ad Dalen ændres dette Forhold. Man finder dér en Aflejring, indenfor hvilken de smaa Variationer i Faldets Størrelse ikke spiller nogen sikkert paaviselig Rolle med Hensyn til Kornstørrelsen, medens denne er i høj Grad afhængig af Dalens Bredde, saaledes at den ene aftager, naar den anden vokser, og omvendt. Dette sidste Forhold har betydelig Interesse, idet man herigennem faar en Forestilling om, hvor stort et Vandløb den senglaciale Lilleaa i Virkeligheden har været. Thi selv om man ikke kan gaa ud fra, at Smeltevandets floden har udfyldt hele Dalbunden, viser det dog, at den har ført en saa betydelig Vandmængde, at Dalens Bredde har haft en væsentlig Indflydelse paa Strømhastigheden, som er den Faktor, der betinger det aflejrede Materiales Grovhed.

Der er i det foregaaende stadig gaaet ud fra, at Smeltevandets Virksomhed har været en Aflejring af Materiale i Dalbunden og følgende, at Dalstrøget eksisterede allerede inden den Tid, da det benyttes af den her betragtede Smeltevandets flod. At denne Forudsætning er rigtig, fremgaar af forskellige Ting. Allerede Dalstrøgets udprægede Fortsættelse imod Sydøst indenfor Israndslinjen synes at vise, at man her staar overfor en gammel Dal, der oprindeligt har staaet i direkte Forbindelse med Kattegat. Desuden viser Smeltevandets aflejringens betydelige Mægtighed det samme; det kan saaledes nævnes, at dens Underlag ingen Steder er bleven blottet ved Lilleaas Erosion i postglacial Tid, hvilket f. Eks. ved Hadsten giver en Minimumsmægtighed af 10 M.

Man maa altsaa tænke sig, at Dalen allerede eksisterede før det her omhandlede Tidspunkt, og at Smeltevandets Virksomhed ikke har været en Nedgraving eller Uddybing af Dalen, men tvært imod en Paafylldning og Aflejring af Materiale i Dalbunden. Har der fundet nogen Erosion Sted, saa har den virket ud til Siden og gjort Dalen bredere. Den ret hyppige Forekomst af norske Blokke i Dalaflejringen noget nordpaa, i Forbindelse med de ofte stejle Dalskraaninger, kunde virkelig tyde paa, at en saadan Erosion har fundet Sted, idet de norske Blokke optræder temmelig almindeligt i Dalsidernes ældre Dannelser, medens man i Randmorænen ved Søften og i Dalen umiddelbart Nord derfor har udpræget baltisk Materiale.

Smeltevandssøen ved Lerbjerg. Syd for Lerbjerg mandede den ovenfor skildrede Smeltevandets flod ud i den store Lavning, igennem hvilken den nuværende Lilleaa har fundet en kortere Vej til det nederste Stykke af Dalen. I denne Lavning har der sikkert paa det her omhandlede Tidspunkt staaet en ret betydelig Sø, men Detailundersøgel-

ser vedrørende dennes Aflejninger mangler foreløbig og vil ogsaa være vanskelige at udføre, da den største Del af det tidligere Sømmraade nu er dækket af Tørv. Vandstandens Højde lader sig paa Grundlag af Terrassehøjden i de tilstødende Dele af Lilleaa Dalen angive til ca. 55 Fod (17 M.) over den nuværende Havoverflade.

Ved Søens sydøstlige Hjørne adskilles den ved en kun ganske lav og smal Landstrimmel fra det Stykke af den ovenfor beskrevne Del af Lilleaa Dalen, som ligger umiddelbart nedenfor Hadsten. Dal-sandet strækker sig herfra op ad Sydsiden af denne adskillende Barriere, medens man paa den modsatte Side træffer Moræneler. Dette kan f. Eks. ses i en Grav ved den Vej, der gaar fra Balle nord-paa, og det er ogsaa iagttaget i en Grav ind i Vestskraaningen af den Rende, hvorigennem Lilleaa nu løber. Den lille Morænelers-barriere, som altsaa her har hindret Smeltevandsfloden i at løbe ad den direkte Vej til det nederste Stykke af Dalen, er forbavsende uanselig, og dens Kam ligger kun paa en Højde af ca. 70 Fod (22 M.) — altsaa ikke nævneværdigt højere end Dalterrassen. Man maa dog betænke, at Dalbunden her efterhaanden højnedes ved Aflejring af Sand og Grus, saa at det er sandsynligt, at der i det meste af Dalens Dannelses-tid har været en større Højdeforskel imellem Morænelers-barrieren og Dalbunden paa dette Sted. Dertil kommer, at Dal-siden netop her er meget konkav og derfor maa have været udsat for en stærk Erosion af Smeltevandsfloden. Man kan saaledes se, at Udviklingen gik i Retning af at ophæve Spærringen paa dette Punkt, og selv om man intet sikkert kan sige, maa det dog fremhæves som en Mulighed, at Smeltevandsfloden henimod Slutningen af Dalens Udviklingsperiode er løbet over her og, ligesom Lilleaa nu, er naaet direkte ud i Lavningen. En saadan Antagelse kunde maaske forklare, at den nuværende Lilleaa allerede paa et tidligt Tidspunkt er begyndt at løbe denne Vej, og at dette er Tilfældet, fremgaar af den kun meget ringe postglaciale Erosion, som har fundet Sted i den store, sydgaaende Dalbue. At Smeltevandet paa den anden Side ikke kan have løbet over den nævnte Barriere ret længe, fremgaar af, at Aflejringen af Materiale i Sølavningen har været yderst ringe, samt endnu tydeligere af, at Morænelersbarrieren endnu eksisterer.

Som allerede ovenfor nævnt munder den øvre Del af Lilleaa Dalen ud i det vestlige Hjørne af Sølavningen. Smeltevandsfloden løb dog ikke ind igennem Søen, men bøjede straks imod Vest, saa at den paa en Maade kun kom til at tangere denne. Derfor blev Tilførslen af Materiale til de mere centrale Dele af Søen heller ikke derfra af nogen Betydning, og Udfyldningen af Lavningen skred kun langsomt frem. Det er endog muligt, at den postglaciale Tørvedannelse har bidraget mest til Højningen af Bunden, der dog endnu

ude i Midten af Lavningen kun ligger ubetydeligt mere end 30 Fod (9 M.) over Havet.

Lilleaa Dalens nederste Del. Fra Søen ved Lerbjerg fortsatte Smeltevandsfloden sit Løb ned igennem det Dalstykke, som fra Lerbjerg strækker sig i en imod Sydvest konveks Bue ud til Gudena Dalen Syd for Langaa. Dette Stykke af Lilleaa Dalen har et meget vekslende Udseende. Det kan saaledes nævnes, at Bredden paa den ikke fuldt 7 Km. lange Strækning varierer betydeligt; den er f. Eks. ved Essendrup $1\frac{1}{2}$ Km., medens den i Snævringen lige før Gudena Dalen gaar ned til 400 M.

I meget adskiller denne Del af Lilleaa Dalen sig fra den tidligere beskrevne Strækning. En væsentlig Forskel bestaar f. Eks. deri, at man her finder to forskellige Terrasser, nemlig foruden Fortsættelsen af Smeltevandsaflejringen i den øvre Del af Dalen tillige en ældre og højere Terrasse, som udmærker sig ved at bestaa af meget groft Materiale, medens den yngre er overvejende sandet. Der er altsaa her en vis Lighed med den tidlige omtalte Dal, der tjente som Afløb for Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg.

Gaar man fra Lerbjerg imod Vest, træffer man begge de nævnte Aflejringer repræsenterede paa det store Terrassestykke, som ligger midt i Dalen imellem Lerbjerg og Bistrup. I dettes østlige Ende er Højden størst og gaar op til noget over 60 Fod (19 M.); her bestaar Jordbunden af groft, rullet Grus. I et Par Grave Nord for Vejen og knap 1 Km. Vest for Svejstrup Bro kunde det ses, at Stenene i Gruset gennemgaaende var paa 5—10 Ctm., men at dette dog indeholdt mange Sten, der var betydeligt større, ligesom der ogsaa fandtes finere Materiale. I den vestligste af de to Grave var Gruset maaske ubetydeligt finere. For saa vidt Lagdelingen kunde ses, var den en temmelig grov diskordant Parallelstruktur, hvori Lagene gennemgaaende hældede imod VNV., altsaa nedad Dalen. Blokføringen var temmelig karakteristisk; foruden en Mængde Flint¹⁾ fandtes der temmelig rigeligt af norske Blokke og nogle Dala Bjergarter; udpræget baltisk Materiale var derimod sjældent. Følger man Vejen videre imod Vest, falder Terrainet noget, og man kommer ned paa et fladt Omraade, hvor Højden ikke naar op til 50 Fod (16 M.), og hvor Jordbunden bestaar af Sand, hvad ogsaa Navnet Svejstrup Hede

¹⁾ I Forbindelse hermed kan det nævnes, at der foroven i den nordlige Dalskraaning ca. 2 Km. Nordvest herfor i en Mergelgrav er jagttaget en overordentlig kalkrig Moræneaflejring. Den store Mængde fint fordelt Kalk gjorde Jordarten leret at føle paa, men foroven, hvor Kalken var udvasket, saa den nærmest ud som almindeligt Morænesand.

antyder. Dette Parti adskilles dog ikke ved nogen stejl Erosions-skraaning fra det højere liggende Grusparti, som tværtimod skraaner jævnt ned imod det. Den iøjnefaldende Forandring i Kornstørrelsen viser dog, at man her staar overfor en anden Dannelse, og den plane Overflade i Forbindelse med Højden angiver, at det er Fortsættelsen af den tidligere beskrevne Smeltevandsaflejring.

Forholdene paa det skildrede Terrassestykke er typiske for den nedre Del af Lilleaa Dalen. Overalt finder man større og mindre Partier af en højtliggende Terrasse opbygget af meget groft Materiale. Profiler heri er iagttagne paa flere Steder ned igennem Dalen, og Blokindholdet er stadig det samme. Saaledes saas i en Grav ved Jernbanen og 450 M. VNV. for Bistrup Bro 7 norske, 4 Dala og 3 baltiske Blokke. Et særlig smukt Grusprofil fandtes 250 M. VSV. for Lavrbjerg Station. Denne ældre Terrasse staar som Regel med jævne Skraaninger ned imod den lavere Terrasseflade, af hvilken der dog kun er faa Rester tilbage paa Grund af, at den forholdsvis betydelige postglaciale Erosion i Hovedsagen er gaaet ud over den. Den repræsenteres dels af lignende Sandflader som Svejstrup Hede — f. Eks. i Terrainet Vest for Bistrup — og dels af mindre „Erosionsflader“, hvor den ældre Terrasses grove, rullede Grus gaar i Dagen.

Faldet af den yngste Terrasse imellem Lerbjerg og Gudena Dalen er ialt ca. 35 Fod (11 M.) paa den omtrent 7 Km. lange Strækning, hvilket svarer til 1:650; det er altsaa kendeligt større end paa noget Sted i den øvre Del af Lilleaa Dalen. Paa Grund af Terrassens ovenfor omtalte, daarlige Bevaringstilstand lader det sig næppe gøre at angive mulige Variationer i Faldets Størrelse. Dog skal det nævnes, at den temmelig hurtige Aftagen af Højden for de sydøstligste og bedst bevarede Terrassestykkers Vedkommende synes at vise, at den oprindelige Dalbund har haft et konvekst Længdeprofil svarende til, at Floden her i Hovedsagen har virket eroderende. Man ser altsaa ogsaa i denne Retning en Forskel imellem de to forskellige Af-snit af Lilleaa Dalen.

Den skildrede Smeltevandsaflejring i Lilleaa Dalen har en Retning, der i det store og hele er i Sydøst—Nordvest, og herved afviger den kendeligt fra de nærmest sydligere Smeltevandsdannelser med deres øst-vestlige Forløb. Dette staar i Forbindelse med, at den nedre Del af Gudena Dalen, som det tidligere er skildret, løber i en stor Bue ind igennem Landet, og at Smeltevandsaflejringerne fra Isranden strækker sig radiært ud imod denne. Hvor stor en Rolle dette Forhold har spillet, turde bedst fremgaa af et Par Tal.

Afstanden imellem det Sted, hvor Afløbet fra Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg naaede ud til Gudenaa Dalen, og Lilleaa Dalens Munding er saaledes ca. 42 Km., medens det Stykke af Israndslinjen, som ligger imellem Mundelstrup — det nordøstligste Sted, hvorfra Smeltevandssøen fik Tilløb fra Isranden — og den øverste Ende af Lilleaa Dalens Smeltevandsaflejring, kun har en Længde af 6 Km., eller $\frac{1}{7}$ af den førstnævnte Strækning.

Efter at Israndslinjen har krydset Lilleaa Dalen, følger derimod en lang Strækning, hvor der ikke et eneste Sted findes Smeltevandsaflejringer udenfor Israndsdannelserne. Dette maa sikkert sættes i Forbindelse med, at Isranden her strakte sig hen over et højtliggende Terrain. Først naar man kommer ud i Grenaa Halvøen, træffer man igen betydelige Smeltevandsdannelser.

6. Sammenfattende Bemærkninger om den senglaciale Gudenaa og dens Tilløb.

Den ovenfor givne Skildring af Lilleaa Dalen danner Slutningen paa en Række Enkeltbeskrivelser af de Dannelser, som tilsammen udgør den senglaciale Gudenaa's Dalsystem. Da Beskrivelserne af de enkelte Dele heraf paa Grund af den valgte Stofordning findes temmelig spredte, og da tillige de mange meddelte Enkeltheder vanskeliggør Overblikket, kunde det maaske her være paa sin Plads at give en sammenfattende Oversigt over det hele Dalsystem, og med det samme kan der da blive Lejlighed til at fremdrage enkelte Forhold, som tidligere kun er blevne flygtigt berørte eller endog slet ikke omtalte.

Smeltevandsaflejringerne's Højdeforhold. Paa Tavle III er gengivet et Længdeprofil af den senglaciale Gudenaa og dens forskellige, fra Isranden kommende Tilløb. Det er konstrueret paa Grundlag af Maalebordsbladene's Højdeangivelser. Længderne, der er angivne i Kilometer, er maalte langs med Dalenes Midtlinjer, og Højderne, som er angivne i Fod over Havet, er afsatte som de forskellige Højder af Terrassefladerne ude midt i Dalene. For enkelte Punkters Vedkommende er Højdebestemmelserne ikke saa paalidelige som ønskeligt, men disse Steder er allerede fremhævede i de tidligere Detailbeskrivelser. Hvad endelig Maalestoksforholdene angaar, da har Aflejringerne's som Regel meget ringe Fald gjort det nødvendigt, at afsætte Højderne meget store i Forhold til Længderne. Det er valgt at overdrive Højderne 250 Gange, og herved er det opnaaet at faa Forskel-

lighederne i Hoveddalens Højdeforhold til at træde nogenlunde tydeligt frem. Paa den anden Side har denne stærke Overdrivelse af Højderne bevirket, at en Del af de mindre Tilløb fra Isranden paa Grund af deres forholdsvis store Fald er blevne repræsenterede ved meget stejle Linjer, hvilket naturligvis ikke er heldigt, da det baade giver et meget lidt anskueligt Billede og tillige formindsker de indbyrdes Forskelligheder.

En Betragtning af Profiltegningen viser først og fremmest, naar man tager Hensyn til den ovenfor angivne Overdrivelse af Højderne, det overordentlig ringe Fald af Hovedfloden. Paa den 120 Km. lange Strækning fra Engom til Langaa aftager Højden ialt kun med 200 Fod (63 M.), svarende til et Gennemsnitsfald af lidt over 1 : 2000. En Forestilling om, hvor lidt dette i Virkeligheden er, faar man maaske bedst, naar det siges, at hvis Højderne paa Tegningen var afsatte i samme Maalestok som Længderne, vilde Højdeforskellen imellem de to nævnte Punkter kun være bleven $\frac{1}{4}$ Mm. og hele Tegningens Højde ikke mere end $\frac{1}{3}$ Mm. Endvidere fremgaar det af Profilet, at alle Tilløbene fra Isranden har haft et større Fald end den Del af Hovedfloden, som de forenede sig med. Faldets Størrelse varierer dog for Tilløbenes Vedkommende betydeligt, og Variationen synes udelukkende at være betinget af de lokale Forhold.

Ser man dernæst paa Formen af selve Hovedflodens Længdeprofil, er det første, som falder i Øjnene, nogle Uregelmæssigheder i Dalens øverste Ende. Smeltevandsaflejringen kan her deles i flere Stykker, der adskilles ved den forskellige Størrelse af Faldet. Saaledes danner den første Strækning ovenfor Ullum et afsluttet Hele, hvor Vandstanden i Ullum Kær i Forbindelse med Højdeforholdene ved Randen af Bjerger Herred Isen har været bestemmende for Smeltevandsaflejringens Fald. Derefter følger Dalstykket mellem Aale og Vestbirk; det karakteriseres ved sit meget ringe Fald, og ikke blot dette Forhold, men ogsaa Faldets pludselige Tiltagen ved Vestbirk maa sættes i Forbindelse med, at Isen, som det tidligere er udførligt omtalt (S. 59 og 91), skød sig ud i Dalen paa dette Sted.

Ved Vestbirk begynder det næste Stykke af Dalen, der som nævnt adskiller sig fra det foregaaende ved et større Fald af Dalbunden, og fra nu af har man ned igennem hele den følgende og længste Del af Gudena Dalen en Smeltevandsaflejring, som, hvad Højdeforholdene angaar, danner et uafbrudt Hele med regelmæssigt Fald nordpaa. Ganske vist er Faldet heller ikke i denne Del af Dalen konstant, og det bliver endog ned imod Mundingen mindre end i noget af de ovenfor nævnte Dalstykker, men Variationen sker, som det vil være fremgaaet af de tidligere Beskrivelser, meget langsomt og med stor Regelmæssighed, idet Faldet er langsomt aftagende ned igennem

Dalen. Tillige maa bemærkes, at det til at begynde med aftager noget stærkere og efterhaanden langsommere og langsommere; herved bliver Dalens Længdeprofil en svagt nedadbuget Linje, hvis Krumning er noget stærkere i den øvre Ende og aftagende nedad, en Form, der ofte er beskrevet og betegnet som den normale for Floddale¹⁾.

Længdeprofiler af ganske lignende Form som den ovenfor skildrede finder man for en stor Del af Tilløbenes Vedkommende, kun er Kurverne her som Regel betydeligt stejlere og deres Krumning mere iøjnefaldende. Som et smukt Eksempel paa en Dal af denne Type kan nævnes den Smeltevandsdal, som gennemskærer Nim Højdepartiet og munder ud i Gudena Dalen omtrent midt imellem Aale og Vestbirk. Men en Betragtning af Profiltegningen vil vise, at man ogsaa finder Dale, hvis Længdeprofiler danner opadbuede Linjer, som det f. Eks. er Tilfældet i den øverste Del af Lilleaa Dalen. Denne Forskel er meget iøjnefaldende og maa, som det straks skal blive omtalt, have en ganske bestemt Aarsag.

I en interessant Afhandling, der i Hovedsagen handler om Dalprofiler²⁾, har L. E. Hicks bl. a. gjort opmærksom paa, at det almindelige, opad konkave Længdeprofil er karakteristisk for Dale, hvis Bund er Resultatet af en Erosion, medens i Modsætning hertil „Aflejringskurven“ danner en svagt konveks Linje³⁾. Iagttagelserne fra Gudenaas Dalsystem synes at staa i Overensstemmelse hermed. Som det allerede tidligere er paapeget, har man nemlig i den øvre Del af Lilleaa Dalen et ældre Dalstrøg, i hvilket Smeltevandets Virksomhed i Hovedsagen har været en Aflejring af Materiale. I Modsætning hertil maa Smeltevandsdalen Syd for Nim, der ovenfor fremdroges som Eksempel paa en Dal med udpræget konkavt Længdeprofil, netop antages at være opstaaet ved Erosion af Smeltevandet, og for den nedre Del af Gudena Dalens Vedkommende viser de spredte Rester af ældre og højere Terrasser, at der ogsaa her har fundet Erosion Sted. Med andre Ord: de konvekse Længdeprofiler betegner Steder, hvor Dalbunden er bleven højnet ved Aflejring af Gletscherfloderne, medens de konkave Længdeprofiler tyder paa en Uddybning ved Erosion.

Lilleaa Dalen er ikke det eneste Sted, hvor man finder et konvekst Længdeprofil. Som Eksempler paa det samme kan saaledes nævnes Terrasserne ved Skanderborg Sø med deres Fortsættelse vestpaa samt muligvis Smeltevandsaflejringen i Aarhus Dalen. Begge disse Steder,

¹⁾ Se f. Eks. PENCK, ALBRECHT. 1894. *Morphologie der Erdoberfläche*. Bd. I, S. 319—330.

²⁾ HICKS, LEWIS EZRA. 1893. *Some Elements of Land Sculpture*. Bulletin of the Geological Society of America. Vol. IV, S. 133—146.

³⁾ Anf. St. S. 142—143.

og navnlig i Aarhus Dalen, er de senere Forandringer dog saa store, at de tegnede Profillinjer ikke kan betragtes som absolut sikre. Endvidere finder man længst imod Syd tilsvarende Forhold. Baade Engom Dalen og begge de to større Vandløb, som kom fra Isranden Øst for Løsning Hedesletten, viser konvekse Profiler. Det er derimod iøjnefaldende, at navnlig den sydligste og største af de to smaa Aflejringskegler ved Østranden af Hedesletten bliver stejlere opad, et Forhold, som maa sættes i Forbindelse med en i Forhold til Vandløbenes Størrelse og Faldet udenfor Isranden abnorm stærk Tilførsel af Materiale til et enkelt Punkt. I det hele taget maa det siges, at man ofte umiddelbart udenfor Isranden finder Uregelmæssigheder; man ser f. Eks. flere Steder, at et ellers udpræget konkavt Dalprofil ind imod Isranden lokalt kan antage en konveks Form.

Naar der i det foregaaende stadig er skelnet skarpt imellem Dale med konkavt og konvekst Længdeprofil, svarende til henholdsvis Erosion og Aflejring, maa man dog erindre, at en Flod normalt baade eroderer og aflejrer samtidig og paa samme Sted i Dalen; med de benyttede Udtryk menes derfor kun, at den ene eller den anden af de to Faktorer har været den overvejende. Det skal tillige fremhæves, at der godt paa nogle Steder til at begynde med kan være sket en betydelig Erosion, som kun er vedblevet, indtil Dalen var gravet ned til et til Afløbet svarende Niveau, eller omvendt, at der i Begyndelsen af Dalens Udviklingsperiode er sket en Udfyldning af de laveste Partier, indtil Dalbunden havde faaet et ensartet Fald.

Som et Eksempel paa det førstnævnte af disse Tilfælde kan nævnes den Dal, der tjente som Afløb for Smeltevandssøen i Lygumgaard Aa's Dalstrøg. Dens ældre og højere Terrasse angiver, at den yngre Dalbund er gravet indtil 40 Fod (13 M.) dybere ned, men paa den anden Side tyder dens retlinjede Længdeprofil paa, at der i Slutningen af dens Dannelsesetid har været Ligevægt imellem Tilførsel og Bortskaffelse af Materiale. En Modsætning hertil danner det Stykke af Gudena Dalen, som strækker sig fra Vestbirk imod NNV. Der er sikkert her til at begynde med sket en betydelig Aflejring af Materiale i det gamle og dybe Dalstrøg, indtil Bunden efterhaanden højnedes og kom i Niveau med den nedre Gudena Dal. Den videre Udvikling førte derefter med sig, at Dalbunden paa hele Strækningen nedenfor Vestbirk antog den samme Form, saa at Dalprofilet kom til at danne en ubrudt Kurve. Det er ovenfor nævnt, at denne er konkav og saaledes staar i Overensstemmelse med de ældre Terrassers Vidnesbyrd om en ret betydelig Erosion i Dalbunden. Det skal dog fremhæves, at Krumningen i Gudena Dalens Længdeprofil kun er meget svag, saa at dette i Form nærmer sig til den rette Linje, hvilket i Forbindelse med det ringe Fald tyder paa, at Ud-

dybningen var næsten ophørt, og at Dalens Udvikling saaledes var vidt fremskreden, inden Tilførslen af Smeltevand fra Isranden ophørte. Disse Forhold antyder derfor ogsaa, at den her omhandlede Periode i Dalens Historie spænder over et ikke helt ringe Tidsrum.

Vandstandens Højde i den tilstødende Del af Havet. Studiet af Højdeforholdene indenfor Gudena Dalens yngste Terrasse kan endnu give Anledning til en Række Betragtninger i en helt anden Retning. Medens Højden af Smeltevandsaflejringerne i Dalens øverste Ende nær ved Isranden i Hovedsagen er betinget af de lokale Højdeforhold, er Dalbundens Fald ned igennem Dalen og dens Højde ved Mundingen udelukkende bestemt ved Havets Niveau. Man faar herved Midler i Hænde til at bestemme Vandstandens Højde paa det Tidspunkt, da Indlandsisen endnu befandt sig i det sydøstlige Jylland, og Gudena Dalen blev gennemløbet af den skildrede Smeltevandsflod.

Det er tidligere vist, at Terrasseoverfladens Fald er langsomt aftagende ned igennem Gudena Dalen, og at dets Størrelse ved Langaa er ca. 1 : 2500. Regner man med, at Faldet yderligere er aftaget nedad til 1 : 3000 ved Dalens Munding, og beregnes Terrassehøjden paa det Sted, hvor Randers Fjords Dal træder ud af Højlandet (40 Km. nedenfor Lilleaa Dalens Munding, hvor Terrassefladen har en Højde af ca. 20 Fod (6 M.) over den nuværende Havoverflade), ser man, at Terrassen her skulde ligge ca. 45 Fod (14 M.) lavere end ved Lilleaa Dalen og altsaa paa ca. $\div 25$ Fod ($\div 8$ M.). Man skulde heraf kunne slutte, at Havets Niveau dengang laa ca. 8 M. lavere end nu, men det skal dog fremhæves, at der i den udførte Beregning er Fejlkilder, som kan have en ret betydelig Indflydelse paa Resultatet. Man bør derfor ikke tillægge selve det fundne Tal altfor stor Værdi, men i det kun se et Udtryk for, at Landet ved Mundingen af Randers Fjord paa det her betragtede Tidspunkt har ligget noget højere i Forhold til Havet end i Nutiden.

D. Udviklingen af de nuværende Vandløb.

I de store Træk var den i det foregaaende skildrede Egn af Jylland færdigdannet inden det Tidspunkt, da Randen af Indlandsisen laa ved den undersøgte Israndslinje, idet Højdedragene og de større Bakkepartier allerede eksisterede dengang, ligesom ogsaa de betydelige Dale og dybe Lavninger alle maa være ældre. Ingen Steder

finder man langs med Israndslinjen Morænedannelser, der er særligt fremtrædende i landskabelig Henseende, og i det hele taget har Aflejringen af Morænemateriale været ringe og som Regel kun forårsaget en lokal Ændring i Overfladeformen. Heller ikke de fra Isranden kommende Smeltevandsfloder har bevirket store Forandringer. Vel har de omformet og tildels udvidet de af dem benyttede Dalstrøg, men ingen Steder har de givet Anledning til Dannelsen af nye Dale. Ved en flygtig Betragtning kunde man maaske derfor fristes til at antage, at de Forandringer, som skyldes Israndens Ophold i den her betragtede Egn, kun har haft en ringe Betydning for dennes geografiske Udvikling. Dette gælder dog ikke, naar det drejer sig om Vandløbenes Udviklingshistorie. Et Blik paa Kortet vil vise, at de nuværende Vandløb for største Delen følger de samme Veje som i sin Tid Gletscherfloderne, og i den Henseende er der saaledes en paafaldende Lighed med det tidligere skildrede Terrain Vest for Horsens.

Ser man nærmere paa Enkelthederne i den her betragtede Egns Vandløbsforhold, falder den Ejendommelighed først i Øjnene, at Gudenaas stadig fortsætter sit Løb i nordlig Retning, og det til Trods for, at et stort, baade bredt og dybt, Dalstrøg fører direkte fra Silkeborg Egnen ud til Aarhus Bugt. Naar den sydfra kommende Gudenaas ikke følger denne den korteste Vej igennem Aarhus Dalen ud til Havet, er Grunden hertil, at Bunden i den nævnte Dal paa en kort Strækning hæver sig noget op over Silkeborg Søernes Niveau, ved at en Morænebarriere strækker sig tværs over Dalbunden, saa at Vandet nu løber herfra til begge Sider, og Dalen overskæres af et Vandskel. Det er tidligere vist, at denne Barriere tilhører det Strøg af stærkt stenede Morænedannelser, som her karakteriserer Israndszonen, og af Undersøgelsen er det tillige fremgaaet, at Aflejringen af Materiale nær ved Isranden netop paa dette Sted har været temmelig betydelig. Naar til Trods for dette sidste Forhold det nuværende Vandskels laveste Punkt i Aarhus Dalen kun ligger godt 110 Fod (35 M.) over Havet og altsaa ikke mere end ca. 45 Fod (14 M.) over Gudenaas Vandspejl i Himmelbjerg Egnen, og det tillige nævnes, at den spærrende Morænebarriere kun har en Bredde af ca. 1 Km., er det klart, at det udelukkende er Israndens Ophold i denne Egn, der er den direkte Aarsag til, at de indenfor liggende, mere centrale Dele af Jydland ikke nu afvandes ad denne Vej til Kattegat.

Paa en lignende Maade som Aarhus Dalen overskæres ogsaa Lilleaas Dalstrøg af et Vandskel paa det Sted, hvor Isranden tidligere befandt sig, og Grunden er her den samme, nemlig at der i Dalbunden i Nærheden af Isranden er sket en Aflejring af Materiale,

der her endog har været meget betydelig. Fra begge Sider stiger den nuværende Dalbund jævnt op imod Israndslinjen, idet Aflejringen saavel af fluvioglaciale Dannelser som af Morænemateriale har været desto større, jo nærmere man kommer Isranden. Fra det højeste Punkt af Dalbunden paa det Sted, hvor Isranden tidligere stod, følger Vandløbene nu det naturlige Fald til begge Sider. Østpaa løber den ubetydelige Egaa, hvis Hovedtilløb kommer fra den nordøstlige Ende af det lille Dalstrøg ved Mundelstrup, og nordpaa løber Lilleaa, der Syd for Langaa støder til Gudena.aa.

Dannelsen af Morænebarrieren i Aarhus Dalen har bevirket, at Gudena.aa maatte vedblive at løbe nordpaa igennem den gamle Smeltevandsdal, og svarende hertil har man et væsentligt Vandskel, som følger Jydlands Østkyst og danner Grænse imellem Tilløbene til Gudena.aa og Vandløbene direkte til Kattegat. Morænespærringen i Lilleaa Dalen har bevirket, at dette Vandskel noget nordpaa nærmer sig Kysten, saa at det fortsætter sig ud imod den sydlige Del af Grenaa Halvøen.

Sammenligner man Kortene Fig. 1 og 2 paa Tavle I, vil man se, at det ikke blot er paa de Steder, hvor det nævnte Vandskel passerer Dalene, at det følges med den undersøgte Israndslinje, men ogsaa paa store Strækninger hen over Højdepartierne er det samme Tilfældet. Man kan dog som Regel ikke her føre denne Overensstemmelse imellem de to Linjer tilbage til en forøget Aflejring i Israndszonen, saaledes som det er Tilfældet i de omtalte Dale, og som det ogsaa er Reglen i Horsens Egnen. Tvært imod har Aflejringen af Morænemateriale, som det tidligere er vist, kun været ringe paa de Steder, hvor Isens Rand har strakt sig hen over højtliggende Arealer. Grunden til, at de to Linjer paa saadanne Steder følges ad, turde snarere søges i, at de oprindelige Højdedrag ved deres Størrelse ikke blot nu betinger, at Vandskellet følger dem, men tillige i hin Tid har hæmmet Isens Bevægelse saa meget, at Isranden som Regel ikke er naaet ret langt ud over deres Kam. En saadan Forklaringsmaade maa man i Virkeligheden anvende paa Terrainet Vest for Kalvø Vig, og ganske lignende er ogsaa Forholdene i Egnen Syd for Aarhus Dalen. At man i den sydligste Del af dette Terrain, i Egnen Sydøst for Skanderborg Sø, har et Sted, hvor Israndslinjen er mere fremskudt end det nuværende Vandskel, taler endog for den anførte Tydning, da den nævnte Afvigelse netop findes paa et Sted, hvor det Højdedrag, som Vandskellet følger bagved Israndslinjen, ikke er særlig højt og derfor har tilladt en noget videre Fremflyden af den fra Odder Egnen kommende Isstrøm.

Medens saaledes det ensartede Forløb af Israndslinjen og det nuværende Vandskel i Dalstrøgene maa begrundes ved Israndszonens

betydelige Aflejninger, er Forholdet et andet, naar det gælder de sidst omtalte, højere liggende Strækninger, hvor Grunden til Overensstemmelsen snarere maa søges i den fælles Aarsag: de oprindelige Højdepartier. Men begge Faktorer har virket i den samme Retning, og Resultatet er blevet, at Israndslinjen og Vandskellet paa det nærmeste følges ad igennem hele denne Del af Jydland. Fra denne Regel er der dog et Par Undtagelser. Den ene af disse — nemlig i Terrainet Sydøst for Skanderborg Sø — er allerede berørt, men der findes en anden og væsentligere Afvigelse, som fortjener en lidt nærmere Omtale.

Umiddelbart Nord for Aarhus Dalen bøjer Vandskellet, der, kommende sydfra, har passeret Dalstrøget sammen med den ofte omtalte Morænebarriere, brat imod Vest og forlader foreløbig Israndsdannelserne. Med et stærkt bugtet Forløb strækker det sig i en stor Bue udenom hele det Terrain, hvor tidligere den store Smeltevandssø i Lygumgaard Aa's Dalstrøg fandtes, og først i Nærheden af Mundelstrup naar det tilbage til Israndslinjen. Denne Form af Vandskellet svarer til, at Smeltevandssøens Omraade nu ikke længere afvandes til Gudenaa Dalen, men har faaet Afløb til den østlige Ende af Aarhus Dalen og herigennem direkte til Kattegat. Allerede under Beskrivelsen af Smeltevandssøens Afvandingsforhold er det udførligt omtalt, at denne Forandring først er sket i postglacial Tid, idet man i den Del af Lygumgaard Aa's Dal, der som en smal Kløft forbinder de to store Dalstrøg, maa se Virkningen af en ganske ung Erosion.

Hvad iøvrigt den postglaciale Erosion i denne Egn af Jydland angaar, da kan det siges, at den, naar det ovenfor omtalte Tilfælde undtages, ikke har været af særlig Betydning. I hele det Terrain, som ligger Øst for den undersøgte Israndslinje, finder man Smaadale og Kløfter dannede af de talrige mindre Vandløb, som søger direkte ud til Kattegat. Kun et enkelt af disse er lidt betydeligere, nemlig den fra Egnen Syd for Aarhus Dalen kommende Aarhus Aa, som igennem en smal Erosionskløft løber nordpaa til det store Dalstrøg, hvor den umiddelbart Vest for Braband Sø optager Lygumgaard Aa for som et ret anseligt Vandløb at munde ud i Aarhus Bugt.

Heller ikke i det vestligere Terrain er der sket nævneværdige Forandringer i Løbet af den postglaciale Tid. De væsentligste af de nuværende Vandløb følger som nævnt de gamle Smeltevandsdale. Her har de i Reglen skaaret sig mindre Render ned i Smeltevandsaflejningerne, og dette, i Forbindelse med den fuldstændige Bortsmelten af de i Sandet begravede, døde Ismasser, har bevirket en Sønderdeling af de oprindelige Terrasseflader. Denne er paa nogle Steder endog ret fremskreden, medens man paa andre endnu finder

velbevarede og smukke Dalterrasser. Det skal sluttelig nævnes, at Vandløbene i Smeltevandsdalene naturligvis ogsaa besørger Afvandingen af det omgivende Terrain, og man ser derfor, at de fra Siderne modtager en Del Tilløb, som har givet Anledning til nogen Erosion ind i de tilstødende Højdepartier paa ganske lignende Maade som langs med Kattegats Kysten, kun at den naturligvis her kan være paabegyndt, allerede medens Isen endnu laa i det østligere Terrain.

IV. Indlandsisen i Grenaa Halvøen.

A. Almindelige Bemærkninger.

1. Højdeforholdene i Grenaa Halvøen.

Allerede et flygtigt Blik paa Kortet viser den store Forskel, der er paa Grenaa Halvøens nordlige og dens sydlige Del, en Forskel, som saa tydeligt giver sig til Kende ved Kystlinjens forskellige Form. Thi selv om den retlinjede og regelmæssige Kystlinje imod Nord og Øst for en Del skyldes den mere aabne Beliggenhed ud imod Havet, der betinger dettes stærkere Virksomhed i Retning af Nedbrydning og Aflejring, saa er dette Forhold dog ikke nok til at begrunde Kysterne saa forskellige Udseende. Dette er i væsentlig Grad betinget af den vekslende Overfladeform i Halvøens forskellige Dele. Den regelmæssige Kystlinje imod Nord og Øst svarer saaledes til, at Landet her har en plateauagtig og temmelig ensartet Karakter, medens Sydkystens dybe Indskæringer og hele urolige Forløb giver et godt Billede af det stærkt kuperede og ved store Højdedifferenser karakteriserede Sydland. Disse to saa væsentlig forskellige Omraader adskilles i Halvøens Midte af lavere liggende, flade og tildels med alluviale Dannelser dækkede Strækninger.

Plateauet i Grenaa Halvøens nordlige Del udgør omtrent Halvdelen af dennes samlede Areal; det danner et nogenlunde sammenhængende Hele, der navnlig imod Vest har Karakteren af et Plateau. Det gaar imod Nord og Øst næsten overalt helt ud til Havet, og imod Vest og Sydvest begrænses det af den store Dal, hvori Gl. Estrup og Skafø Gaard ligger, samt af de lave Sandflader, som slutter sig hertil i Egnen Syd for Ryom Gaard. Videre østpaa

danner den dybe Lavning Kolindsund Begrænsningen imod Syd. Højden af dette Terrain er ikke synderlig stor; i Reglen varierer den omkring 100 Fod (31 M.). Dog hæver der sig spredte og temmelig isolerede, smaa Bakkepartier op over det øvrige Terrain, og enkelte af disse Bakker naar op over 200 Fod (63 M.). Det højeste Punkt er det 236 Fod (74 M.) høje Høgebjerg, som ligger imod Nord noget indenfor Midten af Nordkysten. Ca. 6 Km. ØSØ. herfor ligger en i Nord—Syd langstrakt Bakkeryg, hvis højeste Punkt er 216 Fod (68 M.) over Havet, og længst imod Vest naar en Bakke ved Eldrup Gaard 225 Fod (71 M.).

Et lignende, men noget lavere Omraade findes i Egnen Sydvest for Grenaa. Imod Øst gaar det ud til Havet, og imod Nord danner Kolindsund Grænsen og adskiller det fra det nordlige Plateau. Det strækker sig saa langt vestpaa som til denne Lavnings Vestende, og imod Syd støder det op til en flad og gruset Strækning, som danner den direkte Fortsættelse af Sandfladen Syd for Ryom Gaard. Da Højdedifferenserne navnlig her paa Sydsiden kun er smaa, fremtræder dette Omraade med meget mindre Karakter af et Plateau, end det nordligere Terrain, men i meget minder det dog om dette. Højden er som nævnt ikke stor, og de højeste Punkter træffer man i langstrakte, flade Bakker med Retningen ØNØ.—VSV. Saaledes naar Ravnhøj paa en Ryg godt 6 Km. SSV. for Grenaa 167 Fod (52 M.), og Toppen af en lignende Bakke ved Landsbyen Attrup lige Syd for en mindre Smeltevandsdal, der gennemskærer Terrainet, ligger 166 Fod (52 M.) over Havet.

De nævnte, forholdsvis flade og ikke særligt høje Strækninger indtager den nordøstligste og største Del af Grenaa Halvøen. De grænser imod Syd til et lavere liggende Bælte, der med Hovedretningen Nordvest—Sydøst strækker sig igennem hele Halvøen, og som ved sin udprægede Karakter af en Smeltevandsdannelse adskiller sig tydeligt fra det øvrige Terrain. Dette Bælte bestaar af den nævnte store Dal forbi Gl. Estrup og Skafø Gaard, Sandfladerne Syd for Ryom Gaard samt Fortsættelsen heraf imod Sydøst og Øst, norden om Stubbe Sø. Medens de ovenfor omtalte, plateauagtige Partier i det hele og store er noget højere imod Vest end imod Øst, er det modsatte Tilfældet her. Højden er størst længst imod Øst, hvor den gaar op til ca. 120 Fod (38 M.), og derfra jævnt aftagende imod Nordvest. Dette Forhold bevirker, at Forskellen imellem de to Omraader fremtræder langt tydeligere i Halvøens nordvestlige Del end længst imod Øst. Iøvrigt bør det maaske allerede her bemærkes, at det omtalte, lavere Smeltevandsomraade ingenlunde fremtræder som en ubrudt Flade, men at det paa mange Steder omslutter senere opstaaede og nu tørvefyldte Lavninger, der

maaske ved første Øjekast besværliggør Overblikket, men som intet betyder med Hensyn til Opfattelsen af dette Parti som en Helhed.

Dette lavere Bælte af Smeltevandsaflejringer adskiller de middel-høje, jævne Partier imod Nordøst fra Sydlandets høje og storslaaede Bakkelandskab, der rummer for Naturskønhed saa berømte Steder som Kalvø Egnen, Mols Bjerge og Terrainet omkring Æbeltoft. Og ikke med Urette er disse Steder berømte. Thi kun faa Egne i Danmark byder en saa rig Afveksling mellem frodige Marker, yppige Bøgeskove og øde Lyngbakker, der i Forening med hele Terrainets Storslaaethed — de mægtige Bakkepartier, de imponerende Højder og de hyggelige Dale — giver dette Landskab en særlig Tilløkkelse. Det er ved første Øjekast, som om Naturen her havde udstrøet sine rige Gaver i broget Mangfoldighed for netop gennem Uregelmæssigheden og Planløsheden at give det i Retning af landskabelig Skønhed fuldendte. Men kommer man op paa en af de høje Bakketoppe med vid Udsigt over Omgivelserne, ser man, at der er en bestemt Plan i dette Utal af vilde og stejle Bakker, der ved den første Vandring imellem dem gjorde et saa broget og forvirret Indtryk. Man ser, at de store Bakkedrag ordner sig i Buer udenom Vigene og saa at sige omkranser dem, og man ser, hvorledes ogsaa de enkelte Bakker ofte kæder sig sammen i lange Rækker, der følger Kystens Bugter.

Størst og smukkest er Forholdene omkring Kalvø Vig. Fra den Del af det østjydske Højland, som ligger Vest for Vigen, udgaar der et mægtigt Bakkedrag, der i en stor Bue strækker sig langs med Kalvø Vigs Nordside. Det danner et næsten sammenhængende, langstrakt Højdeparti, indenfor hvilket Overfladen er uregelmæssigt kuperet. Med en Bredde af omkring 5 Km. følger det Kystens Krumning fra Vosnæs Gaard til Kalvø. Højden er betydelig, og større sammenhængende Strækninger ligger mere end 200 Fod (63 M.) over Havet. De højeste Punkter er den 339 Fod (106 M.) høje Bakke Trehøje imod Vest og Store Bavnehøj nær ved Kalvø, som naar 325 Fod (102 M.). Fra dette stortformede Højdedrags Østende udgaar der et noget lavere Bakkeparti, som strækker sig i en imod Øst konveks Bue udenom Egens Vig og forbinder Højlandet Nord for Vigen med den mægtige Bakkeknude, Agri Bakker, midt i Mols. Det danner ikke som det foregaaende et enkelt, stort Bakkedrag, men sammensættes for en Del og navnlig i de østlige Partier af mere isolerede, lange Bakkerækker. Højden er ikke saa stor; blandt de højeste Punkter er Vordeshøj ved Esig i Buens Nordende 202 Fod (63 M.) høj, og Krogryggen længere imod Syd naar 277 Fod (87 M.). I den sydlige Del bøjer denne Bue atter tilbage imod Øst, bliver noget højere og støtter sig til Nordsiden af Agri Bakker, den alt beherskende, høje Knude midt i Mols, i Sammenligning med hvilken

den imod Vest udgaaende Halvø samt Helgenæs imod Syd kun er smaa. Hele Midtpartiet af dette imponerende Højland ligger mere end 300 Fod (94 M.) over Havet, og den højeste Top, Agri Bavnehøj, naar den anselige Højde af 438 Fod (137 M.) og hævder sig derved som hele Grenaa Halvøens højeste Punkt.

Ligesom Kalvø Vig omkranses ogsaa Æbeltoft Vig af et bueformet Bakkeland. Dette naar ganske vist ikke nær de samme Højder som Terrainet ved Kalvø Vig, og selve Karakteren af Bakkedraget er ogsaa en noget anden. Det sammensættes nemlig af parallelle Kæder af langstrakte Bakker med mellemliggende, smalle Lavninger. De tager deres Begyndelse paa Østsiden af Mols Højlandet og strækker sig herfra i en Bue paa omkring 3 Km.'s Bredde norden om Vigen over til Æbeltoft Halvøen. Her støder de under spidse Vinkler sammen med lignende, bueformede, men noget mere spredte Bakkerækker, som findes i hele Terrainet ud imod Kattegat, og hvis Ydergrænse danner en ny Bue, der gaar over Østenden af Stubbe Sø imod Nordøst til henimod Rugaard. Som allerede nævnt er Højden ikke saa betydelig her i det østligere Terrain; blandt de mest fremtrædende Punkter kan nævnes den 267 Fod (84 M.) høje Tinghøj Nord for Æbeltoft Vig samt den 195 Fod (61 M.) høje Bakke Skjelhøje Øst for Æbeltoft og endelig i det nordøstlige Parti Grathjerg ved Hyldested, som naar 209 Fod (66 M.).

Disse store Bakkedrag, der paa en iøjnefaldende Maade følger Sydkystens Bugter, gaar som nævnt ind til det østjydske Højland i Terrainet Vest for Kalvø Vig. Længere nordpaa strækker dette Højland sig, om end med aftagende Højde, stadig ud imod Grenaa Halvøen. Længst imod Nord danner dog Dalen ved Gl. Estrup en naturlig Vestgrænse for Halvøen, og længere imod Syd finder man ogsaa paa en Strækning en saadan i den store, i NNW.—SSØ. langstrakte Lavning, hvori Rosenholm ligger. Imod Syd gaar denne Lavning helt ind til det Bakkedrag, som strækker sig norden om Kalvø Vig, og imod Nordøst adskilles den fra den store Skafo Gaard-Gl. Estrup Dal ved et noget højere Parti, som ogsaa strækker sig helt ned imod Højlandet Nord for Vigen. Dette Parti, der staar som et Slags Mellemled mellem det østjydske Højland og Plateauet i Grenaa Halvøens nordlige Del, er højest nordpaa, og det naar i Tothøj ved Bøjen 284 Fod (89 M.).

2. Oversigt over Israndsdannelser.

I de foregaaende Afsnit er der bleven gjort Rede for de Israndsdannelser, som strækker sig op igennem en Del af det østlige Jyd-

land. Man vil have bemærket, hvorledes den fundne Israndslinje nordpaa efterhaanden antager en mere og mere østlig Retning og bøjer ud imod Grenaa Halvøen. I Virkeligheden har Isranden fortsat sig østpaa igennem den sydlige Del af denne Halvø, og det er denne Omstændighed, der har bevirket Dannelsen af det ovenfor skildrede, saa ejendommelige og storslaaede Terrain omkring Kalvø Vig og Æbeltoft Vig. De beskrevne, buformede Højdedrag kan nemlig kun opfattes som mægtige Israndsdannelser, der er opstaaede ved Randen af to store Istunger, som strakte sig ind igennem Vigene. Og som en Del af en tredje Bue maa de østlige Bakker i Egnen Nordøst og Øst for Grenaa opfattes. Endelig skal det nævnes, at flere ejendommelige Forhold indenfor Smeltevandssaflejrings Omraade viser, at Isranden i det mindste til en Tid ogsaa har fulgt Halvøens Østkyst et Stykke imod Nord.

Moræner. I en stor Bue kan man følge de Randmoræner, som slutter sig til Kalvø Vigs Istunge. Ganske vist maa selve det mægtige Højdedrag, der strækker sig norden om Vigen, nærmest opfattes som et højt og stærkt kuperet Morænelandskab, dannet inde under Isens Randparti eller maaske delvis opstaaet af det Materiale, der smeltede frem og dækkede Isens Overflade i Randzonen. Men langs med Morænelandskabets Yderrand strækker der sig et System af udprægede Randmorænebakker, som tydeligt angiver Grænsen for Istungens Udbredelse. Disse Randmoræner tager deres Begyndelse ved Hestehave Nord for Løgten Station og strækker sig herfra som et Bælte af lange Grusbakker til Faarup. Fra dette Punkt lader de sig følge videre østpaa som mere spredte Bakker over Ørnerede Bakke og Asbøl Hoved forbi Rostved til Felballe. Fra Felballe sydpaa breder de sig og danner et pragtfuldt Randmoræneterrain, der længere imod Syd atter indsnævres for at samles til en enkelt Bakkerække, som bøjer tilbage imod Vest og støtter sig til Agri Højdepartiet. Endelig krones selve denne mægtige Bakkeknode af en lille Randmorænebue med Retning fra Nord til Syd.

Noget anderledes er Forholdene langs med Randen af Æbeltoft Vigs Istunge, idet hele det forholdsvis brede Bakkedrag, der omslutter Vigen, maa opfattes som den ene Række af Randmoræner bagved den anden, dannede under Isens gradvise, men langsomme Tilbagerykning.

I Æbeltoft Halvøen og i det nærmeste Terrain Nord for denne støder Æbeltoft Vig Buens Bakkerækker sammen med Randmoræner, dannede ved Randen af selve Kattegats Isen. I Karakteren ligner disse ganske de foregaaende; kun ligger de enkelte Bakkerækker

mere spredt og med større indbyrdes Afstand, et Forhold, som tyder paa en meget hurtigere Afsmeltning her imod Øst.

Svarende til, at Isen imod Øst har trukket sig hurtigere tilbage — et Forhold, som giver sig til Kende ved, at Randmorænerne spredt sig over et bredere og bredere Bælte, jo længere man kommer

Fig. 4. Oversigtskort over Israndslinjer i Grenaa Halvøen.
1 : 500000.

østpaa, — træffer man ogsaa i disse Egne en endnu mere fremskudt Israndslinje end den, der angives af de yderste Randmorænevolde. Den danner Sydgrænsen for en lille, langstrakt, i Øst—Vest gaende Hedeslette og løber i flade Buer, som svarer til de overfor nævnte Morænebuer. Længst imod Øst maa denne Isrand antages at have

bøjet imod Nord og, i hvert Fald til at begynde med, at have staaet lidt indenfor Halvøens Østkyst nordpaa til Gjerild Bugt.

Smeltevandsdannelser. Det er allerede tidligere antydet, at der tværs igennem Grenaa Halvøen strækker sig et forholdsvis lavt og fladt Bælte af Smeltevandsdannelser. Denne Grenaa Halvøens væsentligste Smeltevandsaflejring maa tænkes dannet af en stor Gletscherflod, som kom fra Halvøens østlige Egne og søgte sig Vej imod Vest og Nordvest ud imod Havet ved Randers Fjords Munding. Dette fremgaar ikke alene af, at Aflejringens Overflade hæver sig jævnt imod Øst, men tillige af, at Kornstørrelsen viser sig at tiltage stærkt, naar man følger Aflejringen opad i samme Retning, saa at man i Egnen omkring Hoed træffer endog usædvanlig groft, rullet Grus.

Lejringsforholdene indenfor dette Grusomraade viser, at Aflejringen falder i to forskellige Dele, idet særlige Forhold i Hoed Egnen har bevirket, at Smeltevandet først løb Syd om det plateauagtige Terrain Sydvest for Grenaa og senere nedgravede sig en Dal tværs igennem dette for igennem den at søge sig en lavere Vej vestpaa.

Allerede den Omstændighed, at en stor Gletscherflod, som forlod Isen i Hoed Egnen, er løbet vestpaa igennem hele Grenaa Halvøen, antyder, at den nærmest tilstødende Del af Kattegat maa have været spærret af Indlandsisen paa dette Tidspunkt, og i Virkeligheden maa man antage, at Isranden fra Egnen Sydvest for Hoed er bøjet nordpaa og i det mindste en Tid lang har fortsat sig over det nuværende Land saa langt imod Nord som til Gjerild Bugt. Dette sidste fremgaar ikke alene af, at ogsaa Vejen igennem Kolindsund maa have været isspærret, medens den ovenfor nævnte, store Smeltevandsflod løb imod Nordvest, men tillige af, at der findes endnu en Smeltevandsdannelse, som slutter sig til denne østlige Isrand. Man træffer nemlig i den Dal, som nu afvandes af Skærvad Aa og Veggerslev Aa, en tydelig Smeltevandsaflejring, der fra Kirial VNV. for Grenaa strækker sig op imod Gjerild Bugt.

Medens dette sidste Smeltevandsløb saaledes viser, at den Nord for Grenaa Halvøen liggende Del af Kattegat har været fri for et spærrende Indlandsisdække, har Isen længere imod Syd tvunget den omtalte store Smeltevandsflod til at løbe vestpaa over Land. Paa sin Vej igennem Grenaa Halvøen har denne Flod afsat Grus og Sand og paa sine Steder givet Anledning til ejendommelige Terrassedannelser. Først løb Vandet langs med den ovenfor antydede yderste Israndslinje Nord for Æbeltoft Vig og afsatte her den nævnte, lille Hedeslette. Videre fremad gik Vejen over det nu saa sønderdelte Terrasse-

landskab Syd for Ryom Gaard til den store Skafø Gaard-Gl. Estrup Dal og igennem denne ud til Havet.

Senere brød det fra Hoed Egnen kommende Smeltevand sig en ny Vej tværs igennem det højere Terrain Sydvest for Grenaa til Vestenden af Kolindsund. Herfra løb Floden dog endnu en Tid imod Vest til Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen og videre igennem denne; men efter nogen Tids Forløb maa Spærringen af Kolindsund være bleven hævet, og Vandet kunde da løbe denne Vej ud. Hovedtrækkene i denne Udvikling er antydede paa Kortskitserne paa Tavle V.

Svarende til det efterhaanden sænkede Afløb udviklede der sig i den oprindelig sammenhængende Sandflade Syd for Ryom Gaard et helt System af Smaadale, og det lokale Smeltevand fra den sydfor staaende Isrand bidrog nu i ikke ringe Grad til Sønderdelingen af den lidt ældre Aflejring, saa at man nu kun træffer spredte større og mindre Terrasserester i dette Terrain.

Endelig skal det nævnes, at der i den vestlige Del af Grenaa Halvøen paa det her betragtede Tidspunkt fandtes en ret betydelig Sø i Lavningen ved Rosenholm. Denne Sø modtog Tilløb af Smeltevand fra den sydfor staaende Isrand, og den afvandedes til den nuværende Alling Aa's Dal og igennem denne til Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen.

B. Morænedannelser.

1. Kalvø Vigs Istunge.

I meget minder Kalvø Vig og dens Omgivelser om Alperandens Søer med deres Kreds af høje Moræner og udenforliggende Grusflader, saaledes som disse kendes navnlig igennem PENCK's interessante Arbejder. Selve Kalvø Vig repræsenterer saaledes „Tungebækkenet“, og det bueformede Morænehøjdedrag samt de flade Smeltevandsdannelser findes ogsaa her. Men medens man i Alpeforlandet overalt er tilbøjelig til at betragte hele Morænebuen under ét, lader der sig i Egnen omkring Kalvø Vig gennemføre en skarp Adskillelse imellem et højt, stortformet og uregelmæssigt kuperet Morænelandskab, som væsentlig opbygges af Moræneler, og de egentlige, grusede og voldformede Randmoræner, der strækker sig i en stor Bue udenom dette, men som selv kun er forholdsvis smaa og kun indtager et smalt og som Regel noget lavere liggende Bælte. Der er herved en Analogi med Forholdene paa mange Steder i Nordtyskland, hvor en saadan Adskillelse imellem „Grundmoränenlandschaft“ og „End-

moräne“ er gennemført, og herhjemmefra kender man ogsaa det samme fra de af MILTHERS beskrevne Israndsfænomener i Odsherred, med hvilke Egnen omkring Kalvø Vig har den mest slaaende Lighed.

Naar der foreløbig stadig er talt om en enkelt Morænebue udenom Kalvø Vig, er dette dog ikke helt korrekt, thi slet saa regelmæssige er Forholdene ikke. Vel danner Randmorænerne i det hele og store en saadan Bue, men ved en nærmere Betragtning viser den sig naturligt at kunne deles i flere Stykker, der hver for sig danner en Morænebue. „Kalvø Vig Buen“ falder saaledes i tre mindre Buer. Den nordvestlige og største strækker sig parallelt med Kysten fra Vosnæs Gaard til lidt Øst for Kalvø og kan passende benævnes Vosnæs Gaard-Kalvø Buen. Selve Randmorænerne gaar fra Hestehave SSØ. for Hornslet til et Punkt lidt Syd for Rostved. Denne Bue vender nogenlunde imod Nord. Den næste, noget mindre Bue — Egens Buen — har et temmelig stærkt krummet Forløb udenom den Lavning, der indtages af Egens Vig og det lave Terrain lige Øst herfor; dette lavtliggende Parti viser sig saaledes at svare til PENCK's Begreb „Zweigbecken“ i Forhold til Kalvø Vig som „Stammbecken“. Egens Buen vender imod Øst. Endelig findes der en lille Randmorænebue, der gaar Øst om Agri, og som derfor passende kan benævnes Agri Buen. Ogsaa den vender imod Øst.

Morænelandskabet. Før Beskrivelsen af selve Randmorænerne skal der gives nogle Oplysninger om Morænelandskabet, der slutter sig til disse. For Morænelandskabets Vedkommende er der en nogenlunde jævn Overgang imellem de nævnte tre Morænebuer, uden at det dog kan siges, at det høje, bakkede Morænelersterterrain følger Kysten i en regelmæssig Bue af samme Bredde og Højde overalt; det sammensættes tvært imod af forskellige Partier. I Vosnæs Gaard-Kalvø Buen bestaar Morænelandskabet saaledes af det tidligere omtalte, mægtige Højdedrag, og her naar denne Landskabform sin smukkeste Udvikling, ligesom den ogsaa her gaar op til de største Højder. Men heller ikke dette Højdedrag er fuldt sammenhængende; ved en lille Dal adskilles det i to Dele. Et stort Parti strækker sig fra Hestehave SSØ. for Hornslet, hvor det gaar omtrent jævnt over i det høje Terrain ved Vorre, imod ØNØ. til henimod Syd for Thorsager. Dette Parti er bredest og højest omtrent paa Midten, Syd for Ommestrup, hvor dets højeste Punkt — Trehøje, 339 Fod (106 M.) — findes. Det skilles ved den nævnte Dal, der gennemløbes af Knubbø Bæk (til Følle Vig) og Dibbelbæk (til Korup Aa), fra Kalvø Højdepartiet, der med Store Bavnehøj ved Rønde naar 325 Fod (102 M.).

I Tilslutning til det sidstnævnte, nogenlunde afrundede Parti

følger et noget lavere Morænelandskab, der hører til Egens Buen. Dette strækker sig videre østpaa og sydpaa i en saa godt som uafbrudt Morænelersbue udenom Egens Vig og det lave Terrain lige Øst for Vigen. Det højeste Punkt i den nordlige Del af denne Bue er den 202 Fod (63 M.) høje Vordenshøj, der ligger Øst for Esig. Den sydlige Ende af Buen strækker sig hen imod Nordøsthjørnet af det mægtige Højdeparti midt i Mols, Agri Bakker, og Højden tiltager noget imod Syd, saa at den i Krogyggen Øst for Grønfeld gaar op til 277 Fod (87 M.). Herefter ophører Morænelandskabet som selvstændigt Højdedrag, saa at det i den sydlige, i Øst—Vest gaaende Del af Egensbuen kun danner Nordskraaningen af Agri Bakker.

Heller ikke i Agri Buen findes der noget som selvstændigt Højdedrag udviklet Morænelandskab, og kun paa den vestlige Side af Mols Højlandet findes Moræneler ned ad Skraaningen imod Kalvø Vig, medens selve Toppen af Knuden omkring Agri dannes af Randmorænerne.

Hele det her beskrevne Terrain er et typisk Morænelandskab med stærkt kuperet og uregelmæssigt formet Overflade, hvor større og mindre Bakker veksler med dybe Mosehuller og flade Lavninger. Overfladeformen i det fremgaar af Tavle XV, Fig. 1, som er taget fra et Punkt ca. 1300 M. ØNØ. for Kalvø imod Øst. Jordbunden bestaar overvejende af Moræneler, dog ikke saaledes, at Moræneleret danner et regelmæssigt Dække. De fleste Steder gør Jorden endog Indtryk af at veksle en Del, saa at der ofte findes fluvioglaciält Sand og Grus, og paa flere Punkter er der tillige iagttaget stenfrit Diluvialler. Dette sidste er saaledes truffet i Gravene til to Teglværker ved Hovedlandevejen straks Øst for Ommestrup, paa Skraaningen Syd for Thorsager samt i en Grav straks Øst for Korup. Ogsaa „Plastisk Ler“ er iagttaget; det findes paa Skraaningen ned imod Knubbros Bæk straks Nordvest for Rønde. I en lille Vejgennemskæring ved Hovedlandevejen er det ligefrem udskridende og volder her Vejvæsenet en Del Besvær. Dets Farve er graabrun.

Medens de egentlige Randmoræner maa tænkes opstaaede langs med selve Isranden og i det hele *udenfor* Isens Omraade, tildels direkte aflejrede ved Afsmeltning af den moræneførende Is og af det lokale Smeltevand og tildels sammenskubbede ved smaa Fremstød af Isen, maa man tænke sig Morænelandskabet dannet *indenfor* det Terrain, der til Stadighed var isdækket. Den forholdsvis store Mægtighed af Isen i Kalvø Vig har betinget en rigelig Tilførsel af Is og dermed af Morænemateriale ud imod Randzonen paa dette Sted. Men ikke alt Materialet naaede helt ud til Isranden. En Del maa ved Afsmeltning nedenfra have samlet sig under Isen og i dennes nederste Partier; men medens den stærkere Bevægelse i de mere cen-

trale Dele af Istungen har bevirket, at denne endnu kunde medføre Morænematerialet, ja maaske endog har kunnet erodere i Tungebækkenet, er der sket en Aflejring ud imod Randen, hvor Bevægelsen efterhaanden aftog. En anden Del af Morænematerialet har muligvis ved Afsmeltningen oppefra samlet sig paa Isens Overflade og fortrinsvis i Randzonen, hvor Isens dybere liggende og paa Morænemateriale rigere Lag kom frem til Overfladen. Ved den endelige Afsmeltning efterlod Isen saa foruden de egentlige Randmoræner et mægtigt og paa Grund af Dannelsesmaaden uregelmæssigt kuperet samt fortrinsvis af Moræneler bestaaende Morænelandskab i et Bælte bagved Randmorænerne.

Selv om en saadan Forklaring vel nok for en Del kunde begrunde Dannelsen af et mægtigt Morænelandskab, er det dog tvivlsomt, om de nævnte Faktorer vilde have formaaet at skabe et saadant Højdedrag som det, der nu strækker sig norden om Kalvø Vig, hvis ikke Isen ved sin Fremrykning her havde forefundet allerede eksisterende Højdepartier, som den kunde bygge videre paa og omforme. Og i Virkeligheden synes Fordelingen i de store Træk af de høje Omraader at vise, at der her har eksisteret større Bakkepartier, idet man kan skimte disses Omrids igennem de nuværende Terrainformer, selv om det er med langt mindre Tydelighed og Sikkerhed end i det i de foregaaende Afsnit skildrede Terrain.

Der er ved en tidligere Lejlighed gjort opmærksom paa, at Terrainet imellem Lilleaa og Grenaa Halvøen i store Træk former sig som langstrakte, flade Bakkedrag med en Retning i NV. t. V.—SØ. t. Ø., og flere Ting tyder paa, at dette Omraade oprindelig har strakt sig videre imod Øst til den her omhandlede Egn. Der synes saaledes at have eksisteret en Bakkeryg, som gik med den nævnte Retning fra Terrainet Nordøst for Rosenholm Lavningen over Østenden af Trehøje Partiet, Kalvø Højdepartiet, den sydøstlige, høje Del af Egens Buen og det højeste Moræneomraade Nord for Æbeltoft Vig. Og den samme Retning faar man frem, hvis man trækker en Linje fra Terrainet Syd for Hadsten Station over Højdepartiet ved Trige og Bakkeknuden paa Sydsiden af Tved Halvøen til Helgenæs. Endelig skal der gøres opmærksom paa, at Agri Bakker og den højeste Del af Æbeltoft Halvøen ligger i den samme Retning i Forhold til hinanden, samt at Elbjerg Partiet sydligere i Mols ligger i Forlængelse af Bakkeryggen over Vorre Vest for Kalvø Vig, men begge disse to sidste Forhold turde dog maaske ogsaa bero paa Tilfældigheder.

Vosnæs Gaard-Kalvø Buens Randmoræner. Paa Ydersiden af Morænelandskabet træffer man de lange, grusede Randmorænebakker.

I Vosnæsgaard-Kalvø Buen findes saaledes udenom Trehøje Højdepartiet meget smukke Randmoræner, der kan følges uafbrudt fra Hestehave til Faarup. De bestaar af flere Rækker parallele, ofte store Volde med temmelig stejlt Affald til begge Sider og med langstrakte Lavninger imellem. De ligger paa hele Strækningen lavere end det bagved liggende Morænelandskab og højere end Terrainet udenfor. Højden er meget varierende. Nogle af de højeste Punkter (fra Sydvest til Nordøst) er Kaninbakke (i Hestehave) 216 Fod (68 M.), Bihøj 212 Fod (67 M.), Rævebakke 215 Fod (67 M.), Assenbakke 213 Fod (67 M.), Thorsager Høj 191 Fod (60 M.), Kaldal Høj 199 Fod (62 M.), Tidselhøj 195 Fod (61 M.), Melkjær Høj 202 Fod (63 M.) og en navnløs Bakke Sydvest for Faarup 220 Fod (69 M.). Højden af Terrainet udenfor Randmorænerne er meget forskellig paa de forskellige Steder. Ved Hestehave længst imod Sydvest er den størst, nemlig ca. 150 Fod (47 M.); derfra falder den ned imod Mørke Kær, hvor Tørven udenfor Randmorænerne ligger paa ca. 60 Fod (19 M.). Syd for Mørke Station gaar Moræneleret udenfor den yderste Randmoræne op til omtrent 120 Fod (38 M.); herfra falder Terrainet videre østpaa ned imod Mosen Nord for Melkjær Høj, hvor Tørven ikke gaar højere op end til ca. 40 Fod (13 M.).

De enkelte Randmorænevolde er ofte meget lange, og de kæder sig sammen til lange Bakkerækker. Dog er det ikke altid let at følge en enkelt Bakkerække, idet den undertiden grener sig og undertiden stopper for at fortsættes ved Siden af, saaledes som det ofte er Tilfældet med Aase. Højden er i Reglen ret betydelig; dog overstiger Højdeforskellen imellem Randmorænerne og de mellemliggende Lavninger sjældent 100 Fod (31 M.).

Et Par af de gengivne Fotografier viser Udseendet af Randmorænerne. Paa Tavle XV, Fig. 2 ser man de lange Volde ØSØ. for Hornslet fra en lille Sandslette, der her ligger foran Morænerne, og som senere skal blive omtalt. Billedet er taget fra den nye Vej mellem Hornslet og Skovgaard omtrent midt imellem disse to Punkter. — Fig. 1 paa Tavle XVI viser Udseendet af nogle af de store Randmorænebakker Vest for Faarup. Paa Billedet, der er taget fra den første Bakke Syd for Vishjerg imod Sydvest, ser man desuden i Baggrunden det høje Morænelandskab Syd for Ommestrup.

Materialet i Randmorænerne er for største Parten fluvioglacialt Sand og Grus. Hist og her findes noget Moræneler, hvorimod egentlig Morænegrus ikke er iagttaget noget Sted. Det synes, som om Moræneleret, hvor det forekommer, kun danner en Kappe over en fluvioglacial Kærne, idet der paa Toppen af de lerede Bakker ofte stikker Sand og Grus frem. I en Grav i Holstens Bjerg ØSØ. for Falkjær Gaarde saas Moræneler over temmelig groft, rullet Grus. I

Visbjerg lidt Øst herfor var der en stor Grav paa Nordsiden. Her saas rullet Grus, hvis Lagdeling var parallel med Bakkens Yderside. Desværre er Profilerne i Bakkerne kun faa.

Det her beskrevne Randmorænestrøg strækker sig i en Længde af omtrent 9 Km. fra Hestehave i en flad, regelmæssig Bue over Mørke By til Faarup; kun VSV. for Mørke By har Isranden buet lidt stærkere fremad ud i Lavningen imod Mørke Kær.

Ved Faarup standser Randmorænerne, og kun nogle ganske smaa Erosionsrender giver den lerede Skraaning Nordøst for Faarup lidt af Randmorænernes Udseende. Derefter træffes de igen i Sandbakkerne omkring den 213 Fod (67 M.) høje Ørnerede Bakke, godt 2 Km. ØSØ. for Faarup. I dette lille Parti er Bakkerne ikke saa langstrakte, men de har dog en Del af Randmorænekarakteren og skiller sig ved deres Ufrugtbarhed stærkt ud fra det bagved (Sydvest for dem) liggende, frodige Morænelandskab. De synes at ligge noget længere tilbage end de yderste af de ovenfor omtalte Randmoræner, og det er sandsynligt, at de er lidt yngre end disse og maaske nærmest samtidige med de bageste Volde Vest for Faarup. I det hele taget er der en Del Forhold, som viser, at Isranden paa hele Strækningen Øst herfor i nogen Tid har staaet lidt længere fremme end ved den Stilling, der angives af de tydelige, i det følgende beskrevne Randmorænevolde, men Omtalen heraf maa opsættes til et senere Afsnit.

I Tilslutning til Kalvø Højdepartiet findes ogsaa nogle randmoræneagtige Sandbakker. I umiddelbar Forlængelse af Ørnerede Bakkepartiet og kun adskilt derfra ved Dalen, der gennemløbes af Dibbelbæk, ligger den 154 Fod (48 M.) høje, lyngklædte Bakke Asbøl Hoved, en fladere Bakke ØSØ. for denne og derefter en lang, smal og lidt indad buet Vold, alle bestaaende af Sand og rullet Grus. Maaske bør nogle af Bakkerne bagved den sidstnævnte (ØSØ. og Sydøst for Kobberhøj Gaard) ogsaa henregnes til Randmorænerne. Som en Slags randmoræneagtig Dannelse maa man i alle Tilfælde opfatte nogle ejendommelige, afrundede Sandbakker, der ligger ordnede lidt vifteformet omtrent i Retningen Syd—Nord paa begge Sider af Vejen fra Rostved sydpaa, idet denne Vej er ført igennem en lille Erosionskløft imellem Bakkerne. Den sydligste og højeste af dem er Gejlbjerg, der naar 185 Fod (58 M.); nordligere ligger Askdal Høj paa 161 Fod (51 M.) og Hovgaard Hoved paa 156 Fod (49 M.). Det Areal, der indtages af disse Bakker, gaar kileformet ind i Morænelandskabet, og det ligger nær at sætte Dannelsen af dem i Forbindelse med den Omstændighed, at to Israndsbuer her stødte sammen, idet man netop er ved det Punkt, hvor Vosnæs Gaard-Kalvø Buen holder op og Egens Buen tager sin Begyndelse. At disse Bakker ikke hører til Moræneland-

skabet fremgaar tydeligt af deres i Terrainet stærkt fremtrædende Form og af deres iøjnefaldende Ufrugtbarhed. I det hele minder disse Bakker (som forøvrigt flere af de omtalte Randmoræner) noget om Aaskuller, og den Mulighed er vel heller ikke udelukket, at man her staar overfor en aasagtig Dannelse. I saa Fald skulde man dog vel vente at finde en Fortsættelse af dem sydpaa, men en saadan findes ikke.

Egens Buens Randmoræner. Med Randmorænerne Syd for Rostved er man naaet til Begyndelsen af Morænebuen udenom Egens Vig. De hertil hørende Randmoræner begynder som nogle langstrakte Sand- og Grusvolde Sydøst for Rostved. De hører dog snart op, og paa den nærmest følgende Strækning, mellem Korup og Tostrup, findes ikke nogen tydelig Randmoræne; kun nogle Smaatoppe som Kistehøj og et Par andre straks Syd og Sydøst for Korup Sø har et lidt randmoræneagtigt Præg.

En udpræget Randmoræne træffer man først i den 127 Fod (40 M.) høje Bakke Gedbjerg straks Øst for Tostrup. Og gaar man herfra sydpaa, kommer man ind i et pragtfuldt Randmorænelandskab, bestaaende af lange, delvis lyngklædte Sand- og Grusbakker med mellemliggende, smalle Mosedrag. Dette Terrain breder sig hurtigt og naar en Bredde af ca. 2 Km. for derefter atter at blive smallere, saa at det Areal, der her indtages af Randmorænerne, nærmest har Halvmaaneform, idet den vestlige Grænse for dem forløber næsten retlinjet fra Tostrup til Østsiden af Krogyggen, medens Østgrænsen danner en Bue, idet den gaar østpaa til Sydvestenden af Langsø og herfra tilbage til Sydenden af Krogyggen. Fra dette Punkt løber Randmorænen som en enkelt Bakkekæde vestpaa over en navnløs, 306 Fod (96 M.) høj Bakke Øst for Tykjær Gaard og videre over Rishøj og de 319 Fod (100 M.) høje Julings Høje ind og støtter sig Syd for Vraa til Nordvesthjørnet af Agri Bakker.

Det nævnte halvmaaneformede Omraade er et udpræget Randmorænelandskab. Man har her ikke blot de lange Grusvolde, men man træffer i Lavningerne imellem dem en Del temmelig dybe og nogenlunde afrundede, kedelformede, afløbsløse Indsænkninger i Terrainet. De ligger ofte, ligesom selve Bakkerne, ordnede i Rækker parallelle med Isranden og er meget karakteristiske for hele Randmoræneterrainet i Mols og længere østpaa.

Agri Buens Randmoræner. Endelig hører der til Kalvø Vig Buen endnu den lille Agri Bue. Den er i Sammenligning med de andre kun ubetydelig, baade hvad Længde og Bredde angaar, men til Gen-

gæld er de enkelte Bakker saa meget mere anselige, og den udgør den højest liggende Del af alle Randmorænerne her omkring. Ikke faa af Bakketoppene naar op over 400 Fod (126 M.), og her findes Grenaa Halvøens højeste Punkt, den 438 Fod (137 M.) høje Agri Bavnehøj.

Ydersiden af denne Randmorænebue er meget iøjnefaldende i Terrainet, idet den hele Vejen falder brat ned imod et fladere Parti, der ligger henved 150 Fod (47 M.) lavere, udenfor den. Den fremtræder i den nordlige Del som en temmelig regelmæssig Skraaning, medens den længere sydpaa opløser sig i mere isolerede Bakker. Udseendet fremgaar af de to Fotografier, som er gengivne paa Tavle XVII. Begge disse Billeder er tagne fra Bakker i den nedenfor omtalte Æbeltoft Vig Bue, Fig. 1 fra Vejen, der gaar fra Strandkjær til Agri, ca. $1\frac{1}{2}$ Km. ØSØ. for den sidstnævnte By, og Fig. 2, som viser en lidt sydligere Del af Agri Buen, fra den yderste Bakke i Æbeltoft Vig Buen ca. 700 M. Vest for Toggerbo.

Agri Buens Randmoræner bestaar ligesom de tidligere omtalte af Sand og Grus; nogle Steder er der dog tillige iagttaget en Mængde store Sten paa Overfladen. En saadan særlig smuk stenet Overflade findes paa en navnløs Bakke omtrent 400 M. Syd for Loddenbjerg.

2. Æbeltoft Vigs Istunge.

Ligesom Kalvø Vig omgives ogsaa Æbeltoft Vig af et Bakkedrag, der danner en Bue udenom Vigen. I Modsætning til Terrainet omkring Kalvø Vig bestaar her det bueformede Højdedrag udelukkende af Sand- og Grusbakker, der alle maa opfattes som Randmoræner, idet Morænelandskabet mangler. Højden er størst imod Vest i Mols Bjerger og aftager nogenlunde jævnt østpaa, saaledes at Bakkerne Vest for Draaby kun naar en Højde af henved 100 Fod (31 M.). Herfra tiltager Højden igen noget, naar man gaar sydpaa, saaledes at en Del af Bakkerne i Æbeltoft Halvøen naar over 150 Fod (47 M.), en enkelt endog omtrent 200 Fod (63 M.).

Denne Bues Randmorænebakker ligner meget de ovenfor beskrevne, og de kæder sig ligesom disse sammen i lange, noget uregelmæssigt forløbende Rækker. Imellem Bakkerne findes overalt mere eller mindre lukkede Lavninger og kedelformede Huller, der i den nordøstlige og lavere Del i Reglen er tørvefyldte og derfor flade i Bunden. Jordbunden bestaar udelukkende af lagdelte Dannelser, mest Sand, men ogsaa en Del Grus.

Denne Randmorænebue udmærker sig fremfor de tidligere omtalte Randmoræner ved sin forholdsvis store Bredde, paa sine Steder

indtil 3 Km. Forholdene tyder paa, at Isranden her har trukket sig noget hurtigere tilbage og afsat den ene Række Randmorænevolde bagved den anden, hvorved det brede Randmorænelandskab er fremkommet.

Sammenstødet mellem Morænebuerne i Mols. De to Morænebuer, der strækker sig udenom Kalvø Vig og Æbeltoft Vig, støder sammen i Mols under ret ejendommelige Forhold.

Det høje Parti omkring Agri har sikkert allerede i Hovedsagen bestaaet, inden Randmorænerne her dannedes, og det maa være denne Knude, der har dannet en væsentlig Hindring for Isens Bevægelse og derved betinget Indbugtningen af Israndslinjen her. Den Del af Kalvø Vig Buen, som ovenfor er kaldet Egens Buen, støtter sig til Nordvesthjørnet af dette Højdeparti, medens Buen omkring Æbeltoft Vig støtter sig til Østsiden, eller maaske nærmere Sydøstsiden, idet disse Bakker kan følges helt ned til Sydenden af Mols.

Ser man nærmere paa de enkelte Bakkerækker i Æbeltoft Vig Buen, viser det sig, at de yderste er de korteste, og at den Længde, hvorover Bakkerækkerne kan følges, tiltager indad (sydpaa), idet Bakkerne fortsættes desto længere til Siden, jo længere man kommer tilbage. Medens saaledes de inderste Bakkerækker fortsætter sig langs med Østsiden af Mols langt sydpaa, er de yderste meget kortere, idet de afbrydes ved at støde sammen med Egens Buens Randmoræner. Man kan saaledes ikke følge Æbeltoft Vig Buens yderste Bakkerække, der gaar over det 159 Fod (50 M.) høje Stigsbjerg Sydvest for Ulstrup, længere vestpaa end til et Punkt ca. 1 Km. Øst for Grønfeld, hvor den støder til den yderste Randmorænerække i Egens Buen, og den næste Bakkekæde i Æbeltoft Vig Buen, lige bagved den ovenfor nævnte, gaar over den 295 Fod (93 M.) høje Bakke Raabjerg Sydøst for Grønfeld til et Punkt ca. 1200 M. SSØ. for denne By. Paa denne Maade støder de to Morænebuers Bakkerækker her sammen og gaar ofte næsten umærkeligt over i hinanden. De mødes under en meget spids Vinkel, og ofte ligger der inde i Vinklen en hel Række kedelformede Huller.

Det maa antages, at Isen, da disse yderste Bakkerækker dannedes, dækkede hele det høje Parti Sydvest herfor. Først efterhaanden trak Isen sig noget tilbage, baade i den østligste Del af Egens Buen og i Æbeltoft Vig Buen, saaledes at de to Buer ikke længer stødte sammen SSØ. for Grønfeld, men fortsatte sig videre *divergerende*, Egens Buen vestpaa til Syd for Vraa, og Æbeltoft Vig Buen imod Sydvest til Nord for Trehøje. Agri Buen dannede saa Forbindelsen imellem disse to.

I det trekantede Mellemrum imellem de tre Isrande har der rimeligvis til en Tid staaet en lille Sø, idet der intet Afløb var imod Nordøst. Jordoverfladen er her ganske vist overalt sandet, men en Del af dette Sand er sikkert blæst paa. Ca. 600 M. Sydvest for Basballe kan man i alle Tilfælde med Boret naa stenfrit Ler, der fuldstændigt ligner almindeligt senglacialt Ferskvandsler. Denne Sø blev staaende her, indtil Isranden havde trukket sig endnu et godt Stykke tilbage, saa at Vandet kunde bane sig Vej imellem Æbeltoft Vig Buens Randmoræner igennem den maleriske Kløft, hvori Femmøller ligger, og hvorigennem den lille Mølleaa nu løber.

Paa Tavle XVII, Fig. 1 ser man foran Agri Buens Randmoræner et fladt, men ikke videre bredt Parti. Det er den sydligste Spids af det omtalte, trekantede Mellemrum imellem Bakkerækkerne. Fig. 2 paa samme Tavle viser en lignende Flade, der ligger noget sydligere. Den danner en dalagtig Forlængelse af det ovenfor nævnte Omraade og strækker sig med langsomt tiltagende Højde imod SSV. imellem de to Buers Bakkerækker som et Vidnesbyrd om, at et lille Vandløb her har banet sig Vej imellem de to sammenstødende Istunger.

Efterhaanden som Isen i Æbeltoft Vig trak sig tilbage, dannedes den ene Række Randmoræner bagved den anden. Rækkerne fortsattes stadig væk længere og længere sydpaa, saa at de bageste af disse Bakker kan følges langs med Østkysten helt ned til Sydenden af Mols. Saaledes opstod det storslaaede Terrain, der betegnende bærer Navnet Mols Bjerger. Det danner et aldeles pragtfuldt Randmorænelandskab, med store Lyngbakker og mellemliggende dybe Huller. Disse sidste har ofte den karakteristiske Kedelform og ligger i Reglen i Række ligesom Bakkerne. Det er endog almindeligt, at en hel Række Huller smelter sammen til en langstrakt, dyb Lavning, hvori kun Bunden fremtræder som en Række adskilte Fordybninger. Man træffer de nævnte Huller i alle Størrelser fra ganske smaa Lavninger og til store Kedler med Dybder paa indtil 150 Fod (47 M.). Karakteren af dette Randmorænelandskab fremgaar af det Fotografi, der er gengivet i Fig. 2 paa Tavle XVI, og som er taget fra et Punkt $1\frac{1}{2}$ Km. ØSØ. for Agri imod Nordøst. Det viser den yderste Del af Æbeltoft Vig Buen paa dette Sted, og i Baggrunden ser man den øverste Ende af den Erosionskløft, hvori Femmøller ligger.

Det kan endnu nævnes, at den beskrevne Landskabsform ikke er uden Sidestykke, men at den ogsaa er kendt i Nordtyskland, idet MAAS har skildret ganske lignende Bakkeformer og tydet dem som typiske Randmoræner¹⁾. En Sammenligning af hans Billede fra

¹⁾ MAAS, G. 1901. Ueber Endmoränen in Westpreussen und angrenzenden Gebieten. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1900. S. 92—147.

Jastrower Berge (Taf. XIX) med de medfølgende Fotografier fra Mols og Grathjerg Randmorænerne vil tydeligt vise den store Overensstemmelse i Terrainformen. Ogsaa Beskrivelsen viser den store Lighed. MAAS skriver saaledes: „Dieser Zug der Jastrower Berge kann gleichsam als Typus einer Endmoräne aufgefasst werden. Kuppe reiht sich an Kuppe, Wall an Wall, und zwischen diesen oft nur schwer zu ersteigenden Höhen ein Gewirr von steilwandigen Kesseln und Rinnen (Taf. XIX)“¹⁾. En Forskel er der dog; selve Mols Bjerger er ikke saa stenede som det af MAAS skildrede Terrain, men ser man paa de stenede Grathjerg Randmoræner, er Overensstemmelsen fuldstændig.

Dannelsen af de kedelformede Huller i Randmorænelandskabet. Det, der giver det ovenfor skildrede Randmorænelandskab i al Almindelighed dets særlige Karakter, er den kuperede Overfladeform med dens talrige afløbsløse Fordybninger og Lavninger, Huller og Indsænkninger. Saadanne Terrainformer har ofte beskæftiget Geologerne, og som bekendt har man søgt at forklare deres Tilblivelse ad tre forskellige Veje. Simplest har man antaget, at det drejede sig om tilfældige Lavninger indenfor det af Isen uregelmæssigt aflejrede Morænemateriale, og denne Forklaring turde være fyldestgørende for en Mængde af Morænelandskabets uregelmæssige, større og mindre Fordybninger. Mere specielle Former af Huller har man søgt at tyde paa andre Maader. Saaledes har man navnlig i Nordtyskland villet føre en Del dybe Huller tilbage til en Udhulen af nedstyrtende Smeltevand i Lighed med Jættegrydefænomenet, og endelig har navnlig nordamerikanske Geologer i stor Udstrækning forklaret Morænelandskabets Fordybninger ved Bortsmelten af i det aflejrede Morænemateriale efterladte og indesluttede Isrester, ganske svarende til deres Tydning af Smeltevandsaflejringernes Huller. Ogsaa disse to sidste Forklaringsmaader maa betragtes som tilfredsstillende for en Del Overfladeformers Vedkommende, selv om Huller, opstaaede paa den sidstnævnte Maade, turde være de almindeligste.

Hvad nu specielt de kedelformede Huller i det her betragtede Randmorænelandskab angaar, da synes deres karakteristiske og saa temmelig konstante Form at antyde, at deres Dannelse skyldes en ensartet Aarsag, og saaledes at udelukke, at det her skulde dreje sig om tilfældige Lavninger imellem de enkelte Morænevolde.

Den anden Forklaringsmaade er anvendt af MADSEN for ganske tilsvarende Overfladeformer paa Samsø's Nordland og Helgenæs. Han

¹⁾ Anf. St. S. 100.

er, selv om han ikke helt tør udelukke den førstnævnte Mulighed, tilbøjelig til at tyde Kedlerne „som frembragte ved nedstyrtende Vandstrømme“ altsaa „som et Slags Jættegrydefænomen i det store“¹⁾, men dette forekommer lidet sandsynligt. Den hyppige rækkevis Anordning af Hullerne og det, at de ofte har forenet sig til lange Lavninger, taler imod, at de kan være dannede af spredt forekommende Gletschermøller, og den Omstændighed, at Rækkerne er parallelle med Isranden, udelukker, at Hullerne skyldes Gletscherbække, som styrtede ned igennem Spalter i Isens Randparti. Endelig kunde de være dannede af Vandløb, som faldt ud over en stejl Isrand og udskyllede Hullerne i Morænematerialet lige foran Isranden; men i saa Fald skulde man vel vente at finde det opslæmmede Materiale lejret i en regelmæssigt formet Grus- eller Sandbanke paa Ydersiden af Hullet. Ingen Steder finder man dog den mindste Andtning af saadanne regelmæssige Overfladeformer.

Derimod forekommer den tredie Forklaring i Virkeligheden langt sandsynligere. Sammenligner man de her omtalte Kedler med Smeltevandsaflejringerens Jordfaldshuller, er Ligheden iøjnefaldende, og det ligger allerede derfor nær at antage en ganske lignende Dannelsesmaade for Randmorænelandskabets kedelformede Huller som for disse, nemlig senere Bortsmelten af efterladte og begravede Isrester. Og for en saadan Dannelsesmaade taler ogsaa Udbredelsen af Hullerne. Det er tidligere omtalt, at man allerede træffer dem i den Del af Egens Buen, hvor Randmorænerne breder sig og indtager et forholdsvis stort Areal med den ene Grusvold bagved den anden. Indenfor Randmorænelandskabet i Mols og videre i de østlige Randpartier finder man dem overalt. Med andre Ord, Hullerne forekommer paa de Steder, hvor Randmorænelandskabets Bredde viser, at Isranden ikke til Stadighed har opholdt sig ved en bestemt Linie, men har været i langsom Tilbagerykning, og hvor der saaledes netop var Mulighed for, at Isrester kunde blive liggende og, begravede i Morænemateriale, holde sig i lang Tid.

Gennem denne Hypotese synes ogsaa det Forhold, at Hullerne ordner sig i Rækker parallelle med Isranden eller endog, at de samler sig til langstrakte Lavninger med samme Retning, at finde en Forklaring. Fra Nutidens Gletschere kender man, hvorledes Morænemateriale paa Overfladen kan beskytte den underliggende Is saaledes, at den smelter langsommere end de ubedækkede Flader, og det er velkendt, hvorledes f. Eks. en Midtmoræne over en lang Strækning kan vise sig at være en Isryg kun med et tagformet Dække af Morænemateriale. Paa

¹⁾ MADSEN, VICTOR. 1897. Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark. Kortbladet Samsø. D. G. U. I R. Nr. 5, S. 20—21.

samme Maade kan man ofte se, hvorledes den morænedækkede Rand af en Gletscher, lignende en mægtig Randmoræne, kan rage betydeligt op over den rene, bagved liggende Is, ja man kender fra Grønland endog Eksempler paa, hvorledes der paa Isen kan dannes lange, morænedækkede Volde parallele med Isranden paa Steder, hvor morænerige Lag fra Isens nedre Partier kommer op til Overfladen i Randzonen¹⁾. Ved Isens Afsmeltning kan en saadan Isvold skilles helt fra Gletscheren, og, dækket som den er af Moræne, holde sig forholdsvis længe. Har noget saadant fundet Sted i den her betragtede Egn, hvor der tillige langs med den tilbagerykkede Isrand afsattes en betydelig Mængde Materiale, forstaar man, at der i dette kunde blive indlejret forholdsvis smalle, men dog mægtige Isrester, der havde en udpræget Længderetning parallel med den tilbagesmeltende Isrand. Ved den senere Bortsmelten opstod der saaledes langstrakte, dybe Lavninger, og da den indesluttende Is kun sjældent var ganske regelmæssigt formet²⁾, fremtræder disse nu som oftest med en Række af Fordybninger i Bunden, eller de opløser sig i Rækker af mere eller mindre adskilte Huller. Hvad de helt isolerede og ofte næsten kredsformede Kedler angaar, kan man tænke sig dem dannet paa en ganske tilsvarende Maade paa Steder, hvor en tilfældig Rigdom paa Morænemateriale ved Isens Bortsmelten har givet Anledning til Dannelsen af morænedækkede Iskegler, saaledes som disse ogsaa kendes fra Nutidens Gletschere³⁾.

De i Randmoræneterrainet begravede Isrester maa antages først at være smeltede helt bort, efter at Indlandsisen havde forladt denne Egn. Herpaa tyder, at der paa forskellige Steder i Forbindelse med de kedelformede Huller forekommer store Erosionskløfter, som vender ind imod det tidligere af Isen dækkede Terrain. Saaledes træffer man i Sydvestskraaningene af Agri Højdepartiet et Par meget store og dybe Kløfter, der slutter sig nær til en Del udprægede Huller. Der løber nu aldrig Vand i dem, da Jordbunden her omkring er saa sandet, at Regnvandet straks synker ned i den, og det er derfor rimeligt at henføre deres Dannelse til en Tid, da der var rigeligere Tilførsel af Vand, f. Eks. fra Smeltning af begravede Isklumper.

De her fremsatte Anskuelser om Aarsagerne til den saa karakte-

¹⁾ SALISBURY, ROLLIN D. 1896. Salient Points concerning the Glacial Geology of North Greenland. The Journal of Geology. IV. S. 793—800.

²⁾ I den citerede Afhandling skriver SALISBURY saaledes om de nævnte Overflademoræner: Each one of these belts of drift is irregular, here higher, there lower, so that each belt, instead of being a continuous and even-crested ridge of drift, is really a succession of mounds. (S. 796).

³⁾ Se f. Eks. PENCK, A. und RICHTER, E. 1903. Glazialexkursion in die Ostalpen. S. 92 og Fotografiet S. 91.

ristiske Overfladeform indenfor denne Egns Randmorænelandskab bør naturligvis kun opfattes som en Hypotese, men de synes paa den naturligste Maade at kunne begrunde de forskellige ejendommelige Terrainformer i den sydøstlige Del af Grenaa Halvøen.

Æbeltoft Vig Buens nordlige og østlige Del. Norden om Æbeltoft Vig strækker den brede Morænebue sig som en direkte Fortsættelse af det vildt kuperede Terrain paa Østsiden af Mols. Jordbunden er stadig sandet og gruset, maaske dog overvejende sandet, og Terrainformen er ganske den samme, selv om Bakkerne her ikke altid er slet saa stejle og store, og Højden efterhaanden er aftagende. En lille Uregelmæssighed gør sig dog gældende, idet et mindre Omraade omtrent midt i Buen bryder det jævne Fald fra Øst til Vest ved at hæve sig lidt op over det øvrige Terrain. Det er Partiet omkring den 267 Fod (84 M.) høje Tinghøj ved Handrup; at dette Parti er blevet noget mere fremtrædende end Omgivelserne, turde ligge i, at Isen her skød sig op over den sydøstlige Ende af et Bakkedrag, der, som det ved en tidligere Lejlighed er udviklet, maa antages oprindelig at have strakt sig fra Terrainet Nordøst for Rosenholm Lavningen over Kalvø Egnen hertil.

Ser man derefter paa Østsiden af Æbeltoft Vig Buen, viser Forholdene sig at være noget lignende som paa Vestsiden, idet de nordligste Bakkerækker ikke er saa lange som de sydligere. De nordligste af Randmorænerne gaar saaledes ikke længere end til et Punkt ca. 1 Km. NNV. for Draaby, hvor en ny Bue tager sin Begyndelse. Randmorænerne ligger her og i hele Terrainet sydpaa ordnede vifteformet, idet dette Hjørne mellem to Israndsbuer har trukket sig temmelig hurtigt tilbage i en omtrent ret Linje lige imod Syd. De Randmoræner, der er afsatte langs med Randen af Æbeltoft Vigs Istunge, findes derfor kun paa Vestsiden af Halvøen og endog kun som et ca. 1 Km. bredt Bælte, der udgør den vestlige Rand af Bakkeknuden i Æbeltoft Halvøen.

Ligesom Grunden til den stærke Tilbagebøjning af Israndslinjen i Sammenstødet imellem Kalvø Vigs og Æbeltoft Vigs Istunger maa søges i den Omstændighed, at den store Bakkeknude midt i Mols allerede i Hovedsagen eksisterede, da Isen rykkede frem, og derfor virkede hæmmende paa dennes Bevægelse, saaledes maa man ogsaa antage, at Israndszonens Deling i to Istunger i den her betragtede Egn er bevirket af, at et ældre Højdeparti paa dette Sted har raget op og saaledes er kommen til at danne Basis for den nuværende Æbeltoft Halvø. Enkelte Jagttagelser synes at støtte denne Formodning. I den dybe Teglværksgrav ind i Skraaningen af Bakkelandet ved Syd-

enden af Æbeltoft findes saaledes under Randmorænerne Grus- og Sandaflejringer en Del graat, stenfrit Ler, og i Udgravningen til et Spor ind til den nordlige Del af Graven er der tillige iagttaget graat Moræneler. Disse Dannelser maa være ældre end Randmorænerne og svarer sandsynligvis til lignende Aflejringer længere nordpaa i Hoed Egnen, hvilke Forhold senere skal blive nærmere omtalte. Endvidere skal det nævnes, at man indenfor et lille Omraade med fladere og roligere Overfladeform i Terrainet Vest for Kobbergaard har Moræneler gaaende i Dagen.

3. Kattegats Isen.

Øst for de to Istunger, som strakte sig ind igennem de to store Vige paa Grenaa Halvøens Sydside, laa Isen i Kattegat. Ogsaa den er gaaet et Stykke ind paa Grenaa Halvøen, hvor den har efterladt sig tydelige Spor i Form af udprægede Randmoræner af ganske den samme Type som de tidligere beskrevne. Dog breder de sig her ud over et større Areal, idet Mellemrummene imellem de enkelte Bakke- drag er bredere, et Forhold som tyder paa, at den Is, ved hvis Rand de er dannede, er smeltet endnu hurtigere af, end Isen i Æbeltoft Vig. Den har paa Tilbagevejen ved sin Rand afsat en Mængde Grusbakker, der ligger ordnede i Buer bagved hinanden, og disse Buer støder til Bakkerækkerne i Æbeltoft Vig Buen under temmelig spidse Vinkler og saaledes, at Samlingspunkterne ligger i den ovenfor nævnte rette Linje fra lidt Syd for Stubbe Sø til det højere Terrain SSØ. for Æbeltoft.

Gratbjerg Randmorænerne. Den yderste af de nævnte Buer danner et meget udpræget Randmoræneparti, som efter dets højeste Punkt passende kan kaldes Gratbjerg Randmorænerne. Den forreste Bakkerække i dette Parti støder ved et Punkt ca. 1 Km. NNV. for Draaby sammen med Ydersiden af Æbeltoft Vig Buen og røber derved sin Samtidighed med de nordligste Bakker i denne Bue samt med de østligste Bakker i Egens Buen. Den nordvestlige Grænse for Gratbjerg Randmorænerne gaar fra det nævnte Punkt op over den 128 Fod (40 M.) høje Enhøj Sydvest for Stubbe. Herefter afbrydes den af Østenden af Stubbe Sø, men fortsættes igen Nord for Søen, hvor den passerer Nordvest om Gravlev og Syd om Hyldested. Syd for Hyldested naar disse Randmoræner den største Højde i Gratbjerg, nemlig 209 Fod (66 M.); dette Punkt ligger i den yderste af Bakkerækkerne.

Gratbjerg Randmorænerne ligner i Form ganske Mols Bjerger. Det

er et stærkt kuperet Terrain, opbygget af lange Grusbakker med mellemliggende, dybe Lavninger, og ogsaa her træffer man de iøjnefaldende, kedelformede Huller. Den yderste, lange Morænevold, hvori Gratbjerg ligger, har en meget karakteristisk Form. Indad imod de bagved liggende Moræner staar den med en stejl og noget uregelmæssigt formet Skraaning, medens dens Yderside fremtræder med et blødt og jævnt Affald. Dette Forhold kommer godt frem paa Billederne paa Tavle XVIII. Fig. 1 viser Gratbjerg set fra Indersiden, medens Fig. 2 giver den jævne Skraaning, som danner Morænevoldens Yderside. Det sidste Billede er taget omtrent fra Toppen af Gratbjerg imod VSV. Denne Forskel paa de to Sider er fremkommen ved, at det lokale Smeltevand, som rislede ned over Isranden, her har afsat lidt Sand, der smyger sig op ad Skraaning og ligesom tilslører den. I en stor Sandgrav ved Vejen fra Hyldested imod Syd kan man se Profil heri, og det ensartede, forholdsvis fine Sand, der findes her, danner en iøjnefaldende Modsætning til det grove Grus, som staar frem paa Bakkekammens Top og paa dens Inderside. I det hele taget er Gratbjerg Randmorænerne betydeligt mere grusede end de tidligere omtalte Bakkedrag, og navnlig er den nordøstlige Ende af Bakkepartiet ganske overordentlig stenet. Da gode Profiler i Bakkerne mangler, er det i Reglen meget vanskeligt at afgøre, om Gruset bør opfattes som Morænegrus eller som rullet Grus.

Gratbjerg Randmorænerne stopper ret brat imod Nordøst ca. $1\frac{1}{2}$ Km. VSV. for Rugaard. Man maa antage, at Forsættelsen af Isranden har gaaet videre over Kolbjerg, 129 Fod (40 Fod), og et Par andre Smaatoppe omtrent over Rugaard og videre østpaa ud i Kattegat.

De sydøstligste Randmoræner. Den Istunge, ved hvis Rand Gratbjerg Randmorænerne dannedes, har, som det allerede tidligere er antydnet, trukket sig hurtigt tilbage og under denne Tilbagerykning afsat et helt System af randmoræneagtige Grusbakker, der breder sig over hele Terrainet Syd for Gratbjerg Partiet sydpaa ned igennem Æbeltoft Halvøen, og som ofte ligger i Rækker. Dette sidste ses bedst imod Vest, hvor de støder til Æbeltoft Vig Buen samt i det høje Terrain i Æbeltoft Halvøen. I det lave Omraade paa begge Sider af Havmølle Aa og Øst for Draaby ses den rækkevise Anordning derimod ikke saa tydeligt, idet største Delen af Terrainet her dækkes af alluviale Dannelser, saaledes at i Reglen kun spredte Toppe af Grusbakkerne rager op igennem den alluviale Flade. Interessant er det at lægge Mærke til, at Retningen af Randmorænerne ikke er ens, men at den gradvis forandrer sig, naar man gaar fra Nord til Syd, idet Isen østpaa har trukket sig hurtigere tilbage end Hjørnet i Æbeltoft

Halvøen (se Fig. 4, S. 164). Retningen af Randmorænerne over Enhøj og Grathjerg er saaledes i Hovedsagen Sydvest—Nordøst, men naar man kommer ned i den sydlige Del af Æbeltoft Halvøen er Retningen omtrent Vest—Øst. Denne hurtigere Afsmeltning østpaa maa sættes i Forbindelse med, at Isranden her har staaet ud i Havet.

Angaaende Jordbundsforholdene i dette Terrain skal endnu bemærkes, at ogsaa Bakkerne her som Regel er temmelig grusede, selv om det ikke er i slet saa høj Grad som i Grathjerg Randmorænerne, og paa enkelte Steder er de endog forholdsvis sandede, f. Eks. i Draaby Egnen.

4. Den yderste Israndslinje.

Det er allerede tidligere antydnet, at Isranden i den østlige Del af det her betragtede Terrain har staaet noget længere fremme end ved den Stilling, der angives af de ovenfor beskrevne Randmorænestrøg. Selv om Isen ikke har efterladt sig Randmoræner i denne foranliggende Stilling, lader Israndslinjens Beliggenhed sig dog nogenlunde fastslaa paa Grundlag af Smeltevandsaflejringerne Udbredelse og de ret ejendommelige Lejringsforhold indenfor deres Omraade. Navnlig danner Sydgrænsen for den i Begyndelsen af dette Afsnit nævnte Hedeslette, som efter Landsbyen Tistrup ved dens Nordside passende kan kaldes Tistrup Hedesletten, et fast Udgangspunkt for Bestemmelsen af Israndens Beliggenhed i Terrainet nærmest udenfor de beskrevne Randmoræner, medens Terrassedannelserne i Hoed Egnen samt en lille Smeltevandsdal Nordvest for Grenaa viser, at Isen i det mindste til en Tid ogsaa har gaaet et Stykke ind i Grenaa Halvøen langs med dennes Østkyst.

Hedeslettens Sydgrænse Nord for Æbeltoft Vig. Det maa betragtes som utvivlsomt, at Isranden i længere Tid har staaet ved en Linje, som gaar fra et Punkt ca. 1 Km. VSV. for Fuglslev i en Bue, der vender imod Nord, til et Punkt ca. 1200 M. Øst for Sydenden af Øjesø. Her danner Linjen en ret Vinkel og fortsættes videre nogenlunde retlinjet imod Nordvest omtrent til den Plantage, der ligger Sydøst for Sølil Gaarde. At Isranden i længere Tid har opholdt sig her, fremgaar med Sikkerhed af, at den nævnte Linje danner Sydgrænsen for en Sand- og Grusslette, der er afsat af Smeltevand, og at Terrainet Syd for denne Grænse ligger lavere end Sandfladen nordfor og absolut ikke kan opfattes som et ved senere Erosion uddybet Omraade. Dette lavere liggende Terrain maa derfor have

været dækket af Isen den Gang, da Fladen foran dannedes, thi ellers vilde Smeltevandet ikke kunde have afsat Gruset dér, hvor det nu ligger; men det vilde, hvis ingen Is havde spærret, have spredt sit Materiale over hele det sydfor liggende, lave Terrain.

Forholdene her minder meget — selv om de kun er smaa — om visse Strækninger af den af KEILHACK beskrevne „Pommersche Urstromtal“, hvis Smeltevandsflade overalt imod Syd støder op til et højere liggende Terrain, medens en saadan naturlig Begræsning paa flere Steder mangler paa Nordsiden, saa at Terrassefladen kommer til at ligge højere end det tilgrænsende Terrain nordfor. KEILHACK viser, at den nu forsvundne Dalbegrænsning kun kan have været selve Indlandsisen, og disse Forhold benyttes af ham netop som Bevis for, at Isranden har staaet langs med saadanne Strækninger¹⁾. Ligeledes viser Hedeslettens Sydgrænse i Egnen Nord for Æbeltoft Vig en fuldstændig Analogi med den af USSING beskrevne Israndslinje Syd og Sydvest for Finderup, hvor Alheden begrænses paa ganske lignende Maade af en brat Skraaning nedad²⁾.

Endvidere er det værd at lægge Mærke til, at den betragtede Linje løber nogenlunde parallelt med nogle af de tidligere beskrevne Randmoræner. Buen fra Vest for Fuglslev til Øst for Øjesø svarer saaledes til Æbeltoft Vig Buen og Strækningen fra Øst for Øjesø imod Nordvest til en Del af Egens Buen. Denne Parallelitet angiver tydeligt, at det er den samme Is, der til forskellig Tid har staaet med sin Rand paa de to forskellige Steder.

Det her betragtede, bratte sydlige Affald af Smeltevandsaflejringen danner næsten hele Vejen en uafbrudt, temmelig stejl Skraaning; kun paa et Stykke i den vestlige Del af Buen mellem Øjesø og Fuglslev er den mindre regelmæssig. Højden af Skraaningen er noget varierende, fra 10—15 Fod (3—5 M.) og indtil 45 Fod (14 M.). Tavle XIX, Fig. 1 viser Skraaningen paa et Sted NNØ. for Tostrup, hvor den fremtræder særlig smukt som en høj og næsten retlinjet Skrænt.

Langs med denne Israndslinje findes der ingen egentlige Randmoræner, hverken paa selve Hedegrænsen eller umiddelbart bagved den; kun i Hjørnet Øst for Øjesø antager Overfladen noget af Randmorænernes Karakter, og her findes lige ved Slettens Sydgrænse foruden et Par meget lidt fremtrædende Toppe nogle smaa kedelformede Huller.

Det lavere liggende Terrain bagved den her betragtede Isrand-

¹⁾ KEILHACK, K. 1899. Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises und die hydrographische Entwicklung des pommerschen Küstengebietes. Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1898. S. 117—119.

²⁾ USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2. S. 118 og 134.

linje er smaat kuperet, og kun enkelte af Toppene naar samme Højde som Smeltevandsdannelserne foran. Jordbunden er overalt sandet, og Sandet her er finere end paa Hedesletten; ofte er det omlejret af Vinden, saa at der findes de nydeligste smaa Klitlandskaber; særlig smukt ses dette i Plantagen Syd for Skramsø Vandmølle samt i og omkring Plantagen Sydøst for Søilil Gaarde. Der er Grund til at antage, at det lagdelte Sand, som danner Overfladen i dette Terrain, kun forekommer som et temmelig tyndt Dække. Hvor der er Lejlighed til at se Profiler, viser det sig nemlig, at der under Sandet findes Morænedannelser. Saaledes saas i et Profil ved Vestsiden af Hovedlandevejen ca. 700 M. SSV. for Øxenmølle en Morænedannelse, der dels bestod af sandede, noget lagdelte Partier og dels af mere lerede Partier; herover fandtes et temmelig tyndt Lag af lagdelt Sand med Lagdelingen parallel med Grænsefladen mod den underliggende Moræneaflejring. Sandet var mægtigst i den sydlige Ende af Profilet. I en Grav ca. 1500 M. Øst for Øxenmølle iagttoges ganske lignende Forhold.

Dette Sanddække er maaske afsat af lokalt Smeltevand, da Isranden trak sig tilbage over dette Terrain. Den Mulighed er dog heller ikke udelukket, at Smeltevandet har aflejret det ovenpaa tilbageblevne Isrester, medens selve Isranden stod ved Randmorænerne i Æbeltoft Vig Buen, og at den direkte Paalejring af Sandet paa de underliggende Morænedannelser saaledes først er fremkommen, efterhaanden som den „døde“ Is smeltede. Der er ogsaa andre Forhold, som maaske naturligtst kan forklares ud fra Forudsætningen om en saadan død Ismasse her. Der findes nemlig Sydøst for Ørnbjerg Vandmølle og lige udenfor Æbeltoft Vig Randmorænerne et lille Stykke flad Sandslette, som er mærkelig ved sin betydelige Højde paa indtil over 140 Fod (44 M.) og ved, at den mod Nord standser med en stejl Skrænt, saa at Terrainet omkring Ulstrup Aa lige Nord herfor ligger ca. 100 Fod (31 M.) lavere. Imod Sydøst er denne lille Slette fuld af større og mindre Huller, der ligger saa tæt, at Fladekarakteren forsvinder. Et lignende brat Affald som Nord for denne Sandflade findes lige Øst herfor langs med Sydkysten af Stubbe Sø, idet der angives, at denne Sø har en betydelig Dybde umiddelbart ud for den sydlige Bred, medens den nordlige Del af Søen er ret fladvandet. Disse Forhold synes at tyde paa, at der virkelig har ligget „død“ Is Nord for de omtalte bratte Skraaninger, medens den „levende“ Is stod ved Æbeltoft Vig Buens Randmoræner.

Fortsættelse af Hedeslettens Sydgrænse imod Vest. Af det foregaaende fremgaar det, at der i Terrainet Nord for Æbeltoft Vig

findes en tydelig Israndslinje fra Vest for Fuglslev omtrent til Søllil Gaarde. Der rejser sig naturligt det Spørgsmaal, hvor Forsættelsen af den Isrand, der har staaet her, har gaaet. Søger man denne Fortsættelse, viser det sig, at der i Terrainet kun findes faa Holdepunkter til Bestemmelse af Linjens Forløb. Da det sikre Stykke af den, som ovenfor omtalt, gaar parallelt med de bagved liggende Randmoræner, ligger det nær, naar man vil trække Fortsættelsen af Linjen, at konstruere denne videre ud til begge Sider parallelt med de bagved liggende Randmoræner.

Fortsættelsen vestpaa maa man saaledes tænke sig gaaende Syd om Nabhøj til Sydenden af den 98 Fod (31 M.) høje Bakke Nordøst for Rostved. Her maa den bøje imod Nordvest og løbe hen til de yderste Randmoræner ved Faarup.

For et saadant videre Forløb af Israndslinjen taler navnlig Tilstedeværelsen af de ovenfor nævnte, ejendommelige Bakker, idet disse maa opfattes som hørende til Hedesletten. Ind i Skraaningerne af Bakkerne findes der flere Steder Grave, hvor man kan se, at Bakkerne er opbyggede af vandrette Lag af Sand og fint Grus. Dette, i Forbindelse med, at Overfladen af dem er ganske flad, og at deres Højde passer godt med Hedeslettens Højde, synes at pege i den nævnte Retning. At de nu fremtræder som Bakker maa da enten skyldes senere Erosion eller rimeligvis Bortsmelten af i Sandet begravede, isolerede Ispartier. En lignende Dannelsesmaade maa i Virkeligheden antages for hele det Nord for liggende Terrain, men Om- talen heraf maa opsættes til et senere Afsnit (se S. 211—212).

Fortsættelse af Hedeslettens Sydgrænse imod Øst. Forlængelsen af Israndslinjen østpaa maa søges lige Nord om Fuglslev og Kjærsholm og videre i samme Retning parallelt med de bagved liggende Grathjerg Randmoræner. Ved første Øjekast kunde det maaske synes naturligere at trække Linjen langs med den Skraaning, der gaar fra et Punkt ca. 800 M. Sydvest for Fuglslev imod ØNØ. Naar dette ikke er gjort, er det, fordi der Nord for denne Linje findes nogle store Lavninger, der absolut ikke bærer Præg af at være dannede ved en senere Erosion, og som derfor utvivlsomt ligesaa godt var blevne fyldte med Smeltevandsaflejringer som Terrainet Nord for, hvis Isen ikke havde dækket dem, dengang Smeltevandsgruset afsattes. Der tænkes her paa den i VSV.—ØNØ. langstrakte Lavning, hvori Fuglslev ligger, samt Stormose Lavningen Sydøst for Kjærsholm og en mindre Lavning ØNØ. for denne, og tillige peger det noget mere kuperede Terrain videre østpaa i samme Retning.

Den ovenfor omtalte, sydligere Skraaning kan ogsaa forklares paa

anden Maade. Efter al Sandsynlighed er dens Tilstedeværelse nemlig betinget af, at Underlaget for de senglaciale Dannelser her gaar meget nær op imod Overfladen. Skraaningene danner nemlig Sydsiden af en langstrakt, flad Forhøjning, som mod Syd afgrænser Fuglslev Lavningen. Denne ganske flade Bakkes Retning er ØNØ.—VSV. Ved en nærmere Undersøgelse af Egnen her omkring viser det sig, at ganske lignende Forhøjninger i Terrainet med fuldstændig den samme Retning ingenlunde er sjældne. Allerede 600 M. sydligere træffer man en saadan. Den gaar fra Søholt Nord for Stubbe Sø imod ØNØ. Nordøst for Gravlev kommer Gratbjerg Randmorænerne sydfra op paa den og følger den paa det næste Stykke. Maaske er det netop dette Forhold, der betinger den forholdsvis store Højde af den yderste Bakkerække i Gratbjerg Randmorænerne.

Overfladen af den sidstnævnte Bakke er ligesom paa de andre sandet og gruset; men i denne har jeg i et enkelt Profil haft Lejlighed til at overbevise mig om, at Bakken ikke helt igennem bestaar af Sand og Grus, men at der er Sandsynlighed for, at Sandet og Gruset, ligesom i det øvrige Terrain her omkring, kun danner en tynd Kappe over en anderledes bygget Kærne. Det Profil, der sigtes til, er iagttaget i en Grav ind i Skraaningene 350 M. ØNØ. for Søholt. Graven var saa godt som tilgroet, men forneden i den var der paany gravet noget ind, og her fandtes Moræneler af normal Beskaffenhed. En for disse Egne usædvanlig frodig Bøgevegetation i et Par andre fuldstændig tilgroede Grave ind i Skraaningerne, synes at røbe, at ogsaa disse er gamle Mergelgrave. Lignende Forhøjninger i det underliggende Terrain kan spores ind under Randmorænen Enhøj Syd for Stubbe Sø og i Terrainet Nord for Holme samt mindre tydeligt enkelte andre Steder. Den Antagelse, at disse i VSV.—ØNØ. langstrakte Former hører til det underliggende ældre Terrain, støttes yderligere af den Kendsgerning, at det ældre Terrain, der længere nordpaa ligger uden for Israndsdannelserne, viser lignende langstrakte Former med nøjagtigt den samme Retning.

Sandsynlig Israndslinje langs med Grenaa Halvøens Østkyst. Inden denne Redegørelse for Israndsstillingerne i den sydlige Del af Grenaa Halvøen sluttet, bør det dog nævnes, at der i Egnen omkring Hoed samt Nordvest for Grenaa findes Forhold, som kun lader sig forklare ved at antage, at Isranden, da den stod i sin yderste Stilling langs med Sydsiden af Smeltevandsaflejringerne Nord for Æbeltoft Vig, imod Nordøst endnu har fulgt Grenaa Halvøens Kyst et Stykke nordpaa. Men det skal fremhæves, at den paa Kortet tegnede Israndslinje, hvad Enkelthederne angaar, er ret hypotetisk, og at de Kends-

gerninger, jeg støtter min Antagelse til, kun er faa. I Hovedsagen er det Aflejningsforholdene og Udbredelsen af Smeltevandsgruset, der fører til den nævnte Anskuelse, og den nærmere Begrundelse af denne falder naturligst under Beskrivelsen af Smeltevandsaflejringerne og kan derfor passende opsættes til Omtalen af disse Dannelser (S. 194—196 og 207—209). Jeg skal her kun kort nævne den Linje, som jeg mener omtrent betegner den yderste Stilling af denne Isrand. Den maa antages at gaa i en Bue over Rosmos, Vest om Edelstrup forbi Lyngsdal Gaard omtrent til Ravnhøj for herfra atter at bøje fremad ind i Kolindsund Lavningen og gaa videre over den østlige, lave Ende af Plateauet i den nordlige Del af Halvøen forbi Kirial og Veggerslev til Gjerild Bugt.

C. Smeltevandsdannelser.

Det er i det foregaaende Afsnit vist, hvorledes Israndslinjen fra den tidligere betragtede Del af Østjylland fortsætter sig ud igennem den sydlige Del af Grenaa Halvøen, let kendelig ved et helt System af Randmoræner, og det er tillige antydnet, at der i Terrainet udenfor disse findes udprægede Smeltevandsdannelser, der i det hele og store strækker sig som et Bælte tværs igennem Halvøen. Et Studium af disse kan ikke blot give Oplysninger om Israndens Stilling paa Steder, hvor den ikke har efterladt sig Spor i Form af udprægede Randmoræner, og derigennem røbe, at Isen ogsaa til en Tid er gaaet et Stykke op over Grenaa Halvøens Østkyst, men et saadant Detailstudium kan tillige kaste Lys over mange ejendommelige Forhold indenfor selve Smeltevandsaflejringernes Omraade, og det er i Virkeligheden ikke faa Spørgsmaal, man derigennem kan gøre sig Haab om at faa besvarede. Det kunde saaledes have sin Interesse at bestemme, hvorvidt det Smeltevand, der har aflejret Sandet og Gruset foran Isranden, er kommet ud fra denne paa et enkelt eller paa flere isolerede Punkter, eller om Vandafløbet fra Isranden har været jævnt fordelt paa hele Strækningen, samt i hvilken Retning Vandet er løbet for at naa ud til Havet. Endvidere kunde man tænke sig Muligheden af at udrede det indbyrdes Aldersforhold imellem forskellige Dele af Smeltevandsdannelserne og disses Forhold til forskellige Opholdslinjer af Isranden, samt i det hele taget at naa til Forstaaelse af Udviklingen af ogsaa de nuværende Vandløbsforhold.

Som det væsentligste Middel til Udførelsen af saadanne Bestemmelser maa foruden Kendskabet til Udbredelsen af Smeltevands-

dannelserne navnlig Højdeforholdene indenfor disse tjene, og en god Støtte ved Bedømmelsen af Forholdene kan endvidere Studiet af Kornstørrelsen i Aflejringerne afgive. Anvender man nu saadanne Betragtningssmaader paa det Bælte af Smeltevandsdannelser, som strækker sig tværs igennem Grenaa Halvøen, finder man i det store og hele, at Højden afgjort er størst østpaa, og at den aftager nogenlunde jævnt imod Vest samtidig med, at det aflejrede Materiale bliver finere. Disse Forhold viser tydeligt, at Hovedtilførslen af Smeltevand er sket østfra, og at Vandet er løbet imod Vest og Nordvest.

Dette karakteriserer i store Træk den betydeligste af Grenaa Halvøens Smeltevandsdannelser. Men en nærmere Betragtning viser, at Forholdene ikke er saa ganske enkle og usammensatte, idet man finder to forskellige, parallelt løbende Aflejringer paa noget forskellig Højde og af ikke helt den samme Alder. Navnlig i det østlige Terrain er Adskillelsen imellem disse to „Terrasser“ tydelig, baade fordi Højdeforskellen her er størst, og fordi Smeltevandet, selv om det kom fra den samme Egn, dog har fulgt to forskellige Løb paa det første Stykke af sin Vej imod Vest, nemlig fra Hoed Egnen først over den tidligere nævnte Tistrup Hedeslette Syd om Attrup-Horsted Højdepartierne og senere igennem Hoed-Hallendrup Dalen til Vestenden af Kolindsund. Længere fremad mødes de to Aflejringer atter i Terrainet Vest for Kolind, men her er Højdeforskellen ikke længere saa stor, og de strækker sig videre ud igennem den store Skafo Gaard-Gl. Estrup Dal.

1. Smeltevandsgruset i Hoed Egnen.

Grusets Beskaffenhed og Udbredelse. Det ligger nær at begynde denne Undersøgelse i den Egn, hvor den store Gletscherflod er kommet ud fra Isen, og det tillige af den Grund, at man først igennem Betragtningen af de mægtige Aflejringer af overordentlig groft, rullet Grus i Terrainet nærmest udenfor Isranden paa dette Sted faar et Begreb om, hvor store Vandmasser det i Virkeligheden her drejer sig om.

Følger man Smeltevandsgruset fra Tistrup Hedesletten østpaa og opad, eller følger man Grusterrasserne i Hoed-Hallendrup Dalen imod Øst, kommer man i begge Tilfælde i Hoed Egnen ind i et Terrain, hvor Jordbunden udelukkende bestaar af usædvanlig groft, rullet Grus. Da dette Grus indeholder en Mængde Rullesten af Saltholmskalk, brydes det paa mange Steder, saa der er god Lejlighed til at se Profiler deri. Større og mindre Brud ligger saaledes spredte over hele Terrainet Syd for en Linje i VSV.—ØNØ. igennem Balle og Dalen

fra Balle østpaa. Imod Syd træffes de til en Linje i Øst—Vest gennem Nordsiden af Rugaard Dyrehave og vestpaa saa langt som til Rosmos. Naar der ingen Kalkbrud findes vestligere, ligger det i, at Gruset dér bliver finere. De største og mest bekendte Brud ligger ved Glatved Strand ¹⁾.

Overalt i Kalkbruddene i denne Egn ser man Grus, der er udpræget rullet og har smuk Lagdeling. Det er ganske overordentlig groft og indeholder som Regel kun underordnet mere sandede Lag. Ofte træffes spredte, store Sten i det, og blandt disse ser man saavel nogle, der bærer tydeligt Præg af at være vandslidte, som andre, der endnu ganske har Karakter af Morænesten. Tavle XIX, Fig. 2 og Tavle XX, Fig. 1 giver en Forestilling om denne vigtige Dannelselse. Det første Billede, der er taget i 1904, viser det østligste og største af Bruddene ved Glatved Strand set oppefra, og man faar af det et godt Begreb om, hvor betydelig en Aflejring, det her drejer sig om. Det andet Billede viser i større Maalestok et Parti af det samme Brud, men da dette Fotografi er taget i 1903, kan Stedet ikke ses paa Totalbilledet; det har ligget noget foran (til højre for) den fremspringende Kam, som ses et Stykke tilbage i det første Billede.

En saadan mægtig Aflejring af groft, rullet Grus med saa store Sten kan man vanskeligt tænke sig dannet uden umiddelbart ved en Isrand og kun paa et Sted, hvor Isen har afgivet betydelige Mængder af Smeltevand. Da disse Lag overalt gaar i Dagen, og da Lagdelingen er fuldstændig uforstyrret, ledes man uvilkaarligt til den Antagelse, at en meget betydelig Smeltevandsflod her er strømmet ud fra Isen, medbringende Sand og Grus. Det grove Grus har den aflejret lige foran Isranden i det her betragtede Terrain, Sandet og det finere Grus først længere borte. Medens Studiet af Udbredelsen af det finere Materiale i Terrainet udenfor Isranden kan give Oplysninger om de Veje, Smeltevandet har fulgt ud imod sit endelige Maal Havet, saaledes kan man ogsaa vente igennem Kendskabet til Udbredelsen af det grove Grus at faa noget at vide om, hvor den store Smeltevandsflod er kommen ud fra Isen, og, hvis Gruset breder sig over et større Omraade, ad hvilken Vej Gletscherporten har trukket sig tilbage under Isens Afsmeltning. Der skal derfor først og fremmest blive gjort nærmere Rede for de Grænser, indenfor hvilke man træffer det meget grove Grus.

Det viser sig nu, at det grove Grus findes indenfor et i omtrent Vest—Øst langstrakt Omraade, der strækker sig imod Øst helt ud til Kysten. Nordpaa gaar det ikke længere end til Hoed-Hallendrup

¹⁾ Det rullede Grus i denne Egn er tidligere omtalt i: USSING, N. V. 1899. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2. S. 99 (2den Udg. 1904. S. 118).

Dalen og denne Dals Fortsættelse østpaa til Kattegat, idet der paa Plateauet Nord herfor findes Moræneler. Sydgrænsen for Smeltevandsgruset er noget vanskeligere at angive, da dette sydpaa gaar over i et Terrain, hvor der stadig findes rullet Grus, men hvor Overfladeformen nærmest tyder paa, at Isranden har staaet. Imod Vest gaar Gruset med jævn Overgang over i de finere Aflejringer dels i Tistrup Hedesletten og dels i Hoed-Hallendrup Dalen og saaledes, at det allerede begynder at blive finere henholdsvis Vest for Rosmos og i Østenden af Hoed-Hallendrup Dalen. Selve Udbredelsen af det grove Smeltevandsgrus tyder saaledes paa, at man har haft en Gletscherport, der trak sig tilbage i Retningen omtrent fra Vest til Øst.

Grusets Lejringsforhold. I det nærmest foregaaende er der kun gjort Rede for Beskaffenheden af Smeltevandsgruset i Hoed Egnen samt for dets Udbredelse, idet Gruset er opfattet som en enkelt, sammenhængende Aflejring. Dette sidste er dog kun for saa vidt rigtigt, som alt Gruset er afsat af den samme Smeltevandsflod under Gletscherportens Tilbagerykning imod Øst omtrent fra Rosmos til Kysten. Men som allerede tidligere antydet, deler Grusaflejringen sig i to udpræget forskellige Dele, en ældre, højereliggende og en yngre, lavere, svarende til to forskellige Afløb imod Vest for Smeltevandet.

Ser man saaledes paa Højdeforholdene indenfor Hoed Egnens Grusomraade, er det iøjnefaldende, at Grusets Overflade ikke er højest længst imod Øst og derfra jævnt faldende vestpaa, men at de højeste Punkter tvært imod findes et Stykke imod Vest. Det højest liggende og ældre Grus træffer man nemlig kun i Terrainet VSV. og Sydvest for Hoed, hvor Overfladen paa enkelte Punkter naar over 120 Fod (38 M.), og det er dette højtliggende Grus, der fortsættes i den i det foregaaende allerede oftere omtalte Tistrup Hedeslette, og som sammen med denne danner en sammenhængende Smeltevandsaflejring, som i det følgende skal blive betegnet „*Første Terrasse*“. Paa Tavle IV, der er et Kort over Smeltevandsdannelserne i Hoed Egnen, er denne ældre Aflejring betegnet med en rød gul Farve. Hele denne Smeltevandsdannelse maa tænkes afsat, medens Gletscherporten efterhaanden trak sig tilbage omtrent fra Rosmos til et Punkt ca. 600 M. Sydvest for Hoed.

Imod Øst gaar det højere og ældre Smeltevandsgrus ikke længere end til den Dal, hvori Hoed Aa's nedre Løb nu findes. I Terrainet Øst for denne Dal og i de forskellige større og mindre Dale i Egnen omkring Hoed samt strækkende sig vestpaa ind i Hoed-Hallendrup Dalen findes ogsaa Grus af fuldstændig samme Udseende og Beskaffenhed som det ældre Smeltevandsgrus, og det skilles kun fra dette ved,

at dets Overflade ligger lavere, svarende til, at Smeltevandsfloden nu havde brudt sig en ny og dybere Vej igennem Hoed-Hallerup Dalen. Alle disse forskellige, lavere liggende Smeltevandsaflejringer samler sig i dens Grusterrasse. De kan saaledes kun opfattes som sammenhørende Dannelser og kan derfor passende sammenfattes under Betegnelsen „*Anden Terrasse*“.

Højden her er betydeligt mindre end indenfor det ældre Grus. Saaledes naar Terrasserne ved Østenden af Hoed-Hallendrup Dalen kun til ca. 70 Fod (22 M.) imod Højder paa indtil 120 Fod (38 M.) i det sydfor liggende Terrain. Dog stiger Højden østpaa noget, idet en Del af det herhen hørende Grus i Egnen mellem Hoed og Glatved Strand hæver sig til et lavt Plateau, over hvilket man maa antage at Gletscherporten har trukket sig videre tilbage, efter at Gennembruddet af Hoed-Hallendrup Dalen var fuldbyrdet. Paa dette Plateau gaar Højden paa flere Steder op til omtrent 100 Fod (31 M.). Paa Kortet over Smeltevandsdannelserne er Anden Terrasses Dalaflejringer betegnede med en lys gul Farve, og det omtalte, lidt højere liggende Plateau er antydnet med en lidt mere rødlig Tone.

Det foregaaende giver i store Træk Fordelingen af de to forskellige Grusaflejringer i Hoed Egnen og Gangen i Udviklingen af dette ejendommelige Terrain. Da begge de to Grusaflejringer paa det nøjeste slutter sig til hver sin videre imod Vest gaaende Smeltevandsdannelse, er det naturligt for den mere indgaaende Beskrivelses Vedkommende at tage hver enkelt Aflejring op til Behandling i Sammenhæng med den vestlige Fortsættelse. Der skal derfor i de følgende Afsnit blive givet en Skildring af først den ene og saa den anden af de to Terrasser, hvorved der kan blive Lejlighed til at komme ind paa en Del yderligere Enkeltheder vedrørende deres Udbredelse og Lejringsforhold og derigennem at begrunde den fremsatte Anskuelse om Udviklingen af Aflejringen og det indbyrdes Forhold imellem de to Terrasser.

2. Første Terrasse.

Udbredelse. Den Smeltevandsdannelse, som ovenfor er betegnet Første Terrasse strækker sig fra Hoed Egnen som et langt Grusbælte først imod Vest og senere imod Nordvest Syd om Attrup-Horsted Højdepartierne. Østgrænsen for denne Grusaflejring dannes, som tidligere anført, af den Dal, der gaar fra Hoed imod Syd, og hvori Hoed Aa's nedre Løb nu findes; den skal i det følgende blive kaldt Hoed Dalen.

Sydgrænsen dannes af den i et foregaaende Afsnit beskrevne

yderste Israndslinje Nord for Æbeltoft Vig, idet Smeltevandet, der er kommet ud fra Isen imellem Rosmos og Hoed, har løbet langs med denne Isrand. Naar Gruset i den østlige Del paa sine Steder (f. Eks. paa begge Sider af Stormose Lavningen) synes at gaa længere sydpaa end til denne Linje, maa det forklares ved, at der under den sydlige Isrands senere Tilbagerykning stadig af lokalt Smeltevand er afsat noget Sand og Grus foran den.

Grusaflejringens Nordgrænse gaar fra Balle imod VSV. Grænsen dannes paa det første Stykke af den Dal, der gaar fra Rosmos ud til Hoed-Hallendrup Dalen lige Vest for Balle, og som i det følgende skal kaldes Rosmos Dalen. Denne noget yngre Dal er netop nedgravet paa det Sted, hvor Grænsen imellem Gruset og det højere liggende Attrup Højdeparti oprindeligt har været, saa selve denne Grænse mangler paa det første Stykke. Først naar man kommer til en i Rosmos Dalen fremspringende Pynt ca. 1 Km. Nordøst for Rosmos, træffer man denne Grænse. Den gaar herfra i en næsten lige Linje omtrent imod Vest til et Punkt ca. 400 M. Øst for Sydenden af Ørup, hvor den igen afbrydes af Rosmos Dalen. Dette Stykke af Grænsen er meget iøjnefaldende i Terrainet. Kommer man saaledes gaaende ad Vejen oppe fra Attrup Højdepartiet sydpaa imod Rosmos, kan man ikke undgaa at lægge Mærke til den. Man kommer ad en nogenlunde jævn Skraaning fra det højere Terrain ned paa Gruset, der ligger i lange, flade Bølger parallelle med Grænsen. Hele Karakteren af det høje Terrain er vidt forskellig fra Grusterrainet; f. Eks. findes der i det første en Del Smaaavæld, der mange Steder har farvet Jordbunden mørk, og aldrig træffer man den Mængde Sten, som normalt ligger paa Overfladen i Grusterrainet. Jordbunden i Højdepartiet bestaar for en stor Del af Diluvialsand med forstyrret Lagdeling samt noget stenfrit Ler og lidt Moræneler.

Fra ca. 400 M. Øst for Sydenden af Ørup til ca. 800 M. Sydvest for Ørup løber Grænsen igen i Rosmos Dalen. Fra det sidstnævnte Punkt gaar den atter imod Vest og senere imod Nordvest som en i Terrainet tydelig Linje, der danner Grænsen mellem et temmelig fladt, gruset Terrain imod Syd og et jævnt skraanende, svagt kuperet, dels leret og dels sandet, højere liggende Omraade imod Nord. Denne Linje gaar fra det nævnte Punkt imod Vest igennem Tistrup og videre lige Syd om Trondhjems Gaard for derefter at begynde at bøje imod Nord, idet den paa et Stykke omtrent følger Vejen fra Tistrup til Stabrand, dog som Regel lidt Nord for denne Vej. Nordøst for Stabrand findes der en Lavning, hvori Vandet er flydt ind og har afsat finere Sand, saa at Grænsen for Smeltevandsdannelserne her kommer til at gaa ind i et Hak i Horstved Højdepartiet. Vest for denne Lavning fortsættes Grænsen imod Nordvest overordentlig tydeligt, til den ved

Maarup løber sammen med den Dal, der gennemløbes af Maarup Aa's øvre Løb. Paa det næste Stykke dannes Grænsen af denne Dal; Retningen er stadig Sydøst—Nordvest.

Højdeforhold og Overfladeform. Foreløbig skal Smeltevandets ikke følges længere imod Vest, førend Beskrivelsen af det østligere Terrain er afsluttet. For Første Terrasses Vedkommende staar der endnu tilbage at gøre Rede for Højdeforholdene og Overfladeformerne indenfor det Areal, hvis Grænser er givne i det foregaaende.

Ser man bort fra de Dale og Lavninger, der maa antages at være dannede ved en senere Erosion, fremtræder denne Aflejring som et langt, smalt Bælte med en Overflade, der er temmelig jævn og flad og næsten vandret, kun med et svagt Fald imod Vest, og hvis hele Udseende minder meget om en almindelig Hedeslette. Faldet er i Hovedsagen i Aflejringens Længderetning, men saa svagt, at man kun ved Hjælp af Kortets Horizontalkurver kan danne sig et Billede af Terrassens Hældning. Fra en Højde af omkring 120 Fod (38 M.) i det højeste Grusterrain længst imod Øst falder Overfladen paa en Strækning af omtrent 16 Km. til ca. 60 Fod (19 M.) i den nordvestlige Ende af Tistrup Hedesletten, svarende til et Gennemsnitsfald af 1:850. Dette Fald er dog ikke jævnt fordelt paa hele Strækningen, men det er stærkest i det østligste Terrain og mindre i den vestlige og største Del af Terrassen — Tistrup Hedesletten —, her nemlig kun ca. 1:1000.

Naar det er sagt, at Faldet i det hele og store gaar i Aflejringens Længderetning, er der set bort fra enkelte, smaa, lokale Afvigelser. Paa flere Steder, navnlig i den vestligste Del, hæver Overfladen sig nemlig imod Syd, saaledes at den største Højde i en Linje tværs over Hedesletten findes ved dennes Sydrand. Særlig smukt fremtræder dette NNV. for Skramso Vandmølle samt Nord for Felballe. Dette Forhold tyder paa, at der her er aflejret lidt Materiale af lokalt Smeltevand fra den sydfor staaende Isrand. Da Materialet i disse smaa „Aflejningskegler“ er forholdsvis fint i Sammenligning med Materialet i selve Grusaflejringen længere nordpaa, og da de i det hele taget gør Indtryk af at ligge ovenpaa selve Grusfladen, maa Dannelsen af dem være vedblevet, efter at Hovedtilløbet af Smeltevand østfra var ophørt.

I den østligste og højeste Del af Første Terrasse er Overfladen noget mindre regelmæssig, og der findes forholdsvis betydelige Højdedifferenser i Linjer tværs over Aflejringen. Der viser sig nu det ved første Øjekast mærkelige Forhold, at de højeste Punkter ikke, saaledes som længere imod Vest, ligger ved Sydranden, men midt i Bæltet i

et Strøg, der har Retningen VSV.—ØNØ., Syd for den østlige Ende af Rosmos Dalen. Da de højeste Dele af Grusaflejringen maa være dannede dér, hvor Smeltevandsfloden kom ud fra Isen, og følgelig maa ligge i Israndslinjen, leder allerede denne Iagttagelse til en Formodning om, at den sydfor staaende Isrand ikke har fortsat sig imod Øst til Kattedgat, men tvært imod atter er bøjet imod Nord, og at denne nordgaaende Isrand har trukket sig hurtigt tilbage i østlig Retning, saa at Gletscherporten efterhaanden har staaet forskellige Steder i det i VSV.—ØNØ. gaaende Strøg af det højest liggende Grus.

I Virkeligheden er der flere Ting, der tyder paa en saadan Stilling af Isranden. Mest iøjnefaldende er to Dale, der løber fuldstændig parallelt, og hvis indbyrdes Afstand kun er 300—400 M. Den vestligste af dem er tør, medens den østligste — Hoed Dalen — nu gennemløbes af Hoed Aa. Dalenes fuldstændige Parallelitet synes at tyde paa, at i alle Tilfælde Anlægget af dem maa skyldes de samme Omstændigheder; at disse maa henføres til en tilbagesmeltende Is, synes sandsynligt paa Grund af Dalenes svagt buede Forløb, og fordi deres Retning er vinkelret paa det i VSV.—ØNØ. langstrakte, højeste Parti af Smeltevandsgruset, altsaa vinkelret paa den Retning, i hvilken Gletscherporten har trukket sig tilbage.

Endvidere peger Overfladeformen af det lidt lavere liggende, sydlige Smeltevandsgrus i samme Retning. Medens det højest liggende Grus udviser en jævn, svagt hvælvet Overflade, bliver Overfladeformen, naar man gaar fra dette Grus sydpaa, efterhaanden lidt uroligere, idet der optræder en Del lave, langstrakte og randmoræneliggende Smaatoppe og Volde. Dette fremtræder bedst i Terrainet Vest for den vestligste af de ovenfor omtalte Dale, og Længderetningen af Voldene er her fuldstændig parallel med Dalene. Følgende Dannelsesmaade synes at være naturligst. Medens Gletscherporten stod dér, hvor nu det højeste Grus findes, løb Hovedmængden af Vandet vestpaa — den eneste Vej, det kunde komme bort. Da Terrainet Syd for Gletscherporten, i Hjørnet mellem den Øst—Vest gaaende og den Syd—Nord gaaende Isrand, laa lidt lavere, er dog noget Smeltevand flydt herved, medbringende mindre Mængder Grus; men da hverken Tilførslen af Materiale eller Vandbevægelsen har været særlig stor, har de Smaavolde, som sammenskubbedes ved Israndens smaa Fremstød, faaet Lov at blive liggende uden at blive overdækkede af Grus eller udjævnede af den stærke Vandbevægelse.

Den yderste Israndslinjes Fortsættelse nordpaa. Som det ovenfor er vist, antyder allerede lokale Forhold indenfor Smeltevandsdannelserne, at Isranden er bøjet nordpaa. At dette har været Tilfældet,

turde dog tydeligst fremgaa af den Omstændighed, at den store Smeltevandsflod, som kom ud fra Isen saa nær ved den nuværende Østkyst, ikke har fundet sig en Vej til denne, men er løbet imod Vest ind igennem Landet. Grunden hertil kan kun have været den, at selve Indlandsisen laa i den nærmest tilstødende Del af Kattegat og saaledes hindrede Afløb ad denne Vej.

Selv om der ogsaa udenfor det Omraade, som indtages af Smeltevandsaflejringerne, er Forhold, der kunde tyde paa en saadan nordgaaende Isrand samtidig med Dannelsen af Første Terrasse, er Spørgsmaalet om, hvor denne Isrands yderste Stilling har været, dog vanskeligt at besvare. I det Terrain, hvor Smeltevandsdannelserne findes, kan mulige Spor af denne yderste Isrand godt være begravede under senere afsat Grus, og i det øvrige Terrain er Forholdene langt fra klare. Antagelig har Isranden kun staaet i meget kort Tid ved den yderste Stilling, saa at der maaske af den Grund ikke er bleven dannet nogen Randmoræne. Under sin jævne Tilbagerykning har Isranden heller ikke efterladt sig kendelige Spor udenfor Smeltevandsdannelserne. Man vil derfor kunne forstaa, at den paa Kortet tegnede Linje ikke kan gøre Fordring paa at repræsentere mere end en Formodning om Israndens yderste Stilling, en Formodning, som maaske ved mere detaillerede Undersøgelser kan blive yderligere sandsynliggjort.

Man maa antage, at den her omhandlede Isrand i sin yderste Stilling har staaet i en Bue, som kan kaldes Hoed Buen, omtrent over Rosmos, Vest om Edelstrup, forbi Lyngsdal Gaard og over Ravnhøj, der maaske tildels kan opfattes som en Randmorænebakke, omtrent til Landsbyen Højbjerg. Endvidere skal det nævnes, at en Smeltevandsaflejring i Veggerslev Aa's Dal tyder paa, at Isranden fra det sidstnævnte Punkt atter er bøjet fremad i Terrainet Sydvest for Grenaa for først at naa ud til Havet i Gjerild Bugt, men den nærmere Omtale heraf maa opsættes til et senere Afsnit (S. 207—209).

Den fremsatte Formodning om Isens største Udbredelse i Hoed Buen støttes dels paa de omtalte Forhold indenfor Smeltevandsaflejringerne og dels paa Overfladeformen og Jordbundsbeskaffenheden i Terrainet Nord for Hoed-Hallerup Dalen og denne Dals Fortsættelse østpaa til Kattegat (Glatved Dalen). I dette Terrain er det, som om Overfladeformen i det normalt i ØNØ.—VSV. langstrakte Terrain inden for (Sydøst for) den omtalte Linje er noget mere udvisket. Dertil kommer, at Jordbunden indenfor Linjen ganske overvejende bestaar af Moræneler, en Jordart, der ellers er ret sjælden i disse Egne, medens der i Terrainet udenfor hovedsagelig findes fluvioglacialt Sand og Grus samt flere Steder noget stenfrit Ler og enkelte Steder lidt Moræneler. Moræneleret indenfor den angivne Israndslinje synes

at optræde som et Dække over de samme Dannelser, som udenfor denne Linje gaar i Dagen, et Forhold, der kan tyde paa, at Moræneleret er dannet samtidig med Smeltevandsgruset. Om dette virkelig er Tilfældet, kan ikke afgøres med Sikkerhed paa Grundlag af de foretagne Undersøgelser, da der ingen Steder har været Lejlighed til at se Profiler, som gik igennem Moræneleret, og den formodede Paa-lejring altsaa ikke er direkte iagttaget. Det, der fører til denne Antagelse, er den Omstændighed, at Moræneleret optræder saa konstant i Overfladen, i Forbindelse med, at der i Dalskraaningens syd for findes de samme Jordarter, som længere imod Vest og Nordvest gaar i Dagen, nemlig overvejende fluvioglacialt Sand samt noget fedt, kalkholdigt, stenfrit Ler. Da denne sidste Jordart er temmelig let kendelig, kan Studiet af dens Udbredelse maaske støtte den her fremsatte Formodning, og i det følgende skal derfor nævnes de Punkter, hvor der er iagttaget saadant stenfrit Ler.

I Glatved Dalen har der ligget to mindre Teglværker, der har taget deres Ler i Dalens Nordskraaning. Paa to Punkter imellem disse er der iagttaget stenfrit Ler i Grave ind i Skraaningens. Den ene Grav ligger NNV. for Glatved; den var ved mit Besøg næsten helt tilgroet, men i et Hul i en af Siderne saas lidt stenfrit, lysegult Ler og fint sorteret Sand. I en Grav Nordøst for Glatved i samme Dalskraaning saas ligeledes stenfrit Ler og Sand i uregelmæssige, skarpkantede og velbegrænsede Klumper imellem hinanden. I Foden af Tindbjerg (den østlige Pynt af Attrup Højdepartiet) er der iagttaget et mindre Profil i fedt, stenfrit Ler. Endvidere maa det formodes, at den samme Jordart findes i en nu helt tilskredet og tilgroet Teglværksgrav lige Syd for Balle ind i den nordligste Ende af Hoed Dalens Vestskraaning. Hvis det findes her, overlejljes det paa dette Sted af Smeltevandsgruset i Første Terrasse.

Udenfor den formodede Israndslinje findes stenfrit Ler gaaende i Dagen paa flere Punkter, og paa to Steder har der været Lejlighed til at se Profil deri. Det ene Sted er i Tistrup Teglværks Lergrav, der ligger paa Sydsiden af Attrup Højdepartiet lige ved Hedeslettens Grænse Vest for Tistrup. Leret her var tydelig lagdelt, og Lagdelingen kun lidt forstyrret. Ved nærmere Eftersyn viste det sig, at Leret var brokket og den tydelige Lagdeling fremkommen ved, at Smaabrokker af en fed, graa Lerart laa ordnede i Lag. Det andet Profil fandtes straks Syd for Obdrup Gaard, og Forholdene her var ganske lignende; endvidere kan det nævnes, at der paa Skraaningens ned imod Hoed-Hallendrup Dalen Nord og Nordøst for Attrup findes rigeligt stenfrit Ler. Der har tidligere ligget to Teglværker her, men Gravene er nu aldeles tilgroede, saa at man intet kan se. Kun med Boret kan man rundt omkring paa Skraaningens her paavise fedt, stenfrit Ler.

Alle de i det foregaaende fremdragne Forhold, der hver for sig kun siger lidt, synes, naar de tages under ét, ikke blot at vise, at Isranden virkelig er bøjet imod Nord, men tillige at tyde paa, at dens Yderstilling har været omtrent ved den angivne Linje.

Man maa da tænke sig, at der i den sydligste Del af Hoed Buen har staaet en Gletscherport, hvorigennem en stor Smeltevandsflod strømmede ud fra Isen, og at det er Smeltevandet herfra, der har aflejret Gruset i hele Første Terrasse og paa et senere Tidspunkt i Anden Terrasse. Efterhaanden som Isranden trak sig tilbage, flyttedes ogsaa det Punkt ved Gletscherporten, hvor Gruset opdyngedes til størst Højde, og man ser saaledes i det omtalte Strøg i VSV.—ØNØ. af højtliggende Grus den Vej, Gletscherporten har fulgt under Tilbagerykningen, medens Første Terrasse dannedes.

3. Anden Terrasse.

Gennembrudet af Hoed-Hallendrup Dalen. Man kan gaa ud fra, at Isen i Hoed Buen er smeltet hurtigt af. Efter at være rykket noget tilbage maa Isranden antages at være kommen til en saadan Stilling, at Attrup Højdepartiet ikke længere tvang Smeltevandet til at løbe imod VSV. over Rosmos, men at dette har kunnet bane sig Vej imod VNV. og efterhaanden har udgravet Hoed-Hallendrup Dalen.

Man kan tænke sig, at det er gaaet til paa følgende Maade. I det oprindelige Terrain har Hoed-Hallendrup Dalen slet ikke eksisteret, og det i VSV.—ØNØ. langstrakte Terrain har fortsat sig tværs over Dalen, saaledes at Attrup Højdepartiet har staaet i Forbindelse med det ganske flade Højdeparti Nord for Øster Balle, og at Ryggen Trudstrup-Obdrup ogsaa har fortsat sig over Dalen til Bøgehøj. Forbindelsen mellem Attrup Partiet og Øster Balle Partiet maa antages at have været lidt lavere end disse to og have haft en Højde af omtrent 110—120 (35—38 M.). Trudstrup-Obdrup Partiets Forlængelse over Dalen maa have været noget lavere. Idet nu Isranden i Hoed Buen trækker sig tilbage, saaledes at det lave Paspunkt mellem Attrup og Øster Balle Partierne bliver isfrit samtidig med, at Smeltevandet udenfor Isranden sydfor opdynger sit medbragte Materiale til samme Højde som Paspunktet, indtræffer den Mulighed, at Vandet kan løbe over her og bane sig en ny Vej imod VNV. Trudstrup-Obdrup Bakkeryggens Forlængelse over Dalen har sikkert ikke dannet nogen væsentlig Hindring, idet dette Parti er temmelig lavt, Nordvest for Bjørnsholm saaledes ikke 100 Fod (31 M.). At det virkelig er gaaet saaledes til, synes det Sving, Dalen gør Vest for Lykesholm, at antyde, idet den her nærmer sig til at antage det ældre

Terrains Retning; med andre Ord: Vandet har her, efter at have brudt igennem Attrup - Øster Balle Barrieren, forefundet en oprindelig, flad Lavning mellem Attrup Højdepartiet og Obdrup Højdepartiet og det har fulgt denne, indtil den standser ved, at Terrainet hæver sig ved Drammelstrup. Nord herfor har Obdrup Højdepartiet været lavere — antagelig godt 90 Fod (28 M.) — og her er Vandet derfor løbet over og har gravet en Aabning gennem denne sidste Forhindring. Derefter har det haft frit Løb imod VNV. til Vestenden af Kolindsund.

Den Omstændighed, at Smeltevandets her har brudt sig en ny Bane og hurtigt nedgravet sig en Dal paa et lavere Niveau end de ældre Smeltevandsdannelser, har betinget, at der nu ikke mere aflejredes saa højtliggende Grus, og at Smeltevandet heller ikke længere fulgte den gamle Vej over Tistrup Hedesletten Syd om Attrup-Horstved Højdepartierne. Gruset umiddelbart udenfor Isranden opdyngedes derefter i det lavere Terrain længere østpaa, og Smeltevandet løb videre igennem den nydannede Hoed-Hallendrup Dal, uddybede og udvidede denne samtidig med, at det paa sine Steder i Dalen aflejrede noget af sit medførte Materiale, der nu fremtræder som spredte Terrassedannelser i Dalbunden.

Saaledes som her er antydet, maa de oprindelige Terrainforhold i Forbindelse med Hoed Israndens Tilbagerykning have betinget Afbrydelsen af Grusaflejringen i Første Terrasse og Dannelsen af Anden Terrasse.

Smeltevandet fra den sydlige Isrand. Til Anden Terrasse hører der ikke blot Smeltevandsdannelserne i selve Hoed-Hallendrup Dalen, men ogsaa forskellige Grusaflejringer, dannede af Tilløbene til denne Dal. Langt den overvejende Mængde af det Vand, der er løbet igennem Dalen, er kommet fra Egnen Sydøst for Hoed, idet den store Gletscherport, som tidligere stod imellem Rosmos og Hoed, har trukket sig tilbage over dette Terrain. Men desuden har et Par ikke helt ubetydelige Tilløb ført Smeltevand fra den Øst—Vest gaaende Isrand Syd for Første Terrasses Grusaflejringer op til den samme Dal.

Den mest iøjnefaldende af de Dale, som Smeltevandet fra den sydlige Isrand har nedgravet sig i Første Terrasse, er den lange Rosmos Dal, der fra et saa vestlig Punkt som Fuglslev strækker sig imod ØNØ. hen til Østenden af Hoed-Hallendrup Dalen. Paa Grund af senere Erosion er den nu temmelig dyb og mere bugtet, end den oprindelig har været, men som Minder om det første Stadium af dens Udvikling rummer den endnu smukke Terrasserester, der skyder sig ud som Tunger i Dalen og rager op over den tørvefyldte, allu-

viale Dalbund. Byen Rosmos ligger saaledes paa et Terrassestykke paa Dalens venstre Side, og lige nedenfor kommer paa højre Side en smuk Terrassetunge, hvis Udseende fremgaar af Fig. 2 paa Tavle XX. Billedet, der er taget fra Dalens modsatte Side, viser desuden Første Terrasses flade Plateau i Baggrunden, og forrest ser man den lave, alluviale Dalbund, som bestaar af Tørv. Derefter følger en mindre Terrasserest, som dog snart er ødelagt ved Kalkbrydning, paa venstre Side af Dalen og knap 900 M. Nordøst for Rosmos, saa et smukt Terrassestykke paa højre Side ca. 1300 M. Nordøst for Rosmos og endelig Terrassefladerne paa det Sted, hvor Dalen munder ud i Hoed-Hallendrup Dalen.

Det Vand, der har udgravet denne Dal, er kommet helt nede fra den øst-vestlige Isrand ved Fuglslev og har naaet Dalen dels gennem en mindre, nu fuldstændig tør Dal, der munder ud i Rosmos Dalen omtrent 400 M. VSV. for Rosmos, og hvis Højde svarer til Dalterrasserne, og dels antagelig igennem den øvre Del af den nuværende Rosmos Dalen. I dette sidste Dalstykke findes ingen udpræget Terrasse; som Rester af en saadan maa man dog opfatte den temmelig jævne Skraaning Syd for Ørup paa Dalens Sydside op til 90 Fods Kurven og muligvis en lignende Skraaning ØSØ. for Langballe Gaard paa Dalens venstre (nordlige) Side. Højden skulde saa her være ca. 90 Fod (28 M.), det sidste Sted maaske lidt derover; ved Rosmos er den ca. 80 Fod (25 M.), straks Nordøst for Rosmos 75 Fod (24 M.), 1300 M. Nordøst for Rosmos godt 70 Fod (22 M.) og Syd for Ennegaarde godt 65 Fod (20 M.). Man ser, at Terrassens Højde stiger imod Sydvest, og dette viser tydeligt, at Vandet i den oprindelige Dalbund er løbet til Hoed-Hallendrup Dalen.

Umiddelbart før Rosmos Dalen munder ud i Hoed-Hallendrup Dalen, støder en ny, fra den sydlige Isrand kommende Dal til, nemlig den vestligste af de to tidligere omtalte, parallele Dale. Denne er kun en lille Dal; dens Længde er ca. $1\frac{1}{2}$ Km. og Bredden ca. 200 M. Bunden af Dalen er flad og fuldstændig tør; dens Højde over Havet er 70—80 Fod (22—25 M.), en Højde, der svarer til Terrasserne i Rosmos Dalen og i Hoed-Hallendrup Dalen. Dens Udseende fremgaar af Fig. 1 paa Tavle XXI; Billedet, som er taget fra Dalens vestlige Side imod Nordøst, viser et Parti omtrent midt i den. Denne Dals krummede Forløb og fuldstændige Paralleletet med Hoed Dalen samt Forekomsten af de smaa, randmoræneagtige Volde med samme Længderetning Vest for Sydenden af den, har jeg allerede tidligere omtalt (S. 194), og jeg har i disse Omstændigheder ment at se en Antydning af, at disse to Dale var anlagte umiddelbart foran en Isrand. Angaaende den vestligste, her betragtede Dal anser jeg det for sandsynligst, at den kun er anlagt som en lille og ganske ubetydelig Rende

langs med Isranden rimeligvis netop paa det Tidspunkt, da Vandet var ved at begynde at bryde igennem Attrup-Øster Balle Barrieren. Det kan nemlig ikke være meget af denne Dal, der er dannet paa det Tidspunkt, da Isranden stod dér, hvor Dalen nu findes, thi det Smeltevand, der har afsat det høje Grus lige Øst for Dalen, maa i Hovedsagen stadig have løbet vestpaa tværs over den. Da Isen i Hoed Buen trak sig tilbage herfra, kan der derfor kun antages at have eksisteret en ubetydelig, maaske endog delvis udfyldt, Lavning eller Erosionsrende, men denne Lavning har dog været saa udpræget, at det lokale Smeltevand, der kom fra den Øst—Vest gaaende Isrand sydfor, har søgt igennem den og udgravet den Dal, der nu findes, ned til et Niveau, der svarede til Dybden af den daværende Hoed-Hallendrup Dal. Dannelsen af Dalen kan derfor først være afsluttet, efter at Hoed-Hallendrup Dalen i nogen Tid havde besørget Afledningen af alt Smeltevandet fra denne Egn.

Det sidste Raisonnement angaaende den nøjere Aldersbestemmelse maa ogsaa gælde for Rosmos Dalen, der har faaet sit Vand fra et langt vestligere Punkt af den samme Øst—Vest gaaende Isrand. Disse Omstændigheder, i Forbindelse med de tidligere omtalte, smaa Aflejningskegler med forholdsvis fint Materiale endnu vestligere udenfor den samme Isrand, tyder stærkt paa, at Isen langs med hele Sydgrænsen af Første Terrasse endnu er bleven staaende i samme Stilling, medens Isranden i Hoed Buen allerede var i stærk Tilbagegang.

Smeltevandet fra Gletscherporten. Den østligste af de to parallelle Dale, Hoed Dalen, maa ligeledes antages at være anlagt i umiddelbar Nærhed af den tilbagesmeltende Isrand. Den er noget større end den foregaaende; dens Længde er over 2 Km., og den er ca. 600 M. bred, længst imod Sydøst endog en Del bredere. Denne Dal maa vel ogsaa have tjent til Bortledning af noget lokalt Smeltevand fra den sydlige Isrands Fortsættelse imod Øst, men Grunden til dens betydelige Størrelse maa man sikkert søge i, at en Del af den store Vandmængde, som strømmede ud fra den østlige Isrand, herigennem er løbet til Hoed-Hallendrup Dalen.

Medens den vestligste af de to parallelle Dale først efterhaanden nedgravedes i Første Terrasses Grusaflejring, har der sikkert igen Hoed Dalen fra første Færd løbet en Del Vand, og dens Dannelsen staar i nøje Forbindelse med Gennembruddet i Attrup-Øster Balle Barrieren. Da det lave Paspunkt her var blevet isfrit, og Vandet brød igennem, sænkedes nemlig Afløbet saa meget, at Smeltevandet ikke længere kunde løbe vestpaa, da det dér standsedes af det tidligere aflejrede Grus. Dette dannede en uoverstigelig Hindring for

Vandet og tvang det saaledes til at løbe langs med Østgrænsen af det højtliggende Grus. Der maatte følgelig opstaa et Smeltevandsløb netop paa det Sted, hvor Isranden stod, da Gennembruddet fuldbyrdedes. I den vestlige Skraaning af Hoed Dalen har man derfor ikke blot en almindelig Erosionsskraaning, men tillige et lignende pludseligt Affald af en Smeltevandsaflejring som det, der findes længere vestpaa ved Sydranden af Første Terrasse, og som tidligere er udførligt omtalt. At Skraaningene her fremtræder meget stejle, skyldes naturligvis den senere Erosion, idet Vandet altid har søgt ud til denne Side af Dalen. Saaledes løber ogsaa det nuværende Vandløb langs med denne Side, og man træffer ikke dér noget Spor af ældre Terrasser. Langs med den østlige Dalside findes der derimod hele Vejen en Terrasse, hvis Bredde er over Halvdelen af hele Dalens Bredde. Højden af denne Terrasse gaar op til 70 Fod (22 M.). Flere Steder, navnlig lige Syd for Hoed, gaar dog Terrassen jævnt over i det østligere, noget højere liggende Grus, idet der er løbet Vand herfra til Dalen.

Øst for Hoed Dalen hæver Terrainet sig, stadig bestaaende af groft, rullet Grus, op til et lavt, plateauagtigt Omraade, der imod Øst og Sydøst gaar helt ud til Kysten, og som imod Nord paa en lignende Maade som imod Vest begrænses af en Dal, nemlig Glatved Dalen. Denne sidste minder en Del om Hoed Dalen; saaledes er den Dalskraaning, der ligger overfor det yngre Smeltevandsgrus, stejl og meget fremtrædende i Terrainet, og langs med denne Dalside er der kun meget lidt tilbage af den oprindelige Terrasse. Langs med Syd-siden af Dalen er Terrassen derimod smukt udviklet, og den gaar her saa godt som hele Vejen jævnt over i det højere liggende Smeltevandsgrus sydfor. Højden af den egentlige Dalterrasse gaar dog her kun op til ca. 60 Fod (19 M.), svarende til, at den nærmest er ubetydeligt yngre end Terrassen i Hoed Dalen.

Tilbage staar endnu Omtalen af det nævnte Plateau Sydøst for Hoed. I den Halvdel af dette Parti, der ligger længst imod VNV., er Overfladen temmelig flad, og Højden er fra 80 til 100 Fod (25—31 M.). Faldet er i Reglen jævnt ned imod de to Dale, medens de modsatte Sider i Dalene fremtræder som bratte Skraaninger. Dette, i Forbindelse med flere Smaarender, der strækker sig skraat ned imod Dalterrasserne, viser, at Vandet har løbet fra Plateauet til Dalene. Selve Plateauet bør saaledes nærmest opfattes som en mægtig Grusophobning, der er aflejret af Smeltevandsfloden umiddelbart udenfor Gletscherporten, og hvorfra Vandet har søgt ud til Siderne til de to Dale for igennem dem at naa Hoed-Hallendrup Dalen.

Øst for en Linje i NNØ.—SSV., omtrent midt imellem Hoed og Kysten, falder Plateauets Overflade noget, saa der fremkommer en

flad Lavning, som er aaben ud mod Glatved Dalen, og hvis Bund for en stor Del danner en umiddelbar Fortsættelse af Grusterrassen ved denne Dals Sydside. Først længst imod Sydøst stiger Terrainet igen til samme Højde som i den større, vestlige Del. Det Vand, der har afsat dette højeste østlige Grus, har paa sin Vej til Hoed-Hallendrup Dalen kun benyttet Glatved Dalen.

Ser man paa Formen af hele det omtalte Grusplateau, der betegner den Vej, ad hvilken Gletscherporten trak sig tilbage, er det tydeligt, at denne Tilbagerykningslinje efterhaanden forandrer Retning. Medens Gletscherporten under Dannelsen af Første Terrasse langsomt vandrede imod ØNØ., maa man antage, at den efter Gennembruddet flyttede sig i mere og mere østlig Retning for tilsidst at gaa tilbage imod ØSØ., og man ledes herigennem til en Formodning om, at Isranden i Hoed Buen er smeltet hurtigere tilbage i dennes nordlige Del end længst imod Syd, ganske paa samme Maade som den gradvis ændrede Retning af Randmorænerne i den østlige Del af Æbeltoft Halvøen antyder, at Gratbjerg Buen har trukket sig tilbage.

Det første betydelige Resultat af, at Isen imod Nord smeltede bort, maatte blive, at Spærringen af Kolindsund hævedes, saa at den fra Hoed-Hallendrup Dalen kommende Smeltevandsflod nu kunde følge denne kortere Vej til Havet. Det er sandsynligt, at Højdeforholdene indenfor det omtalte Grusplateau delvis er betingede af denne Udvikling, saaledes at den høje, vestlige Del af Plateauet er dannet, medens Smeltevandet endnu maatte søge fra Vestenden af Kolindsund imod Vest til Skafo Gaard-Gl. Estrup Dalen, medens den østlige Del af Gruset derimod skulde være aflejret i Løbet af den Tid, da Smeltevandsfloden fulgte Kolindsund imod Øst til Havet. Højden af Terrasserne i de forskellige, ovenfor omtalte Tilløbsdale maa da svare til Erosionsniveauet i dette sidste Tidsafsnit.

Efterhaanden som Isranden og dermed Gletscherporten trak sig endnu længere tilbage, forefandt Smeltevandet udenfor den nuværende Kyst et lavere Terrain foran Isranden, og Afløbet skiftede igen. Vandet løb ikke længere gennem Hoed-Hallendrup Dalen, men direkte nordpaa. Saa meget kan man slutte af Manglen paa yngre og lavere liggende Smeltevandsdannelser i det Terrain, der nu ligger over Havet; men den videre Efterforskning af det formodede yngre Smeltevandsafløb maa opgives, da dette enten er ødelagt ved Havets senere Erosion eller ligger begravet under Vandet.

Hoed-Hallendrup Dalen. Man har nu set, hvorledes der i Egnen omkring Hoed findes en Del større og mindre Dale, igennem hvilke

Smeltevandet fra Isranden er løbet til Hoed-Hallendrup Dalen for gennem denne Dal at søge videre ud imod Havet.

Det er allerede tidligere omtalt, at Hoed-Hallendrup Dalen er udgravet af selve Smeltevandet, og det er nævnt, at der igennem Dalen findes Terrasser bestaaende af rullet Grus. Gruset er grovest længst imod Øst og bliver finere vestpaa samtidig med, at Terrassens Overflade falder. I det følgende skal der gives nogle Tal paa Højderne af Terrasserne gennem Dalen. Det er nævnt, at Terrassehøjden i Mundingen af Rosmos Dalen er godt 65 Fod (20 M.). Højden af det Terrassestykke, der ligger lige udenfor i Hoed-Hallendrup Dalen, og som gaar fra Balle mod Nordvest, er længst imod Nordvest godt 55 Fod (17 M.). Dette Grus kan dog ikke betragtes som det absolut højeste, der har ligget paa dette Sted. Grus paa højere Niveau træffer man saaledes lidt vestligere ved Edelstrup, op ad Dalens Sydskraaning. Det gaar her op til godt 70 Fod (22 M.), medens Terrassestykket ude i Dalen Nordvest herfor kun naar 56 Fod (18 M.) og nærmest kan betragtes som en direkte Fortsættelse af det sidstnævnte Terrassestykke. Paa Holmen naar Gruset paa det højeste Punkt op til 67 Fod (21 M.). Paa Nordsiden af Dalen mellem Høgholm og Hallendrup gaar Terrassen inde ved Dalskraaningen paa sine Steder op til 50—60 Fod (16—19 M.), men falder jævnt ned mod Aaen. Omtrent 1600 M. Vest for Hallendrup er Terrassens Højde ved Sydsiden af Dalen godt 35 Fod (11 M.), og lidt VNV. herfor naar den ude i Dalen op til 38 Fod (12 M.). Lige Syd for Banelinjen og 1500 M. Øst for Kjeldstrup naar et Punkt ude i Dalen 28 Fod (9 M.).

De her nævnte Tal giver, som man allerede vil have forstaaet af det foregaaende, ikke Højden af en sammenhængende og absolut samtidig Dannelse, men kun Højderne af de Terrasserester, der nu findes i Dalen i den Orden, hvori de forekommer fra Øst til Vest. Det har ikke været muligt at udskille forskellige Niveauer; tvært imod synes der at være den jævne Overgang fra det højeste til det laveste Grus paa et og samme Sted i Dalen. Man træffer saaledes aldrig stejle Terrasseskraaninger, og Dalgrusets Overflade falder altid ganske jævnt fra den større eller mindre Højde ned imod den nuværende Tørveflade. Forholdene tyder saaledes paa, at Uddybningen af Dalen er vedbleven jævnt og uafbrudt, selv om der paa sine Steder er aflejret Grus i flade Banker, og man maa antage, at Grusterrassernes jævne Fald ned imod den nuværende Tørveoverflade fortsættes under Tørven. Hvis Tørven blev fjærnet fra Dalen, vilde man sikkert forefinde en Dalbund, der paa hele Strækningen fra Balle til Kolindsund faldt imod Vest. Et Par Tal vil vise dette, selv om disse Tal ikke kan gøre Krav paa større Nøjagtighed. Nord for Holmen ved Vejen, der gaar fra Obdrup til Attrup, gravedes der Tørv ved mit

Besøg. En Mand, der var beskæftiget med dette Arbejde, spurgte jeg om Tørvens Tykkelse; han kendte den ikke nøjagtigt, men anslog den til en halv Snes Alen. Lige ved Aæn ca. 2300 M. Øst herfor angav en anden Tørvegraver, at Tørvens Mægtighed dér var et Par Alen. Naar man kommer saa langt Øst paa som til Balle, forsvinder Tørven saa godt som fuldstændigt.

Om Hoed-Hallendrup Dalen er gravet helt ned til denne Dybde i den senglaciale Tid, eller om Erosionen i en Del af den post-placiale Tid har været medvirkende, er et Spørgsmaal, der er vanskeligt at besvare. Det eneste, man foreløbig tør sige, er, at Dalens Udvikling i den senglaciale Tid falder i to Afsnit svarende til to forskellige Afløb. Det maa nemlig betragtes som utvivlsomt, at Smeltevandets i den første Tid, efter at Gennembruddet af Hoed-Hallendrup Dalen var sket, er løbet fra Kolindsund imod Vest igennem den nuværende Ryom Aa's Dal til den store Skafo Gaard-Gl. Estrup Dal, og at det er dette Smeltevand, der har gravet Ryom Aa's Dal ned i den ældre Terrasseflade og til en Dybde, der svarer til den Terrasse, hvorpaa Ryom Gaard Station ligger. Naar Smeltevandet dengang, saavel som under Aflejringen af Første Terrasse, er blevet tvunget til at løbe vestpaa i Stedet for at følge den kortere Vej til Havet igennem Kolindsund, maa det ligge i, at denne antagelig gamle Dalrende paa det her betragtede Tidspunkt har været isspærret. Først paa et senere Tidspunkt er denne Spærring bleven hævet, saa at Smeltevandet fra Hoed Egnen i den sidste Tid har kunnet løbe igennem Hoed-Hallendrup Dalen og derefter følge Kolindsund imod Øst; paa Grund af det lavere Afløb har den kunnet uddybe Hoed-Hallendrup Dalen yderligere samtidig med, at de forskellige Smaadale, der, som det senere skal blive omtalt (S. 217—218), udgaar fra Vestenden af Kolindsund, efterhaanden dannedes.

Til Støtte for den sidst fremsatte Formodning kan der dog ikke fremføres noget virkelig positivt; men den synes at være den naturligste Forklaring af de forskellige omtalte Forhold, og den kan muligvis begrunde, at Kolindsund paa store Strækninger begrænses af udprægede Erosionsskræninger.

4. Nordligere Smeltevandsdannelser.

Smeltevandsgruset ved Kirial. Det er allerede tidligere nævnt, at der i Grenaa Halvøens østlige Del findes endnu en Smeltevandsaflejring, som maa antages at høre til de her betragtede Israndsdannelser. Den ligger i en smuk Dal, som med en Retning omtrent i Syd—Nord afskærer den østlige og lave Ende af Halvøens store, nordlige Pla-

teauland, og hvori den nuværende Skærvad Aa løber i modsat Retning af det gamle Smeltevandsløb, nemlig til Kolindsund, medens Dalens nordlige Del afvandes af Veggerslev Aa til Gjerild Bugt.

Denne Dal har en ret betydelig Størrelse. Paa en lang Strækning er den omkring 800 M. bred, ja ved den øverste Ende af Smeltevandsaflejringen er Bredden endog godt 1 Km. Den er skaaret dybt ned i Terrainet, og den nuværende Dalbund ligger paa Steder ca. 100 Fod (31 M.) lavere end Omgivelserne.

Ved Kirial, som ligger godt 4 Km. VNV. for Grenaa, begynder der en Aflejring af Smeltevandsgrus, som herfra strækker sig ned igennem Dalen. I meget minder Gruset ved Kirial om Hoed Egnens Smeltevandsdannelser. Ikke blot drejer det sig ogsaa her om meget groft, rullet Grus, men man genfinder tillige Rigdommen paa Kalkrullesten, der betinger, at Gruset brydes for Kalkens Skyld. I den øverste Ende breder Gruset sig ved Kirial over næsten hele Dalbunden. Det ligger midt i Dalen umiddelbart Sydvest for Kirial paa en Højde af ca. 55 Fod (17 M.); dog stiger Grusoverfladen lokalt imod Aflejringens Sydøsthjørne op til ca. 70 Fod (22 M.).

Som en stor Grusterrasse følger det nu Dalen vestpaa, til denne knap 2 Km. fremme begynder at svinge imod Nord for med en ejendommelig, meget brat Ombøjning hurtigt at dreje om imod Sydøst og derefter at svinge lige saa hurtigt tilbage og fortsætte sig med nordlig Retning. Paa Nordsiden af den Landtunge, der fra det Øst for Dalen liggende Højland skyder sig spidst ud i det første Dalsving, ligger der atter et stort Terrassestykke, og det samme er Tilfældet paa Østsiden af en lignende Spids, der fra det vestlige Plateau strækker sig ned i den anden bratte Ombøjning af Dalen. Videre nordpaa forsvinder Gruset derefter snart ned under den alluviale Tørveflade.

Hvad Beskaffenheden af Smeltevandsgruset angaar, da er der Lejlighed til at undersøge den i flere Kalkbrud. Det største af disse er ført fra Grenaa-Randers Landevejen ind i Grusterrassen straks Vest for Kirial; Fig. 2 paa Tavle XXI viser dets Udseende. Her findes groft, udpræget rullet og vandret lagdelt Grus, hvori Stenene dog sjældent er over $\frac{1}{4}$ M. store, i Reglen noget mindre. Det er ganske overvejende Flint og Kalksten, og andre Bjergarter er sjældne. Ved mit Besøg i 1904 kunde Grusets Underlag ikke ses, men ifølge USSING er Mægtigheden her lidt over 20 Fod (6 M.), og Gruset hviler paa faststaaende Saltholmskalk.¹⁾ Omtrent 300 M. VNV. for dette Kalkbrud findes en anden, men mindre Grav i ganske lignende Grus,

¹⁾ USSING, N. V. 1899. Danmarks Geologi. D. G. U. III R. Nr. 2, S. 99 (2den Udg. 1904. S. 118). Ifølge velvillig Meddelelse fra Professor USSING er den anførte lagttagelse gjort netop i dette Kalkbrud i 1896.

der dog maaske er lidt finere, navnlig i de øvre Partier, og som viser en endnu tydeligere vandret Lagdeling.

I det næste Terrassestykke, der har en omtrent cirkelrund Form og ligger midt i det første Dalsving, er der ikke iagttaget noget ordentligt Profil. Kun i en ikke synderlig dyb, tilgroet Grav ved Syd-siden af Landevejen og 250 M. Øst for Holmegaard kunde det endnu ses, at Jordbunden bestod af lignende groft Grus. Derimod fandtes der i det følgende Terrassestykke en smuk Grav 350 M. Vest for Nybro. Gruset var her lidt finere end ved Kirial. Det bestod ligesom dér for en stor Del af Flint og Kalksten, men indeholdt dog flere fremmede Blokke; tillige fandtes der mere fint Materiale imellem Stenene. Gruset gik her op til en Højde af ca. 35 Fod (11 M.) og havde en Mægtighed af omkring 3 M. Det hvilede paa faststaaende Kalk, som stak frem i Bunden af Graven og viste en smuk vand-slidt Overflade med svagt Fald i østlig Retning.

Det vil være fremgaaet af det foregaaende, at det omtalte Grus fremtræder som en udpræget Smeltevandssdannelse, der er aflejret af et Vandløb, som forlod Isranden omtrent ved Kirial for igennem den skildrede Dal at løbe nordpaa. Grusaflejringen falder nemlig tydeligt i denne Retning, og Faldet er paa den Strækning, Gruset kan følges, inden det forsvinder ned under Tørven i Dalbunden, knap 20 Fod (6 M.) paa $3\frac{1}{2}$ Km. eller ca. 1:600.

Til Slutning skal der endnu gives et Par Tal, som ikke blot viser, hvor usædvanlig rig paa Kalksten denne Aflejring er, men ogsaa hvor hurtigt Kalkmængden aftager, naar man følger Gruset fra Isranden udad. Efter Opgivelse fra Arbejderne kan man ved Kirial fra 3 Kubikfavne Grus sortere 1 Kubikfavn Kalksten, medens man i Graven ved Nybro ifølge Ejerens Udsagn maa regne med 4 Kubikfavne Grus til 1 Kubikfavn Kalksten. Langt mere iøjnefaldende er Kalkens Aftagen dog, naar man i Stedet for at regne med de store Sten ser paa det finere Materiale imellem disse. I en Prøve af det sparsomme Sand og Kalkstøv, som fandtes imellem de tætpakkede Sten i den store Grav ved Kirial, har jeg saaledes fundet 29,4 % kulsur Kalk. I det i betydeligt større Mængde forekommende fine Grus imellem Stenene i Graven ved Nybro gav Analysen derimod kun 10,1 % kulsur Kalk.¹⁾

Man ser, at Kalkmængden paa den korte Strækning af $3\frac{1}{2}$ Km., der er Afstanden imellem de to Profiler, regnet langs med Dalens Midtlinje, ikke blot aftager stærkt, men at dette i særlig høj Grad

¹⁾ Analyserne er foretagne paa sigtede Prøver med en Kornstørrelse under 2 Mm. De er udførte ved Hjælp af SCHEIBLER'S Apparat, og hele den fundne Kulsyremængde er beregnet paa kulsur Kalk.

gælder for de fine Korn, hvis relativt store Overflade byder flere Angrebspunkter for Slid og Opløsning. Dette sidste Forhold kommer maaske endnu tydeligere frem, hvis man beregner Kalkmængdens Formindskelse i Procent af det oprindelige Kalkindhold. Mængden af Kalksten, der er saa store, at de kan anvendes til Kalkbrænding, aftager saaledes paa den nævnte Strækning med 25 %, medens Indholdet af kulsur Kalk i Korn, der er mindre end 2 Mm., samtidig falder med 65 %.

Israndens Stilling. Smeltevandsgruset ved Kirial betegner et Sted, hvor et forholdsvis betydeligt Vandløb har forladt Isranden, og følgende maa ogsaa denne til en Tid have staaet her. Spørgsmaalet om, hvorvidt det drejer sig om den samme Is, foran hvilken Hoed Egnens mægtige Grusaflejringer dannedes, synes at maatte besvares bekræftende. Thi, som det er nævnt, maa Kolindsund, fra hvilket det sydligste af Gruset ved Kirial kun adskilles ved et ikke 1 Km. bredt Bakkeparti, have været isspærret, og man maa antage, at det er selve Indlandsisen, der fra Kattegat er trængt et Stykke ind i denne Lavning. Intet er da naturligere, end at Isen ogsaa har strakt sig et Stykke op over Terrainet Nordvest for Grenaa, og at det er foran denne Is, at Gruset ved Kirial er aflejret.

At bestemme Ydergrænsen for Udbredelsen af denne Del af Isen lader sig ikke gøre med samme Nøjagtighed som i den sydlige Del af Grenaa Halvøen, thi ingen særlige Overfladeformer synes at være knyttede til det rimeligvis kortvarige Ophold af Isranden i denne Egn. I det følgende skal der dog angives en Linje, som man efter de foreliggende Kendsgerninger maa formode omtrent betegner Grænsen for Isens Udbredelse.

Fra Landsbyen Højbjerg maa Israndslinjen antages at strække sig imod Nordvest for at gaa over Kolindsund noget Vest for Enslev. Derefter bøjer den atter tilbage imod NNØ. og gaar forbi den øverste Ende af Smeltevandsaflejringen ved Kirial rimeligvis langs med Østsiden af Thorsø Høje ud til Gjerild Bugt.

At denne Linje omtrent betegner Israndens Beliggenhed, fremgaar ikke blot af Forekomsten af Smeltevandsgruset ved Kirial, men den Omstændighed, at Smeltevandet herfra har kunnet løbe nordpaa til Havet, udelukker, at Isranden atter kan have bøjet vestpaa, da den i saa Fald vilde have spærret for Afløbet igennem Veggervad Aa's Dal. At Isen paa den anden Side er naaet omtrent helt frem til denne Dal, er der flere Ting, der tyder paa, saaledes det flade og frugtbare Morænelerterrain, der findes i Egnen omkring Voldby, og som danner en skarp Modsætning til det sandede Terrain paa Pla-

teauet Vest for Dalen. Endvidere peger endnu en lille Grusforekomst i den samme Retning. Man finder nemlig paa det Sted, hvor Veggerslev Aa's Dal munder ud i det lave Terrain Syd for Gjerild, en Aflejring af rullet Grus, der støtter sig til den sydfor liggende, lidt højere Moræneflade, og som fremtræder som en langstrakt, ganske flad Grusbanke, hvorpaa Landsbyen Veggerslev ligger. I en stor Grav ved Landevejen fra denne By nordpaa kan man se, at Jordbunden bestaar af groft, vandret lagdelt, rullet Grus, der minder meget om den ovenfor omtalte Forekomst ved Nybro. Kun findes der her langt færre Kalksten, medens Kalkmængden i det fine Materiale imellem Stenene er omtrent den samme, idet en Analyse paa Korn mindre end 2 Mm. gav $8,5\%$ kulsur Kalk. Dette sidste Forhold og tillige det, at Gruset her gaar op til samme Højde som ved Nybro, nemlig til omtrent 35 Fod (11 M.), taler imod, at det her drejer sig om en direkte Fortsættelse af Kirial Aflejringen. Gruset ved Veggerslev maa saaledes snarere betragtes som en selvstændig lille Smeltevands-aflejring, afsat umiddelbart foran Isranden, og det antyder derfor, at denne har staaet frem helt hertil.

Gruset ved Veggerslev synes at fortsætte sig over det nordøstligere flade Terrain, som i Skoven Syd for Vibkjær hæver sig til godt 25 Fod (8 M.). Endvidere skal der gøres opmærksom paa, at Overfladen ved Nordvestenden af Karlby Klint paa et mindre Areal ligeledes dækkes af rullet Grus med en Højde af indtil 31 Fod (10 M.). Det staar ikke i Forbindelse med Gruset ved Veggerslev, og det adskiller sig ogsaa fra dette ved at være betydeligt rigere paa Kalksten. I Karlby Klint er der Profil i denne lille Aflejring. I den nordvestlige Ende af Klinten falder Kalkoverfladen, og Kalken dækkes her af et Lag Moræneler, over hvilket Gruset findes. Paa et Sted, hvor Klinten stod ren, iagttoges følgende Profil. Over $2\frac{1}{2}$ M. Kalk i Klintens Fod fandtes 3 M. Moræneler med Sandstriber og vandret Bænkning og derover 3 M. groft, rullet Grus. Denne ganske vist kun ubetydelige Grusaflejring kan maaske ogsaa sættes i Forbindelse med Israndens Ophold i denne Egn, men iøvrigt er det ikke umuligt, at Isen en Tid har spærret Lavningen Sydøst for Gjerild og tvunget Smeltevandet til at løbe ud igennem den lille Dal, hvori Benzon ligger, og hvis sandede Bund hæver sig til godt 30 Fod (10 M.).

En Udbredelse af Isen som den i det foregaaende antydede stemmer godt overens med den af USSING og RAVN i 1896 gjorte Skurestribeagttagelse i Brædstrup Klint Nord for Grenaa Havn¹⁾. Her

¹⁾ BØGGILD, O. B. 1899. Om Skurestriber i Danmark og beslægtede Fænomener. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening, Nr. 5, S. 93.

USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2. S. 107.

fandtes i en Højde af 12 M. over Havet Striber, hvis Gennemsnitsretning var S. 53° Ø.—N. 53° V.

Ved Gjerild Bugt naaede Isranden ud til Kattegat, og den maa antages at have fortsat sig videre i nordlig eller nordøstlig Retning. Thi ikke blot viser Udløbet af de store Smeltevandsfloder ved Munden af Randers Fjord, at der her var fri Forbindelse med Havet, men den Omstændighed, at det fra Kirial kommende Smeltevand kunde slippe ud ved at løbe nordpaa, angiver yderligere, at Isranden ikke engang har udbredt sig over Omraadet umiddelbart Nord for Grenaa Halvøen.

Isranden har altsaa staaet ud i Havet, og man faar herigennem Forklaringen paa den iøjnefaldende hurtige Tilbagerykning af Isen længst imod Øst. Foruden Svindet ved normal Afsmeltning har her nemlig kunnet bortføres en Del i Form af Isbjerger, og tillige har Berøringen med det salte Vand naturligt bevirket en meget forøget Afsmeltning. Et godt Begreb om denne sidste Faktors meget store Betydning faar man gennem K. J. V. STEENSTRUP's direkte Bestemmelser af Vægttabet for Gletscheris, nedsænket i Havvand ved forskellige Temperaturer. Selv ved en saa lav Vandtemperatur som $\div 1,3^{\circ}$ C. bestemtes en Afsmeltning paa $1-2\%$ pr. Time. Et andet Forsøg ved en højere Temperatur viste f. Eks., at en Isblok paa 16 Pund (8 Kg.) kun behøvede ca. 1 Time for at opløses fuldstændigt i Havvand, der havde en Temperatur af $+4,6^{\circ}$ C.¹⁾.

Man forstaar saaledes, at Isranden, saa snart der kunde spores en Nedgang i Tilførslen af Is, har begyndt at trække sig meget hurtigt tilbage i Kattegat, medens den endnu en Tid lang kunde forblive stationær inde i Jydland. At denne hurtige Afsmeltning ogsaa maatte spores i den tilstødende Del af Landomraadet er tydeligt, og dette forklarer Forekomsten af de forskellige bagved hinanden liggende Israndslinjer i den østlige Del af Grenaa Halvøen, Linjer, der alle konvergerer imod Vest for at samles til en enkelt, som ned igennem Jydland betegner den Stilling, ved hvilken Isranden har opholdt sig i hele det her omhandlede Tidsrum.

5. Fortsættelsen af Første Terrasse imod Nordvest.

I de foregaaende Afsnit er der gjort Rede for, paa hvilke Steder der er strømmet Smeltevand ud fra Isranden i den østlige Del af Grenaa Halvøen; men for den største af Smeltevandsflodernes Ved-

²⁾ STEENSTRUP, K. J. V. 1883. Bidrag til Kjendskab til Bræerne og Bræ-Isen i Nord-Grønland. Meddelelser om Grønland. IV. S. 98—100 og 103. (Særtryk 1882).

kommende er Undersøgelsen for saa vidt ikke afsluttet, som der tidligere kun er gjort Rede for dens forskellige Aflejninger i Nærheden af det Sted, hvor den forlod Isen, medens dens videre Løb ud imod Havet endnu ikke er behandlet. Der foreligger altsaa nu den Opgave, at følge det fra Hoed Egnen kommende Smeltevand paa dets Vej igennem Grenaa Halvøen imod Nordvest til Havet ved Randers Fjords Munding.

Udbredelse. Ser man først paa den ældste af denne Smeltevandsflods Aflejninger, der fra Terrainet Sydvest for Hoed strækker sig Syd om Attrup-Horstved Højdepartierne, og som tidligere er kaldet Første Terrasse, da er denne Smeltevandsaflejring hidtil kun fulgt til den Dal, der gennemløbes af Buktrup Bæk og Maarup Aa's nedre Løb. Denne Dal overskærer Smeltevandsaflejringen paa tværs og danner for saa vidt en Grænse, som man paa den anden Side af den ikke længere træffer en jævn og uafbrudt Terrasseflade, men kun isolerede Terrasserester, der fremtræder som større og mindre Plateauer i Reglen med ganske flad Overflade og stejlt Affald ned mod de mellemliggende Flader og større og mindre Erosionsrender, der gennemskærer Terrassen i forskellige Retninger, og i hvilke der ofte findes yngre Smeltevandsaflejninger.

Dette sønderdelte Terrasselandskab findes i Egnen Syd for Ryom Gaard. Det begrænses imod Nord af den stejle Erosionsskraaning, der danner Affaldet fra Grenaa Halvøens nordlige Plateauland, og som er en Fortsættelse af Kolindsunds Nordskraaning. Imod Syd gaar det ind imod Morænedannelserne udenom Kalvø Vig, og Sydgrænsen for den Aflejring, som her hører til Første Terrasse er den paa Kortet tegnede yderste Israndslinje, der netop er trukket paa Grundlag af det højtliggende Smeltevandssands Udbredelse. Ligesom denne Del af Smeltevandsaflejringen fremtræder som en direkte Fortsættelse af den sydøstligere Tistrup Hedeslette, saaledes gaar den videre imod Nordvest igennem i den store Dal, hvori Skafø Gaard og Gl. Estrup ligger, og fortsætter sig her som store Sandflader paa begge Sider af Dalen.

Indenfor dette Omraade kan dog ikke engang alt det Sand, der nu rager op igennem de alluviale Dannelser, henregnes til den oprindelige Terrasse. I Virkeligheden forekommer der ogsaa her yngre og lavere liggende Smeltevandsdannelser, og kun den højeste og ældste Sandaflejring danner en direkte Fortsættelse af Aflejringen i Første Terrasse længere østpaa. Af de Sandpartier, hvis Dannelse maa henføres til dette Tidspunkt, er der mest bevaret i Terrainet straks Nordvest for Buktrup Bæk. De større og mindre Fladestykker her fort-

sættes imod Nordvest i et større, samlet Parti Syd for Dalen ved Ryom Gaard. Syd for dette findes nogle mindre, isolerede Terrasse-rester. En noget større Flade træffer man Nord for Thorsager og en lignende Nordvest herfor omkring Grethbjerg. Endvidere maa de store Sandflader i Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen henregnes til disse Dannelser.

Overfladeform. Naar man betragter det her omhandlede Terrain, er Fladekarakteren kun lidet fremtrædende, fordi det hele som sagt opløser sig i større og mindre Partier, adskilte ved tørvefyldte Lavninger og yngre Dale, samt ogsaa fordi Fladen paa forskellige Steder brydes af smaa Bakkeøer, der rager op igennem Smeltevandssaflejringer. I det hele taget minder dette Terrain en Del om den af USSING beskrevne Hjelmhede SSV. for Skive¹⁾, kun synes de for denne Egn saa karakteristiske Jordfaldshuller at mangle her. En nøjere Undersøgelse viser dog, at man ogsaa her træffer lignende Dannelser, selv om Hullerne er meget fladere og mindre dybe end i Hjelmhede Terrassen. Navnlig i Egnen omkring Skarresø og Astrup forekommer saadanne Huller ret rigeligt og smukt udviklede.

I det citerede Arbejde tyder USSING Hjelmhedes dybe Huller som fremkomne ved, at Isen under sin Afsmeltning efterlod isolerede Isklumper, som derefter indesluttedes i Smeltevandets Sandaflejringer og ved senere Bortsmelten gav Anledning til „Jordfald“. Denne Forklaring synes ogsaa at kunne anvendes paa Hullerne i det her betragtede Terrain. Kun forekommer det lidet sandsynligt, at de enkelte Isklumper er efterladte paa det Sted, hvor de er blevne indesluttet i Sandet, af en tilbagesmeltende Is, da den her betragtede Is næppe har været nævneværdigt længere fremme end ved den Stilling, der i det foregaaende er betegnet som den yderste Israndslinje. At der forekommer Huller som de omtalte, synes i alle Tilfælde for lidt til at bygge en saadan Antagelse paa, da der i det øvrige Terrain udenfor den angivne Israndslinje ikke noget Sted er truffet Forhold, der kunde tyde paa en mere fremskudt Stilling af Isranden. I et fladt og aabent Terrain som dette er det vel heller ikke sandsynligt, at der kan have være bevaret „døde“ Ispartier fra en tidligere Isdækning, saaledes som man maa antage, at det har været Tilfældet i de dybe Dale, som findes i Silkeborg Egnen. Højest kunde dette maaske gælde for Kolindsunds Vedkommende. Men en anden Forklaring er i Virkeligheden ikke utænkelig. Det her betragtede

¹⁾ USSING, N. V. 1903. Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse. Vidensk. Selsk. Overs. 1903. Nr. 2. S. 129 og 145—152.

Terrain ligger saa lavt, at det er meget sandsynligt, at der, da Sandaflejringen paabegyndtes, har staaet Vand her. Intet er da rimeligere, end at der i dette Vand har sejlet større og mindre Isklumper, der, naar de stødte paa Grund, blev liggende og efterhaanden blev omgivne og helt indesluttede af Sand, hvorefter der paa dette Tidspunkt tilførtes en rigelig Mængde østfra. For denne Forklarings Rigtighed taler Hullernes ringe Dybde i Forhold til Dybden af Huller med samme Diameter i Hjelmhede Terrassen. Det har nemlig kun været temmelig flade Isstykker, der kunde transporteres paa den nævnte Maade. Ogsaa et andet Forhold taler for den fremsatte Formodning; ingen af de omtalte Huller findes i Nærheden af de smaa „Bakkeøer“, der rager op igennem Terrassefladen; med andre Ord, de findes ikke dér, hvor den oprindelige Overflade hæver sig og saaledes har hindret en Tilførsel af Is paa den antydede Maade.

Blandt de Ting, som ogsaa bidrager til at udviske Fladekarakteren, er de nævnte, smaa Toppe af det ældre, underliggende Terrain, der paa en Del Steder rager op igennem Smeltevandsaflejringen, og som saaledes fremtræder som smaa Bakkeøer. De største og mest iøjnefaldende af disse er den 102 Fod (32 M.) høje Højskov Bakke ØSØ. for Ebdrup, et større Parti, hvis højeste Punkt Knudshøj VNV. for Thorsager naar 143 Fod (45 M.) (dette støder dog saa godt som sammen med Morænelandskabet sydfor), og Grethbjerg paa 96 Fod (30 M.) Nord for Knudshøj. Disse Toppe af det underliggende Terrain bestaar i Reglen af Moræneler, selv om Overfladen som oftest er sandet, antagelig paa Grund af et tyndt Dække af Flyvesand. I Højskov Bakke er der saaledes iagttaget to Profiler i Moræneler og i Knudshøj Partiet ligeledes to. I Grethbjerg fandtes et Profil i Moræneler og i den østlige Ende desuden et lille Profil i Morænesand over fluvio-glacialt Sand og Grus med forstyrret Lagdeling. Foruden de nævnte, lidt større Bakkeøer findes der rundt omkring i Terrainet og navnlig i Egnen nærmest omkring Højskov Bakke en Del ganske smaa og kun lave Forhøjninger, hvori man ogsaa maa antage, at lignende Dannelser staar frem.

Højdeforhold. Selv om den her betragtede Del af Første Terrasse nu kun fremtræder som spredte Rester af den oprindelige Flade, er det dog endnu muligt igennem Aflejringens Fald at se, hvilken Vej Smeltevandet er løbet. De laveste herhen hørende Terrassestykker træffer man længst imod Nordvest ved Indgangen til Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen, og det fremgaar altsaa heraf, at Vandet er løbet til denne Dal.

Terrasseoverfladen falder dog ikke direkte fra Sydøst—Nordvest,

thi ligesom det var Tilfældet paa Tistrup Hedesletten, tiltager ogsaa her Højden noget imod Syd, idet der foran den sydfør staaende Isrand er afsat Materiale af lokalt Smeltevand. I et Terrain som dette, hvor hele Terrasseoverfladen er opløst i større og mindre isolerede Partier, og hvor navnlig den sydligste Del paa store Strækninger mangler, er det dog vanskeligt at skaffe sig et Overblik over disse lokale Forhold og paa Grundlag af Terrainhøjden at afgøre, paa hvilke Punkter der navnlig er strømmet Smeltevand til fra den sydfør staaende Isrand. Kun ser man i det store og hele, at man i Linjer tværs over Smeltevandsaflejringen har de største Højder ved Israndslinjen imod Syd, medens de laveste og mere regelmæssige Dele findes imod Nord ganske som i det sydøstligere Terrain. Et Par Eksempler vil maaske bedst vise dette. Gaar man saaledes fra Kolind til Rostved, passerer man tværs over Aflejringen ind imod Israndslinjen. I Terrainet Sydvest for Kolind kommer man over et fladt, temmelig stort, sammenhængende Terrassestykke, hvis Højde er lidt under 60 Fod (19 M.), men allerede ved Østsiden af Højskov Bakke gaar Smeltevandssandet op til ca. 70 Fod (22 M.). Videre sydpaa tiltager Højden yderligere, til den umiddelbart udenfor Israndslinjen Nordøst for Rostved endog naar op til 98 Fod (31 M.). Ganske lignende er Forholdene længere imod Nordvest, rent bortset fra, at den absolute Højde naturligvis bliver noget mindre i denne Retning, efterhaanden som man kommer længere nedad Smeltevandsaflejringen. Medens saaledes Højden af den udprægede Flade ved Mesballe er omtrent 50 Fod (16 M.), stiger Smeltevandssandet imod Sydvest til ca. 70 Fod (22 M.) ved Nordøstsiden af Knudshøj Partiet.

Man ser, at Stigningen i den sydlige Del af Smeltevandsaflejringen kan være forholdsvis stor; men dette kan maaske ogsaa delvis begrundes ved, at Aflejringen af Sand foran Isranden endnu er vedblevet en Tid, efter at Hovedtilførslen af Smeltevand fra Sydøst var ophørt og Dannelsen af den egentlige Terrasse saaledes afsluttet.

Derimod er Faldet i Aflejringens Længderetning kun ringe, saaledes i den nordlige og regelmæssigere Del af Terrassen ikke over 1:1200, idet Højden aftager fra ca. 60 Fod (19 M.) til ca. 40 Fod (13 M.) fra Buktrup Bæk til Begyndelsen af Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen.

Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen. Endnu skal der kun siges et Par Ord om det sidste Stykke af Smeltevandets Vej ud imod Havet. Fra den i det nærmest foregaaende skildrede Egn løb Vandet, saaledes som det er vist, imod Nordvest; videre fremad bøjede det i mere nordlig Retning, idet Floden nu fulgte et af Danmarks største Dalstrøg, nemlig

den brede Dal, hvori Skafø Gaard og Gl. Estrup ligger. Længst imod Syd har denne Dal en Bredde af indtil $3\frac{1}{2}$ Km., men længere nordpaa indsnævres den i Egnen Nord for Gl. Estrup til 2 Km. og forener sig derefter ved Allingaabro med den Forgrening af Randers Fjords Dalgang, der over Grund Fjord strækker sig først imod Øst og derefter imod Nordøst til Kattegat.

Ud igennem Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen strækker Fortsættelsen af Første Terrasse sig med stadigt aftagende Højde. Ved Dalens Begyndelse træffer man saaledes i Terrainet omkring Skafø Gaard store Sandpartier paa omkring 40 Fod (13 M.), og noget længere nede ad Dalen ligger der paa den modsatte Side i Egnen Syd for Avning, en stor, men lidt lavere Sandflade. Efterhaanden aftager Højden dog saa meget, at Terrassen mere og mere forsvinder ned under de yngre, alluviale Flader.

Allerede den betydelige Størrelse af denne Dal lader formode, at dens Dannelse ligger forud for den Tid, da den maatte tjene til Bortledning af det fra Hoed Egnen kommende Smeltevand, og overensstemmende hermed synes der at forekomme Rester af en gammel Terrasse med betydeligt større Højde end de nævnte Sandflader. Omkring den Pynt, der gaar ud i Dalen lige Vest for Gl. Estrup, findes der saaledes en Sandterrasse, som i alle Tilfælde paa Øst- og Sydsiden gaar op til omtrent 90 Fod (28 M.). Sandet i denne Terrasse viser vandret Lagdeling, medens der i det højere Terrain findes Moræneler og noget fluvioglacialt Sand og Grus med forstyrret Lagdeling. Desuden skal der gøres opmærksom paa det høje, terrasselignende Parti ved Pindstrup længere imod Sydøst i Dalen, da dette synes at være en lignende Dannelse.

6. Yngre Smeltevandsdannelser i Egnen Syd for Ryom Gaard.

Hovedtrækkene i Udviklingen. Den i det foregaaende omtalte, højeste Smeltevandsaflejring i Terrainet Syd for Ryom Gaard maa antages i Hovedsagen at være afsat af det østfra kommende Smeltevand, selv om mindre Mængder af Materialet er tilført fra den sydfor staaende Isrand. Det var derfor en stor og gennemgribende Forandrung, der skete, da Afløbet igennem Hoed-Hallendrup Dalen aabnedes, og Hovedmængden af Smeltevandet saaledes bortlededes ad anden Vej.

I det mindste i den første Del af den følgende Tid løb Smeltevandet, som det tidligere er nævnt, endnu imod Vest til Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen. Det nedgravede en lidt lavere Dal forbi Ryom

Gaard langs med Nordsiden af den ovenfor skildrede Del af Første Terrasse, og det er sandsynligt, at det ogsaa har givet Anledning til Dannelsen af en lavere liggende Flodslette ud igennem Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen, men denne ligger nu skjult under det yngre, alluviale Dække.

Ogsaa efter Aabningen af den nye Vej igennem Hoed-Hallendrup Dalen maa man antage, at den sydlige Isrand endnu i nogen Tid er bleven staaende ved den paa Kortet angivne yderste Stilling, og Aflejringen af Materiale af lokalt Smeltevand lige foran denne Isrand er vel nok vedblevet ovenpaa den høje Terrasseflade og langs med dennes Sydrand. Men længere borte fra Isranden har der samlet sig Vandløb, som efterhaanden gravede sig Smaadale ned i Første Terrasse, svarende til det nu sænkede Afløb langs med dennes Nordside, og saaledes paabegyndtes Sønderdelingen af den oprindelige Sandflade. Da Vejen igennem Kolindsund senere aabnedes, gav dette endnu lavere Afløb Anledning til en betydelig Erosion ind i Første Terrasse med Udgangspunkt fra Vestenden af Kolindsund, og herved fremskyndedes Ødelæggelsen af Terrassefladen.

En yderligere Forandring skete ved, at Isranden trak sig tilbage fra den yderste Stilling til de sydligere liggende Randmoræner, og det fra Isen kommende lokale Smeltevand aflejrede nu sit medførte Materiale over en Del af det herved friblevne, lave Terrain og i de nydannede Smaadale i Første Terrasse samt udvidede og uddybede disse.

Udviklingen førte saaledes med sig, at der i det her betragtede Terrain efterhaanden opstod et helt System af lavere liggende Smeltevandsdannelser, som findes dels imellem og paa Siderne af de isole-rede Partier af den oprindelige Terrasseflade og dels bagved den yderste Israndslinje. Disse Dannelser er for en Del samtidige med de lavest liggende af de østligere Aflejringer, som tidligere er sammenfattede under Betegnelsen Anden Terrasse, men for en Del muligvis ogsaa yngre. Det er dog ikke lykkedes her at gennemføre en Adskillelse i to eller flere forskellige Horisonter, og det er slet ikke sikkert, at en saadan skarp Adskillelse vil kunne lade sig udføre, selv om man muligvis kunde vente at finde en tydelig Højdeforskel mellem Aflejringer fra den Tid, da Vandet endnu løb til Skafø Gaard-Gl. Estrup Dalen og saadanne, som først er opstaaede, efter at Vejen igennem Kolindsund var aabnet. Medens man paa Grundlag af Højdeforholdene med Sikkerhed kan afgøre, hvilke Dele af Sandfladen, der hører til det højest liggende Sand og saaledes maa henregnes til Første Terrasse, synes det yngre Sand vel at forekomme paa noget forskellige Højder svarende til, at de forskellige Partier heraf ikke er fuldt samtidige, men man staar her sandsynligvis over-

for Aflejninger, der danner en jævn Overgang fra ældre til yngre Dannelser. Højden af hvert enkelt Parti er da betinget af det Niveau, Erosionen var naaet ned til paa det Tidspunkt, da det paa-gældende Sandparti dannedes. Endnu mere indviklet bliver det hele ved, at Sandaflejningerne paa Grund af den senere betydelige Erosion ligger temmelig spredte, og det er derfor betydelige Vanskeligheder, der rejser sig, naar man vil søge at følge Udviklingen af dette ejendommelige Terrain. Hovedtrækkene i denne Udvikling turde dog fremgaa af det sagte, men Udredningen af alle Enkelthederne heri vilde kræve et langt større og mere detailleret Arbejde i Marken, end jeg har haft Lejlighed til at udføre. Jeg skal derfor i det følgende indskrænke mig til Omtalen af nogle Forhold, som kan tjene til Belysning af enkelte Punkter og, i det mindste delvis, begrunde de fremsatte Anskuelser.

Afløb imod Nordvest. Da det fra Hoed Egnen kommende Smeltevand banede sig Vej igennem Hoed-Hallendrup Dalen til Vestenden af Kolindsund, var Afløbet østpaa igennem dette spærret, og Vandet blev saaledes tvunget til endnu en Tid at søge ud igennem Skafo Gaard-Gl. Estrup Dalen. Det fulgte da naturligt den laveste forhaandenværende Vej, nemlig den nordligste Del af den umiddelbart i Forvejen dannede Smeltevandsaflejring i Egnen Syd for Ryom Gaard. Efterhaanden udgravede det her paa Grænsen imellem den ældre Terrasse og det nordfor liggende Højland den Dal, som nu gennemløbes af Ryom Aa i modsat Retning af den gamle Smeltevandsflod. Ikke blot denne Dals forholdsvis betydelige Størrelse tyder paa en saadan Dannelsesmaade, men langs med dens Nordside finder man endnu som Rest fra hin Tid næsten hele Vejen en smal Terrassebræmme, opbygget af fint Grus.

Videre fremad fulgte Smeltevandsfloden Skafo Gaard-Gl. Estrup Dalen, hvor den ogsaa efterhaanden maa have gravet sig noget ned i den oprindelige Aflejring. Man finder dog nu ingen yngre Terrasse svarende hertil, da Alluviet i Bunden af Dalen gaar op til omtrent samme Niveau som den ældre og højere Smeltevandsaflejring, ja noget nordpaa endog dækker hele Dalbunden, men Fordelingen af Tørv og Sand antyder, at Floden paa det her betragtede Tidspunkt har haft et mere retlinjet Forløb end tidligere. Paa Tavle V, Fig. 1—2 er det forsøgt at fremstille dette Forhold. Det skal dog fremhæves, at naar der paa disse Kort er angivet et forskelligt Løb af Smeltevandsflodens nederste Del (nedenfor Gl. Estrup) til de forskellige Tider, er dette gjort paa et usikkert Grundlag, idet der ikke findes noget Spor af Terrasser paa saa lavt Niveau. Det er kun Meningen

hermed at antyde, at det muligvis er den senglaciale Gudenaas Erosion, som efterhaanden har sænket Bunden i Nabodalen saa meget, at der igennem den kunde opstaa et lavere Afløb, som vilde give Anledning til en Erosion ned i den allerede dannede, ældste Smeltevandsaflejring i Grenaa Halvøen.

Samtidig med, at Hovedvandløbet endnu fulgte Skafo Gaard-Gl. Estrup Dalen, maatte selvfølgelig ogsaa det Smeltevand, der over Første Terrasse kom fra den sydfor staaende Isrand, søge denne Vej ud, og efterhaanden som Hovedfloden gravede sig dybere ned, begyndte der da at dannes nogle imod Nordvest rettede Smaadale i Første Terrasse, og ogsaa deres Tilstedeværelse taler stærkt for, at Afvandingen endnu en Tid er sket i den angivne Retning. Saaledes vender en lille Erosionsrende Sydvest for Mesballe tydeligt imod Nordvest, men klarest viser en lang, næsten retlinjet Dal det. Den løber i Sydøst—Nordvest og begynder som en Lavning i Første Terrasse Vest for Stabrand. Allerede inden den naar den Dal, hvori Buktrup Bæk løber, fremtræder den som en temmelig dyb Erosionskløft, hvori der endnu den Dag i Dag løber et lille Vandløb. Paa den anden Side af den nævnte Dal fortsættes den imod Nordvest helt til Ryom Aas Dal, men overskæres ogsaa her paa flere Steder af yngre Dale. Kun paa et Stykke af hele denne Strækning løber der nu Vand i Dalen, idet Korup Aa og et lille Tilløb til den benytter et Stykke af den, medens Korup Aa ellers løber igennem et Par af de yngre Dale.

Den her omtalte Dal støder under en spids Vinkel til Ryom Aas Dal, og ikke alene den Maade, de to Dale støder sammen paa, men ogsaa den Omstændighed, at den sidstnævnte Dal breder sig betydeligt Vest for Samlingspunktet, viser, at Vandet i denne oprindelig har løbet vestpaa. Ryom Aas Dal er f. Eks. ved Ryom Gaard dobbelt saa bred som godt 3 Km. længere imod Øst.

Afløb igennem Kolindsund. Paa et senere Tidspunkt hævedes Spærringen af Kolindsund, og det er som nævnt sandsynligt, at det er sket saa tidligt, at Hoed-Hallendrup Dalens Vandmasser ogsaa en Tid har kunnet benytte denne Vej, saa at Afvandingen kunde ske paa den i Fig. 3 paa Tavle V antydede Maade.

For den her betragtede Egns Vedkommende betød denne Forandring en yderligere Sænkning af Erosionsniveauet, og begunstiget heraf gravede efterhaanden flere smaa Vandløb sig fra Kolindsund Siden op i de tidligere dannede Smeltevandsaflejringer. De havde alle deres Udgangspunkt i Vestenden af Kolindsund, og man ser nu, hvorledes et helt Bundt af Smaadale ligesom straalere ud fra dette

Punkt. Efterhaanden overtog disse nye Vandløb Afvandingen af et større og større Stykke af Terrassen, idet de strakte deres Dale længere og længere ind i denne samt gravede dem dybere og udvidede dem.

Det er interessant at se, hvorledes disse Dale har udviklet sig ganske uafhængigt af de lidt ældre, imod Nordvest rettede Smaadale, som de ligefrem overskærer, saa at man i Terrainet Sydvest for Kolind nu træffer to Systemer af Smaadale, som krydser hinanden under næsten rette Vinkler. Denne sidste Daldannelse har saaledes ogsaa bidraget sit til Opløsningen af den oprindelig flade og sammenhængende Sandslette i spredte, isolerede Partier.

Jordfaldshuller. En anden Faktor har maaske ogsaa gjort sig gældende ved denne Sønderdeling af Smeltevandsaflejringen, nemlig Bortsmelten af i Sandet indesluttede Ismasser. Det er allerede tidligere omtalt (S. 211—212), at man maa formode, at der virkelig har ligget saadanne „døde“ Ismasser begravede i Sandet, og det er nærmere udviklet, hvorledes man maa tænke sig, at disse Isklumper er blevne indlejrede i Terrassen paa et Tidspunkt, da Tilførslen af Sand netop var særlig stor. Efterhaanden som den døde Is smeltede, skete der Indstyrtninger i Sandlagene, og Overfladen sænkedes.

Det er sandsynligt, at flere af de lavere liggende Sandflader netop er afsatte paa Steder, hvor der har ligget større Flager af saadan død Is, og at den ny Tilsanding først har fundet Sted, efter at denne Is var helt eller delvis smeltet. I alle Tilfælde optræder Jordfaldshullerne hyppigst i de lavere Sandflader, og det er, som om disse ofte omgiver de større Huller, der da skulde betegne de Steder, hvor de sidste Rester af større Isflager har ligget den Gang, da Sandet i den omgivende, yngre Terrasseflade aflejredes. En saadan Dannelsesmaade synes ikke usandsynlig f. Eks. for det store Hul, som ligger lige Nord for Astrup, og det lavere liggende Sand, der slutter sig hertil. Dette Sand findes navnlig Nord for Hullet, men strækker sig dog ned paa begge Sider af det; i større Omkreds omgives saa det hele af isolerede Partier af Første Terrasse.

Smeltevandsaflejringer bagved den yderste Israndslinje. Efterhaanden som Sønderdelingen af den oprindelige Sandflade saaledes skred fremad, trak den sydfor staaende Isrand sig tilbage fra den paa Kortet angivne yderste Stilling til de bagved liggende Randmoræner. Dette kan næppe have fundet Sted, førend Afløbet igennem Kolindsund var bleven aabnet, og det er endog sandsynligt, at det først er

sket, efter at den østlige Del af Isen havde trukket sig saa langt tilbage, at den store Smeltevandssflod maatte løbe direkte ud i Havet, saaledes som det er antydnet paa Tavle V, Fig. 4.

Medens Isranden stod ved Kalvø Vig Buens Randmoræner, har Isen ogsaa afgivet noget Smeltevand, der har afsat Sand umiddelbart foran Randmorænerne. Den hertil hørende Terrasseflade er smukkest udviklet ud for Mundingen af den Dal, hvorfra Dibbelbæk kommer. Sandet gaar her op til ca. 70 Fod (22 M.), og det strækker sig et Stykke ind i Dibbelbæks Dal. Tilførslen af Smeltevandet er sikkert i Hovedsagen sket herigennem, idet der inde under Isen har samlet sig et lille Vandløb i dette lave Strøg. Antagelig har dette Vandløb eroderet i Dalen, og denne bør derfor nærmest betegnes som en lille subglacial Dal.

Indenfor det nævnte Terrassestykke findes der ogsaa flere, endog forholdsvis dybe Jordfaldshuller, hvis Oprindelse man maa antage er fuldstændig analog med Dannelsen af Hullerne i Hjelmhede Terrassen.

Hvor vidt det meget store og dybe Hul Korupsø lidt længere imod Øst er dannet paa denne Maade, eller om det bør opfattes som en kæmpemæssig „Jættegryde“, udskyldet af nedstyrtende Smeltevand lige foran Isranden, er et Spørgsmaal, jeg ikke tør udtale mig om. Den store Lavning Nordvest herfor er maaske dannet af Smeltevand fra Isranden og yderligere udvidet ved senere Erosion; men iøvrigt er disse store Fordybninger det ikke mindst uforklarlige i dette ejendommelige Terrain.

7. Smeltevandssøen i Rosenholm Lavningen.

Til Slutning skal der endnu omtales en Dannelse, der staar i Forbindelse med den her betragtede Isrand, og som findes i den vestligste Del af Grenaa Halvøen. Det er en ikke helt ubetydelig Sø, som paa det her betragtede Tidspunkt opstod i det lave Terrain ved Rosenholm for senere at vedblive at eksistere helt ind i den postglaciale Tid.

Det i det foregaaende omtalte Terrasselandskab grænser imod Vest til et højere liggende, jævnt kuperet Morænelerterrain, der fra Vest-siden af Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen strækker sig imod Sydøst helt ind til Randmorænerne ved Mørke, og saaledes adskiller den store Lavning, hvori Rosenholm ligger, fra de østligere Smeltevandsdannelser. Dette Morænelerterrain standser imod Sydvest paa en ret ejendommelig Maade, ved at det paa en Strækning af omtrent 6 Km. staar med en brat Skraaning ned imod Rosenholm Lavningen. Denne

Skraaning er næsten retlinjet og ogsaa derved meget iøjnefaldende i Terrainet. Dens Retning er omtrentlig N. 35° V.—S. 35° Ø.

Paa den modsatte Side begrænses Rosenholm Lavningen af et lignende Morænelersterrein, der stiger langsomt imod Sydvest til betydelige Højder, men som skraaner ganske jævnt ned imod det lange, tørvefyldte Kær.

Imod Sydøst fortsættes Lavningen helt ind til Randmorænerne Sydvest for Mørke, og disse danner i Forbindelse med det bagved liggende Morænelandskab en bred Dæmning imellem Kalvø Vig og Rosenholm Lavningen; man maa antage, at denne Lavning, i Tiden før den her betragtede Is rykkede frem til disse Egne, har været aaben ud imod Kalvø Vig eller i det mindste har haft et Afløb i denne Retning. Først da Isen rykkede frem sydfra, afspærredes Lavningen, og der opdæmmedes en forholdsvis stor Sø, som er bleven staaende ind i den alluviale Tid, idet Isen ved sin Rand har aflejret saa meget Morænemateriale, at dette har kunnet spærre den formede tidligere Forbindelse med Kalvø Vig, ogsaa efter at Isen selv var smeltet bort.

I den Smeltevandssø, der saaledes opstod udenfor Isranden, har Vandstanden været omtrent 70 Fod (22 M.), svarende til Afløbets Højde. Vandet fra Søen søgte ud dér, hvor det omgivende Terrain var lavest, og det dannede her en lille Dal, som gaar fra Skjøring imod Nordvest, og i hvilken der endnu findes Rester af en Terrasse fra denne Tid. Herigennem naaede Vandet ud til Alling Aa's Dal og igennem denne til Skafo Gaard-Gl. Estrup Dalen. Efterhaanden som Afløbet ind i den alluviale Tid gravedes dybere ned, sænkedes Vandspejlet i Søen, og den nuværende Tørveoverflade ligger i den nordlige Ende af Kæret kun paa noget over 40 Fod (13 M.); længere imod Syd gaar Tørven derimod betydeligt højere.

Søen i Rosenholm Lavningen har, medens Isranden stod Syd for den, haft rigeligt Tilløb, idet en Del lokalt Smeltevand har søgt ud i den. Det har medbragt Sand, som det har aflejret i Søen, og man ser nu paa mange Steder saadant senglacialt Ferskvandssand, der som smaa flade Forhøjninger rager op igennem den alluviale Tørveflade.

Der er dog ikke blot kommet Smeltevand fra det Stykke af Isranden, der stod helt ud i Søen og begrænsede denne imod Sydøst, men ogsaa fra den nærmest Sydvest herfor følgende Strækning af Isranden. Foran Randmorænerne dér og skraanende ned imod Lavningen Syd for Rosenholm ligger der nemlig en lille Sandslette, der er opbygget af Smeltevandssand med omtrent vandret Lagdeling, og hvis Overflade er ganske jævn. Faldet indenfor denne Aflejring samt nogle smaa Erosionsrender i den viser tydeligt, at Vandet er løbet imod Nord til Rosenholm Lavningen. Højden er størst længst

imod Sydvest, nemlig ca. 150 Fod (47 M.), og herfra er Faldet ned imod Sølavningen omtrent 1 : 600.

D. Udviklingen af Grenaa Halvøens nuværende Vandløb.

I Modsætning til de i de tidligere Kapitler beskrevne Egne har man i den sydlige Del af Grenaa Halvøen et Omraade, hvor Israndens Morænedannelser spiller en i landskabelig Henseende meget stor Rolle, og det kan ikke undgaas, at de store Bakkedrag, som nu omkranser Vigene, ogsaa maa være af væsentlig Betydning for Vandløbsforholdene, idet de forhindrer Afløb fra de centrale Dele af Halvøen til dennes Sydkyst. Man ser derfor, at f. Eks. Afløbet fra Rosenholm Lavningen løber til Randers Fjord, eller at hele Egnen Syd for Ryom Gaard afvandes igennem Kolindsund til Kattegat ved Grenaa.

Ved en nærmere Betragtning af de nuværende Vandløb vil det ses, at ikke blot Bakkedragene imod Syd spiller en Rolle med Hensyn til Afvandingsforholdene, men det viser sig, at selv i Enkelthederne er Vandløbenes Fordeling paa det nøjeste betinget af den i det foregaaende skildrede Udvikling af Smeltevandsdannelserne, idet Vandet ogsaa i postglacial Tid saa godt som overalt er vedblevet at følge de samme Veje som i Slutningen af den her omhandlede Udviklingsperiode, medens Isen endnu laa med sin Rand langs med Grenaa Halvøens Sydkyst. Det ikke helt almindelige Forhold, at saavel Smeltevandsaflejringen i Skafø Gaard - Gl. Estrup Dalen som Tistrup Hedesletten nu overskæres af Vandskel, finder saaledes sin Forklaring igennem det allerede tidligere sagte.

Den Omstændighed, at de lavest liggende Strækninger en Tid lang har været sænkede under Havets Niveau og dannet forgrene Fjorde, har naturligvis ingen Forandring bevirket i Vandløbenes Fordeling. Derimod har den postglaciale Erosion paa enkelte Punkter ændret Afvandingsforholdene noget. Størst Betydning har dette haft i Hoed Egnen, hvis forskellige, i et tidligere Afsnit beskrevne Smeltevandsdale nu huser smaa, „fremmede“ Vandløb, der tildels løber i modsat Retning af de gamle Gletscherfloder. Man ser endog, at den største af Dalene, Hoed - Hallendrup Dalen, nu overskæres af et Vandskel, der passerer Dalen omtrent ved Vestenden af Holmen, idet Hoed Aa herfra løber østpaa, medens Hallendrup Aa løber imod Vest. Ejendommelige er ogsaa Afvandingsforholdene for de andre

Dale, og Udviklingen af de nuværende Vandløbssystemer maa være gaaet for sig paa følgende Maade:

Medens Hoed-Hallendrup Dalen efterhaanden fyldtes med Alluvium, gravede et Vandløb sig fra Kysten op igennem Hoed Dalen. Ved Hoed naaede det Knudepunktet for alle de gamle Dale, og her har Vandløbet saa delt sig. En Gren fik fat i Rosmos Dalen og udgravede sig i den en Erosionsrende, der er mere bugtet end den oprindelige Dal; en anden Gren gravede sig op i den østlige Del af Hoed-Hallendrup Dalen og overtog efterhaanden — uden at behøve at grave sig synderlig dybt ned — Afvandingen af et større og større Stykke af denne Dal, saa at Vandskellet gradvis rykkede vestpaa til det Punkt, hvor det nu findes. Endelig afvandes ogsaa et lille Stykke af den vestlige Ende af Glatved Dalen nu denne Vej, medens den østlige Ende af denne Dal har sit eget Vandløb, en lille Bæk, der løber østpaa direkte til Havet.

Et klart Billede af den Forandring, som skyldes Hoed Aa's Erosion i postglacial Tid, faar man maaske bedst ved at sammenligne Forløbet af det ovenfor nævnte Vandskel, Skellet mellem Vandløb til Kolindsund og Vandløb direkte til Kattegat, med den Beliggenhed, som det samme Vandskel maa have haft i Tiden umiddelbart efter, at Isen havde trukket sig tilbage fra denne Egn. Det nuværende Vandskel forlader allerede Første Terrasses Grusaflejring omtrent ved Tistrup og gaar derfra op over Attrup Højdepartiet, hvis Længderetning det følger et Stykke for derefter at overskride Hoed-Hallendrup Dalen ved Vestenden af Holmen. Nord for denne Dal følger det paa et langt Stykke Obdrup-Trudstrup-Ravnhøj Bakkeryggen. Det oprindelige Vandskel har derimod i Hovedsagen fulgt Sydranden af Første Terrasse. Det har bøjet Syd om Rosmos Dalen, idet denne jo afvandedes til Hoed-Hallendrup Dalen og gennem den til Kolindsund, og ligeledes Syd om de to parallelle Dale samt videre i østlig Retning til den nuværende Kyst ved Glatved Strand.

Endelig skal endnu nævnes et Tilfælde, hvor den postglaciale Erosion paa lignende Maade som i Hoed Egnen har bevirket en mindre Ændring i Vandløbsforholdene. Det er i den sydlige Ende af Smeltevandsdalen ved Kirial. Her har Skærvad Aa fra Kolindsund gravet sig nordpaa op i Smeltevandsaflejringen og efterhaanden overtaget Afvandingen af et stort Stykke af Smeltevandsdalen, saa at ogsaa denne nu passerer af et Vandskel. Endvidere er det ogsaa muligt, at Stubbe Sø's Afløb imod Øst til Kattegat er af forholdsvis ung Alder.

V. Slutning.

I de foregaaende Kapitler har jeg fremstillet Resultaterne af mine Undersøgelser. Jeg har søgt at skildre Forholdene, som de er, og søgt at tyde dem paa den sandsynligste Maade. Naar jeg, for at skabe et samlet Billede, har fremsat Meninger, der var mindre solidt underbyggede af Iagttagelser, og som derfor kun kunde betragtes som foreløbige Hypotheser, har jeg altid udtrykkelig fremhævet dette.

Som de væsentligste Resultater af Undersøgelsen skal jeg nævne Paavisningen af en udpræget Israndslinje, der paa den undersøgte Strækning i det hele og store har en Retning i Sydvest—Nordøst, fra Egnen Nord for Vejle Fjord langs med Jydlands Østkyst ud i Grenaa Halvøen. Desuden er de ejendommelige Afvandingsforhold for denne Isrand blevne studerede, og det er bleven bestemt, hvilke Veje Smeltevandets har fulgt udenfor Isen paa sin Vej ud imod Havet. Det er endelig bleven paavist, hvilken betydelig Indflydelse Smeltevandsdannelserne i Forbindelse med Israndens Moræneaflejringer har haft paa Udviklingen af de nuværende Vandløb.

Efter at der er givet udførlige Beskrivelser af de Overfladedannelser, hvis Oprindelse staar i Forbindelse med den omtalte Isrand, rejser sig Spørgsmaalet om, i hvilket Forhold disse Dannelser staar til de øvrige i Danmark kendte Israndsfænomener. Selv om dette Spørgsmaal egentlig ikke direkte berører den foreliggende Opgave, synes det dog at have saa megen Interesse, at en kort Behandling af det her turde være berettiget.

Den Is, ved hvis Rand de studerede Overfladeformer er opstaaede, maa være den sidste Is, som har naaet disse Egne af Jydland. Endvidere kan man gaa ud fra, at de beskrevne Israndsdannelser er ældre end lignende Dannelser paa Fyn og Sjælland og yngre end den af

USSING undersøgte Israndslinje længere vestpaa i Jydland langs med Karup Hedeslettens Rand samt de af samme Forfatter antydede, lidt yngre Tilbagerykningsstadier, der svarer til Smeltevandsafløb igennem Falborg Dalen og Skalsaa Dalen. Forholdet til den af JESSEN beskrevne Israndszone i Vendsyssel fremgaar derimod ikke direkte af Beliggenheden, men der er saa til Gengæld andre Ting, som er mere oplysende. Den meget hurtige Tilbagerykning af den østligste Del af den her undersøgte Isrand tyder bestemt paa, at Kattegat allerede paa dette Tidspunkt har haft salt Vand og derfor maa antages at have staaet i aaben Forbindelse med Havet. Dette kan kun have været Tilfældet, efter at Vendsyssel var bleven isfrit, og Morænerne i den sydlige Del af Grenaa Halvøen maa saaledes betragtes som yngre end Vendsyssels Bakkedrag.

Spørgsmaalet om, hvorvidt den undersøgte Israndslinje kan betragtes som en Stilstandslinje under Tilbagerykningen af den vestligere Isrand langs med Karup Hedesletten, forekommer det mig, at man maa besvare med et Nej. De to Linjers hele Forløb og Retning er saa forskellige, at en direkte Tilbagerykning fra den ene Stilling til den anden synes utænkelig. Den Omstændighed, at man ingen Steder i Terrainet udenfor den undersøgte Isrand finder Forhold, som kunde tyde paa en med denne nogenlunde parallel Israndslinje, synes ogsaa at tale stærkt imod en saadan Antagelse og snarere at vise, at man her staar overfor den yderste Grænse for en særlig Fremrykning af Indlandsisen.

Paa den anden Side er der Forhold, som bestemt tyder paa, at der ikke har ligget noget langt Tidsrum imellem den Tid, da hele det østlige Jydland dækkedes af Isen, og det her betragtede Tidspunkt. Der sigtes herved til de betydelige døde Ismasser, der paa flere Steder endnu forefandtes, da det fra Isranden kommende Smeltevand aflejrede sine Sand- og Grusmasser, og som senere ved at smelte bort har givet Anledning til Dannelsen af en Del større og mindre Lavninger indenfor Smeltevandsaflejringerne Omraade. Det skal dog fremhæves, at noget saadant kun har været Tilfældet paa Steder, hvor dybe Dalstrøg maatte begunstige Fremkomsten af saadanne isolerede Ispartier under Isens Afsmeltning og senere desuden maatte medvirke til at beskytte dem imod hurtig Bortsmelten. At det sidstnævnte Forhold har spillet en Rolle, turde fremgaa af, at de nævnte Indsænkninger i Terrasserne fortrinsvis findes i de i Øst—Vest gaaende Dalstrøg og dér som oftest bedst udviklede nedenfor Dalens sydlige Skraaning — altsaa paa Steder, hvor den direkte Solvarme har haft mindst Indflydelse. Som Eksempler herpaa kan nævnes Borres Sø og Brassø i Silkeborg Egnen og desuden den vestlige Ende af Mossø.

Gennem det, der er sagt i det foregaaende, ledes man til at betragte den undersøgte Israndslinje som den yderste Grænse for et Fremstød af den tilbagevigende Isrand under Indlandsisens endelige Afsmeltning. Man maa tænke sig, at den Isrand, foran hvilken Karup Hedesletten dannedes, trinvis trak sig tilbage, men hvor langt eller i Enkelthederne hvorledes lader sig endnu ikke sige. At Tilbagerykningen har været ret betydelig turde dog fremgaa af den forandrede Retning, Isranden har haft, da Isen igen rykkede frem. Om det Tidsrum, som svarer til denne tilbage- og fremadgaaende Bevægelse, kan kun siges, at det har været stort nok til, at al Is i det udenfor den undersøgte Israndslinje liggende Terrain var forsvundet undtagen paa de omtalte, særligt beskyttede Steder, men paa den anden Side heller ikke længere, end at der paa saadanne Steder kunde bevares ret betydelige, døde Ismasser.

Man maa antage, at Isen, da den igen rykkede frem til de her betragtede Egne, har været næret af en Isstrøm igennem Østersøen. Herpaa tyder ikke blot hele Forløbet af den fundne Israndslinje, men ogsaa det Forhold, at man overalt i Israndens Moræneaflejringer finder baltiske Bjergarter, der som Regel endog er til Stede i rigelig Mængde. I Horsens Egnen, hvor der ofte har været Lejlighed til at se en Del Sten i Grusgrave i Randmorænerne, er Materialet overalt ganske udpræget baltisk. Det samme synes at være Tilfældet med Israndsaflejringerne i Aarhus Egnen, men det maa dog siges, at Observationspunkterne her er færre. I den sydlige Del af Grenaa Halvøen, hvor der i de sandede og grusede Randmoræner har været god Lejlighed til at studere Blokføringen, er Forholdet derimod lidt anderledes. De baltiske Stenarter synes her ikke at være saa overvejende, og desuden er norske Blokke ingenlunde sjældne. Denne Afvigelse turde dog staa i Forbindelse med, at en stor Del af Materialet til Grenaa Halvøens mægtige Randmorænedannelser maa stamme fra forstyrrede, ældre, glaciale Aflejringer, som sikkert for største Delen er blevne optagede af Isen ved dens Erosion i de sydfor liggende Vige (Tungebækkener).

Den paany fremrykkede Is har sandsynligvis kun haft en forholdsvis ringe Mægtighed. Dette synes at fremgaa af Israndslinjens tydelige Afhængighed af det oprindelige Terrain, et Forhold, som giver sig til Kende ved dens Buen fremad paa lavere Steder og Bøjen tilbage, hvor den har truffet højere Partier. Endvidere peger den ringe Aflejring af Morænemateriale paa Steder, hvor Isens Randparti har skudt sig ind over højtliggende Terrain, i samme Retning.

Man kunde maaske fristes til at betragte de som Regel lidt fremtrædende Randmorænedannelser og Isens i det hele og store ubetydelige Indflydelse paa Terrainets Højdeforhold som Tegn paa, at

Isranden kun i en forholdsvis kort Tid skulde have opholdt sig i denne Egn. Denne Slutning er dog ikke berettiget. Alene den Omstændighed, at man i det undersøgte Terrain finder langt de største og betydeligste Randmoræner i den sydlige Del af Grenaa Halvøen, hvor Isranden har opholdt sig forskellige Steder i Løbet af det her betragtede Tidsrum, viser tydeligt, at der ikke er nogen Sammenhæng imellem Moræneaflejringerens Størrelse og Længden af deres Dannelsesetid.

En bedre Forestilling om det Tidsrum, som svarer til Opholdet af en Isrand i en bestemt Stilling, kan man derimod vente at faa ved en Betragtning af Smeltevandsdannelserne. Det kan saaledes fremhæves, at Dannelsen af store Hedesletter med betydelige Aflejringer af Grus og Sand paa Steder, hvor Afvandingsforholdene var simple, saavel som Udformningen af store Dale, hvor Smeltevandet har maattet bane sig Vej igennem højere Terrain, maa betragtes som Resultater af forholdsvis lange Udviklingsperioder. Hvad nu det Tidsrum angaar, som svarer til Opholdet af Isranden i den her betragtede Egn, maa det siges, at selv om man ikke vil sammenstille det med Karup Hedeslettens Dannelsesetid, saa tyder dog de forskellige Smeltevandsdannelser paa, at deres Udvikling spænder over et ikke ganske kort Tidsrum. Thi ikke blot viser Højdeforholdene indenfor Gudena Dalens nederste Terrasse, at man her har en Dalbund, der paa Grund af sit svagt konkave og næsten vandrette Længdeprofil maa betragtes som Resultatet af en vidt fremskreden Erosion, men ogsaa den lange Udviklingsrække, som betegnes af de forskellige Smeltevandsdannelser i Grenaa Halvøen, tyder paa en forholdsvis lang Dannelsesetid.

Bestemmelsen af den relative Længde af forskellige Tidsrum i Istiden maa dog altid blive temmelig usikker, og man kunde maaske ved Undersøgelser af Islandsstillinger ønske en anden og bedre Maade til Vurdering af deres indbyrdes Betydning. Der er da ingen anden Vej at gaa end at se, hvor stor en Rolle Israndens tidligere Ophold paa de forskellige Steder spiller for de nuværende Forhold. I den Henseende er navnlig Vandløbenes Fordeling af Betydning, idet Isranden har en tydelig Evne til at danne Vandskel. Ligesom der til den midtjydske Hedeslettegrænse svarer et iøjnefaldende Vandskel mellem Vandløb til Kattegat og til Vesterhavet, saaledes har ogsaa den her beskrevne Israndslinje sit, om end mindre vigtige, Vandskel, der sammen med det førstnævnte afgrænser et i Nord—Syd langstrakt Omraade noget indenfor Kattegatskysten. Og ikke alene de store Træk i Vandløbenes Fordeling men ogsaa en Mængde Enkeltheder viser, at Udviklingen af de nuværende Vandløb i denne Egn har været i høj Grad betinget af de skildrede Islands-

fænomener. Hvor stor en Betydning, Israndens Ophold her har haft, træder dog maaske tydeligst frem, naar man tænker sig, hvorledes Afvandingsforholdene for det nævnte Omraade imellem de to Vand-skel vilde have udviklet sig, hvis Isen ikke ved Aflejring af Moræne-materiale i de østgaaende Dalstrøg havde spærret for Afløb imod Øst, og Smeltevandslodernes Erosion ikke havde begunstiget Afvandingen imod Nord, som den nu sker igennem Gudena. Fig. 3 paa Tavle I er et Forsøg paa at illustrere denne Tanke. Der er her angivet Vand-løb direkte til Kattegat igennem alle de Dalstrøg, som nu spærres af Israndszonens Moræneaflejringer, og en Sammenligning med Fig. 1 paa samme Tavle, der gengiver Forholdene, som de nu er, viser bedre end Ord den store Rolle, Israndens Ophold langs med den fundne Israndslinje har spillet for Udviklingen af de nuværende Vandløbssystemer. Man ledes igennem saadanne Betragtninger til i den fundne Opholdslinje at se en af vort Lands mere betydelige Is-randslinjer.

TRYKFEJL OG RETTELSE.

Side	65	L.	19	f.	n.	staar:	det stejle Møgelbjerg, læs: den stejle Møgelhøj.
—	71	-	14	-	o.	—	Tepstrup Gaard, læs: Testrup Gaard.
—	96	-	-	-	-	—	Kysinge Nor, læs: Kysing Nor.
—	-	-	21	-	n.	—	Ravnehøj, læs: Bavnehøj.
—	105	-	19	-	o.	—	Svinsmark, læs: Svinsager.
—	123	-	9	-	n.	—	Fuldbro, læs: Fulbro.
—	128	-	21	-	o.	—	Nederskov, læs: Smedeskov.
—	132	-	12	-	-	—	Døvmose, læs: Stormose.
—	157	-	10	-	n.	—	Braband Sø, læs: Brabrand Sø.
—	163	-	11	-	o.	—	Grenaa, læs: Æbeltoft.
—	168	-	5	-	-	—	Vordenshøj, læs: Vordeshøj.
—	172	-	13	-	-	—	Korup Sø, læs: Korupsø.
—	187	-	9	-	-	—	Lyngsdal Gaard, læs: Lyngdal Gaard.
—	195	-	19	-	n.	—	— — — — —
—	197	-	3	-	-	—	Bjørnsholm, læs: Bjørnholm.

Endvidere er der indløbet en beklagelig Fejl, som i et bestemt Afsnit er gentaget meget ofte, idet der for Lyngbygaard Aa (i Egnen Vest for Aarhus) overalt er benyttet det fejlagtige Navn Lygumgaard Aa.

Summary of the Contents.

An ice-edge line in East Jutland and its influence on
the water-courses.

I. Introduction.

(I. Indledning.)

A. The purpose of the investigations.

(A. Undersøgelsens Opgave.)

From the country north of Vejle the river Gudenaa runs in a characteristic manner northwards parallel with the coast; not before a little south-east of Viborg does it bend eastwards and, after passing through Randers Fjord, discharge itself into the northern part of the Kattegat. Its large and curved valley thus traverses the whole East Jutland highlands.

As the course of the Gudenaa is from south to north, it drains a region extending in the same direction, and which lies a little inside the east coast of Jutland, whilst the country next to the latter is drained by a series of smaller streams. An important water-shed thus extends through Eastern Jutland, forming the boundary between the Gudenaa water-region and the more easterly area which drains directly to the Kattegat. As appears from the map of the levels, Plate I, fig. 1, on which this water-shed is indicated as a dark line, it crosses several straths (= long and broad, open valleys) extending from the more central parts of the country to the coast, which would seem the most natural routes for the water-courses. The same conditions as in East Jutland are also found, though on a smaller scale, in the southern part of the Grenaa Peninsula, where a water-shed follows the south coast.

On the map, fig. 2 of Plate I, a dark line indicates the boundary of the extension of the ice-sheet at a certain late point of the Glacial Period, and further, the principal glacier-rivers of the same period are shown with blue. A comparison with the preceding map will show, that there is not only the greatest agreement between the present streams and the ancient glacier-rivers, but also that the ice-edge line and the water-shed mentioned above are very nearly the same. This results from the fact that the present conditions are a consequence of the development during that far off period, and we may therefore expect that we shall be able to explain the distribution of the present water-courses through the study of the deposits of the ice-edge and of the glacier-rivers which are connected with the position indicated of the ice-edge.

This is the problem we shall endeavour to solve in the following. The aim of the work is to follow out in details the tracks left by the ice-edge and from these to determine its situation; with this is connected an investigation of the formations which are due to the glacier-rivers coming from the

ice. Further, there may be an occasion to consider some alterations in the conditions of the water-courses caused by erosion during the post-glacial period.

B. Summary of the literature.

(B. Literaturoversigt.)

Investigations of the kind indicated in the preceding must of course to a great extent be based on what is found in the literature. The basis must be not only knowledge of the mode of action of the present-day glaciers, but also the results obtained by investigations in other countries formerly covered by ice. The investigations in the Alps is here of outstanding importance and there is reason to mention the great progress indicated in the fact, that in the Alpine forelands the greatest weight has been laid on the study of the deposits from the glacier-rivers in front of the ice-edge. In Denmark the comparison with North Germany, where the conditions quite correspond with the Danish, is of great importance. Numerous detailed works occur on the North German marginal moraines, and the work of KEILHACK on the formations from glacier-rivers has opened up the possibility of uniting the various views under one whole picture of the development at the end of the Glacial Period. Lastly, it may be mentioned, that extensive investigations of the formations along the ice-edges have also been made in North America, and to that country is due considerable progress in this department.

With regard especially to Denmark, similar investigations have also been made in different parts of the country. As the latter have mainly been published in Danish and are consequently not so accessible, a general view may be given here of the most important of the works published hitherto.

In 1875 JOHNSTRUP published a work »De geognostiske Forhold i Jylland«¹ in which he gave a boundary to the extension of the ice-sheet in Jutland at a certain period, and this has therefore often been mentioned in the later literature and cited as the first statement of a marginal moraine in the North European lowlands. JOHNSTRUP's view is however only admissible in so far as it agrees in general lines with the present-day opinion; for the modern designation »marginal moraine« is much more sharply limited than with JOHNSTRUP and cannot be employed for the hilly Central Jutland as a whole. Further, the whole mode of looking at the matter was very different from that of the present time. JOHNSTRUP certainly considered the till a ground-moraine; but in regard to the formations, which he believed were deposited beyond the ice-sheet itself, he could not for example determine if they were deposited above or beneath the sea-level, and according to several statements, it seems as if he was mostly inclined towards the last-mentioned opinion. It is quite a different matter, that later investigations have shown, that JOHNSTRUP's theory is correct in general lines, as it must be supposed that the ice-edge at a certain period remained for a long time in Central Jutland.

Unfortunately JOHNSTRUP did not continue his investigations, and during a long series of years nothing new appeared in this regard. It was only in the year 1888 that systematic, geological investigations were begun by Den-

¹ Tidsskrift for Landøkonomi. 4. R. 9. Bd.

mark, and on the charting of the country much has gradually come to light to explain the formations in different parts of the country. The geological charting was begun on Sealand. Of greatest importance here is a fine and detailed description of some phenomena of the ice-edge in North-West Sealand, given by MÜLTERS¹. He describes how the western margin of the Isefjord basin is surrounded by high, broad ridges and country of typical moraine-landscape, which conform in great curves to the bays and windings of the Fjord. On the outer margin of the high-lying moraine-landscape rows of marginal moraine mounds are found, which extend from the country west of Nykjøbing to Bjergsted Hills west of Skarrid Lake. On charting Funen geologically no formations of the glacial margin so characteristic as those mentioned have been found, but hillocky formations also occur here however, which have probably been formed at the ice-edge. The most characteristic row of such hillocks has been described from Hindsholm and the southern part of Samsø². Its direction is north—south and it forms a slightly curved bow, convex towards the west. Lastly, with regard to Jutland, only a proportionately small part of this country has been charted geologically, namely Vendsyssel and a smaller district farthest to the south-east. On the conditions in Vendsyssel we have two works by JESSEN³; in these evidence is given of a series of ice-edge lines situated behind each other. The oldest of these is indicated by a row of characteristic ridges between Brovst and Bratbjerg, and farther eastwards marginal moraine formations are also found in Vester Hassing hilly region as also in Hammer Hills. The ice-edge formations represented in the high ridges Dronninglund Forest and Allerup Hills are however the largest and finest. They extend northwards in a flat curve almost to Lindal, and hence further to the north-west in a new curve out towards Hirshals. Close behind this ice-edge line others are found, which show that the northern part of the ice has retired faster than the southern.

It only remains to mention a series of investigations made by USSING on the situation of the ice-edge in Central Jutland. He has specially dealt with the glacier-river deposits in front of the ice-edge and this study has proved as fruitful here as in foreign countries. The methods of observation open up the possibility for future investigations to obtain much more certain results than the study of the marginal moraines alone can be expected to give. A detailed description of the Karup outwash-plain and the history of its formation is given in the work »Om Jyllands Hedesletter og Teorierne for deres Dannelse«⁴. First the glacier-rivers flowed over the narrow continuation of the river-plain westwards past Holstebro to the North Sea; later, when the ice-edge north of the outwash-plain retired a little on melting, the water could force its way to the Limfjord, and this caused the formation of the great Karup valley system in the outwash-plain itself and the deposits of Hjelmhede, the terrace north of the latter. In a later work — second edition of »Danmarks Geologi«⁵ — USSING on the basis of more recent investigations, chiefly on later glacier-river formations, adds a general description of the further melting of the ice-sheet in the environs of Viborg. Besides the two earlier glacier-rivers past Holstebro and Hjelmhede two later stream-

¹ D. G. U. I R. Nr. 8. 1900.

² D. G. U. I R. Nr. 2 1897 and D. G. U. I R. Nr. 5. 1897.

³ D. G. U. I R. Nr. 3. 1899 and D. G. U. I R. Nr. 10. 1905.

⁴ Vidensk. Selsk. Oversk. 1903 Nr. 2.

⁵ D. G. U. III R. Nr. 2. 2den Udg. 1904.

routes are mentioned in this work, namely, the Falborg Valley and the Skalsaa Valley, both of which in a way connect the northern part of the Gudenaa Valley with the Limfjord. Further it is indicated, that the late-glacial Gudenaa at a later period obtained its present outlet through Randers Fjord. In addition to the description of the glacier-river valleys themselves the approximate situation of the ice-edge at the different periods is also discussed and it is mentioned, that fine marginal moraine formations are found in the country west and south of Hobro.

C. Method of the investigations.

(C. Arbejdsmetode.)

Investigations such as those dealt with here must be based upon knowledge partly of the nature of the soil, partly of the form of the surface in the districts concerned. With regard to the first point, the detailed ground maps required for such a study are only available for a small part of Denmark, and this is the reason why it is necessary to travel over the country, especially in Jutland, to procure a view of the various kinds of soil. With respect to the shape of the country the maps of the general staff are on the other hand a good basis, suited for home study, and which out in the field are very useful for a general view. Thus the method of working has been as follows: before the investigation of a locality was begun in the field, the maps of the place were closely studied; with the aid of the sheets on a scale of 1:40000 with contour intervals of 10 feet, level-maps were worked out by colouring the spaces between the curves. In this way it is possible, not only to obtain a map which besides showing a lot of details gives a splendid view of the levels over large areas, but also to learn so much about the country, that each mound and each hollow is actually recognised when the places are visited.

Even if, however, a study of the maps often reveals the most important features of the surface-geology of a country, it is still necessary for the sake of details to make investigations out in the field. Sheets on a scale of 1:20000 have always been used in this work, partly on account of their larger scale and partly because the contour intervals of 5 feet give more details of the form of the surface. All observations have been noted down on the maps by means of signs, and these maps along with the journal notes have formed the basis for the later elaboration of the present work, though the level-maps above-mentioned have also been of considerable use.

It may perhaps be of use to discuss a little further in more detail the more special geological point of view, which must be the basis of the following description of the country. It may therefore be expressly mentioned here, that the formations dealt with fall into two essentially different groups, namely those which have been directly deposited by the inland-ice, and others which have been formed by the glacier-rivers beyond the ice-edge.

The moraine formations formed at the ice-edge are as a rule easy to recognise and can therefore often be used for the determination of the earlier situation of the latter. The marginal moraines are the most obvious, as they form long ridges with the same lineation as the ice-edge. They are probably formed directly at the latter but their mode of formation has

of course not always been the same in details, and in agreement with this we find marginal moraines of a very variable appearance. We have long and regular, but as a rule low and narrow, marginal moraine ridges which may be considered as formed at the ice-edge; they consist mostly of unassorted kinds of soil with distinct moraine character and are as a rule very stony. All possible transitions are found from the latter to large marginal moraine hills of a somewhat more irregular shape, and formed by the pressing up of earlier formations or by the collecting together of loose materials from places where the ice-edge has alternately melted away and advanced a little. Whilst the former of these types of marginal moraines is usually only found as a single ridge, it is not uncommon to find the last mentioned as ranges of hills, where the one large, marginal moraine hill is placed behind the other in such a way, that we are entitled to speak of a marginal moraine landscape.

Besides the marginal moraines proper, the moraine-landscape (*paysage morainique*) is also a formation characteristic of the glacial marginal zone. In contrast to the marginal moraine it may be supposed to have had its origin mainly under the marginal area of the ice-sheet. Its most characteristic form is a very hilly and irregular country with numerous larger and smaller depressions and hollows among the hills. As a whole it often forms high, broad ridges the lineation of which is parallel to the ice-edge whilst its single hills have no distinct lineation.

A landscape form still to be mentioned is very similar to the moraine-landscape and with a very similar importance. Over large areas of the country investigated, namely, the marginal zone of the ice-sheet is indicated by peculiar hummocky and irregular ground, which is to be compared mostly with a reduction of the typical moraine-landscape. The hummocky form of the surface is not only apparent in the field, but is also evident on the maps from the irregular course of the contours, in many small windings in and out, which make it difficult to follow the same curve with the eye for any distance. The country on the western side of Kalvø Vig is a fine example of a region with this form of surface, and a map of these parts is reproduced in fig. 1 on Plate II. The map is a reduced photographic reproduction of one of the working-maps above-mentioned; the boundary-lines between the darkest and lightest belts indicate the 40-foot contours, and the inter-jacent lighter tones indicate the 10-foot contours. On this map a dark line is drawn with direction almost W.S.W.—E.N.E. It indicates the boundary between two regions the characters of which are very different. To the north-west we have a country with large ridges, regularly and evenly formed, whilst the south-eastern part has a distinctly hummocky appearance. It is also seen, that the latter is not connected with the distribution of the ridges; these extend indeed from the one region into the other. It is evident from this, that the operations of the ice have been restricted to a transformation of the surface, and that the deposits of moraine material have been but small.

It still remains to discuss the second large group of formations, which are of importance for the present investigation, namely, the glacier-river formations. Through their study we can determine the routes followed by the glacier-rivers, and these formations are also important in that they likewise give significant information about the situation of the ice-edge and in many cases indicate the continuity of separate marginal moraines. The

following detailed description will present several examples of these conditions.

The deposits due to the glacier-rivers are characterized first of all by the fact that they consist exclusively of water-worn and water-sorted materials. These formations may also however in details show considerable variations, on account of the presence partly of lake-deposits with horizontal surfaces and consisting of fine sediments, partly of river-deposits with oblique surfaces and mostly consisting of gravel. It may also be mentioned, that the formations due to the glacier-rivers can be divided into two groups: outwash-plains (sand and gravel plains, *Hedesletter*) and glacier-river valleys. It depends however exclusively on the local conditions, whether the water coming from the ice-edge has only deposited material and thus formed outwash-plains, or if it has also led to the formation of valleys in endeavouring to find its way out.

II. The Horsens Fjord Glacier.

(II. Horsens Fjord Gletscheren.)

A. General remarks.

(A. Almindelige Bemærkninger.)

At a certain late part of the Glacial Period the ice was still a continuous cover over the Danish islands and extended to the furthest south-eastern parts of Jutland. Enormous ice-streams here passed through the southern East Jutland fjord-straths. Two such characteristic old glacier basins are the straths of Horsens Fjord and of Vejle Fjord, both of which extend farther westwards than the Fjords.

In the following a description will be given of the Horsens Fjord Glacier on the basis of its marginal moraines and its glacier-river deposits, which to this day are easily recognised in the terrain; but something may first be said about the features of the high country surrounding Horsens Fjord.

Horsens Fjord extends about 20 Km. from the east coast of Jutland into the country. To the south it borders on the district Bjerger Herred, which separates it from Vejle Fjord, and the ground rises slowly and regularly from the coast southwards.

To the west the fjord-strath branches, one part continues directly westwards into a flat, steadily rising strath drained by Bygholm River, and another part is sent off as a valley-like branch to the north-west and through this flows the Store Hansted River. Furthest west the two branches are separated by a triangular area with high country, the third side of which is the Gudena Valley.

The character of the two long depressions mentioned is very different. The »Bygholm Strath« is quite a flat and broad, wedge-shaped continuation west of Horsens Fjord proper, whilst on the other hand the »Hansted Strath« appears as a narrow, but very deep valley-like channel with steep slopes and a level bottom filled with peat.

To the north the fjord-strath is bounded by high lands, at some places

even very high, and is thus separated from the large depressions in which lie the lakes Mossø and Skanderborg Sø. The greatest heights in Denmark are found here, namely the Ejder Bæghøj Hills south of the eastern end of Mossø and a somewhat lower part, the Elbjerg Hills south of Skanderborg Sø. In continuation of this a hilly ridge extends east-south-eastwards, which however is not very sharply marked off from the country lying to the north and almost as high.

The ice penetrated through the Horsens Fjord Strath and through the two branches above described, and through these it extended as far west as to the present Gudena Valley. Along its margin this ice has deposited moraines, which pass across the Bjerger Herred highlands and can afterwards be followed in two large curves round the two straths mentioned and over the high ground north of Horsens. Beyond the ice-edge the glacier-rivers deposited their sand and gravel masses and at some places eroded large valleys. In this way arose a whole system of glacier-river formations which now surround the marginal moraines to the west and are very apparent in the different localities.

B. Moraine formations.

(B. Morænedannelser.)

The marginal moraines can be seen over large stretches as long regular ridges, usually consisting of stony material. At other places they appear as more isolated hillocks, composed of coarse moraine gravel, and again at other places they give place to a very hilly and irregularly formed moraine-landscape with diverse soils; the form first mentioned however is the most frequent in the country dealt with here.

At the village Engom only a little more than 3 Km. north of Vejle Fjord we find the most southerly certain point of the ice-edge and at the same time the point which must be considered as the boundary between the western margin of the Bjerger Herred Ice and the northern margin of the Vejle Fjord Glacier. That the ice-edge has existed at this place appears from the fact, that we find here the beginning of a distinct glacier-river formation.

From Engom the ice-edge has extended N.N.E. to a little north of Hedensted; but it has not left any true marginal moraine on this part. Such a moraine is not found before a little north of Hedensted. A characteristic marginal moraine occurs here for a distance of quite $3\frac{1}{2}$ Km., it can be followed as a single, nearly continuous mound in an almost south to north direction from the village of Rimmerslund to a little north of Løsning, and forms the eastern boundary of a small outwash-plain. Its appearance is shown on fig. 1 of Plate VI. The moraine-mound is mostly composed of typical moraine-gravel, as shown on Plate VI, fig. 2 and on Plate VII, fig. 1.

As the Bjerger Herred Ice has met with the glacier-tongue from the Bygholm Strath north of Løsning Station, the ice-edge line bends sharply to the west at this place and continues round the Bygholm Strath in a curve, which like the strath becomes wedge-shaped and somewhat pointed westwards. A single mound-shaped moraine is found along almost the whole way. South of the strath we thus have a long moraine-mound, which extends to the north-west almost in a straight line north of Ullum and as far as to the Gudena Valley, and along the north side of the strath we find a broad moraine

mound with almost west-east lination. Fig. 2 on Plate VII shows a portion of the latter from the inner side. The material of the marginal moraines is here also very stony, and the abundance of large stones is specially remarkable in the north moraine.

A little W.N.W. of Tamdrup Church the ice-edge line forms a sharp angle of less than 90° , and the moraines, deposited by the glacier-tongue of the Hansted Strath, here have their beginning. From the point mentioned the moraine formations extend in a wide curve round the Hansted Strath, first to the N.N.W. past Nim, thence along the Gudena Valley in a north-north-easterly direction past Vestbirk and from there further south-eastwards, south of Østbirk. The character of the most southern part of this curve is like that of the marginal moraines above mentioned, as we find here mound-shaped

Fig. 1. Sketch-map showing the ice-edge line and the glacier-rivers in the Horsens district. 1 : 500000.

hillocks of moraine-gravel. Plate VIII, fig. 1 shows such a hillock and fig. 2 of the same Plate gives an idea of its abundance of large stones. Lastly, Plate IX, fig. 1 shows a characteristic mound-shaped marginal moraine lying a little more to the north. In contrast to these, no true marginal moraines are found over the whole of the next part lying at the end of the Hansted Strath, a condition which must be connected with the fact, that the ice-edge here has for a long distance reached quite to the Gudena Valley and has so to speak been washed by the glacier-river, which sought its way northwards round the protruding ice. But on the other hand the whole of the district, found at the end of the Hansted Strath and which separates the latter from the Gudena Valley, must be considered as a rugged moraine-landscape formed at the marginal zone of the ice-sheet by the considerable quantity of moraine material, which could be transported to this place through the deep Hansted Strath. Fig. 2 on Plate IX shows the appearance of this moraine-landscape.

From the country south-east of Østbirk, where the curving backwards of the ice-edge line is indicated by a distinct glacier-river formation, this line has extended E.N.E. along the southern side of the Ejer Bavnehøj Hills to the eastern end of the latter, where it has passed the ridge and continued on the north side of the Elbjerg Hills. At this place the lineation of the ice-edge has turned slowly until it became west-east and it continued in this direction as far almost as Hylke Station, where it has met with the margin of the ice, which, independent of the Horsens Fjord Strath, had advanced to these districts over the high ground west of Odder. Along this northern border of the Horsens Fjord Glacier we find no true marginal moraines, but the situation of the ice-edge can however be determined with tolerable certainty also on this part by means of various other features. Firstly, the presence of glacier-river formations round Skanderborg Lake shows, that the ice-edge must have bent backwards to this district, and further, the ice-edge line mentioned is a distinct boundary between two regions with essentially different form of surface; behind the line we find the same irregularly formed, hummocky ground as that which farther southwards, where marginal moraines are also found, characterizes the marginal zone of the ice-sheet, whilst beyond the ice-edge line we find on the whole large level ridges.

Considering now the ice-edge line indicated here as a whole, its curving round the two western branches of the Fjord Strath is the most remarkable. The manner in which the marginal moraines have so to speak enveloped these, shows distinctly, how much the form of the ice-edge is conditioned by the high lands and to what an extent the straths mentioned have favoured the penetration of the ice westwards and north-westwards, as also how far the hilly regions have restrained the movement of the ice. From this we obtain a good idea of the importance, which the original features of the country have had on the extension of the ice-sheet in its marginal region.

C. Glacier-river formations.

(C. Smeltevandsdannelser.)

At several places glacier-rivers have flowed from the long frontage of the ice-sheet described in the preceding pages. But to the east the huge ice-mass has everywhere blocked up the way to the Kattegat; to the west the great Central Jutland highlands were likewise an insurmountable barrier to an outflow into the North Sea and lastly to the south the Vejle Fjord glacier acted as a dam against the glacier-rivers. Consequently they were forced to find a passage northwards along the ice-edge and arrive at the sea through the Gudena Valley. Outside and generally along with the marginal moraines formations from the glacier-rivers are found, the presence of which confirms the opinion as to the situation of the ice-edge, already given on the basis of the moraine formations, and which at several places, where the marginal moraines are only small, indistinct or quite lacking, can serve as a guide to the determination of the situation of this margin. These glacier-river formations are also of great importance in yielding indisputable evidence as to the continuity and consequently the contemporaneousness of the whole ice-edge line, as all the gravel deposits, formed by the streams from the different points of this ice-edge, meet in one continuous river-deposit, which extends as a terrace northwards through the Gudena Valley.

Between Vejle and Horsens at nearly the same distance from both towns and immediately west of the railroad between Hedensted and Løsning there is a well developed though but quite small outwash-plain, that is a flat area covered by sand from the glacier-rivers, the original surface of which has been at a lower level. This plain — the Løsning outwash-plain — has an oblong shape and is extended in the direction south—north. The main quantity of the water, which has formed the plain, has come from the ice-edge along its eastern border (see the map, fig. 2 on Plate II). But it has also received an addition from the south-west through the small glacier-river valley coming from the place where the Bjerge Herred Ice must be considered as having met with the northern margin of the Vejle Fjord Glacier. Plate X, fig. 1 shows the appearance of this valley.

The outflow took place from the north-western corner of the outwash-plain and from there the water has flowed to the north-west. It has cut out a valley-like, level channel — the Krollerup-Ullum Valley — along the marginal moraine, which indicates the south-west border of the glacier-tongue of the Bygholm Strath. Directly north-west of Ullum this stream opens out into the large depression of Ullum Kær. As the river-sediment did not suffice to fill up the whole of this extensive basin, a large lake has been formed here, which continued to exist also during a part of the postglacial period, until it gradually became filled with peat.

From the northern corner of this lake the water continued further, but now in a north-easterly direction, and hollowed out the large and broad valley which extends from Aale to Vestbirk and through which the Gudenaå now flows. Its bottom is covered the whole way by a level deposit from the glacier-river consisting of sand and gravel. It is remarkable, that the coarseness of the material varies with the breadth of the valley, in such a way that the coarsest gravel is found where the valley is narrowest and sand where it is broadest. The surface of the glacier-river deposit is quite level and has a regular, though but slight slope north-eastwards. It is only at some few places that it rises a little where some level deltas occur off the mouths of some erosion-clefts which extend into the north-western high country. Quite a similar formation is found along the steep western declivity west of Vestbirk, which is quite intersected by small erosion-clefts, but the single deltas have united here to form a coherent »deposit-slope«. This form of surface is on the whole common in our glacier-river valleys, but only at places where the sides of the valleys consist of sand and gravel, which is easily washed out, and where the steep slopes are consequently always furrowed by a number of small erosion-clefts.

On the stretch last described the main glacier-river obtained several smaller affluents from the ice-edge and a single large one almost halfway between Aale and Vestbirk. In the corner namely between the two adjacent ice-tongues we again find a point where a considerable stream has left the ice-edge; it has cut a fine dale (Plate X, fig. 2) through the Nim highlands to arrive in the Gudenaå Valley.

Near Vestbirk the glacier-river arrived at the part of the Gudenaå Valley, which is the prolongation of the Hansted Strath and which extends to the N.N.W. up into the district between Salten Langsø and Mossø right across the high lands south of these two lakes. The considerable breadth, the high and steep slopes and the beautiful terraces of this part of the Gudenaå Valley make it one of the most imposing valleys of Denmark. But it has not

only served as passage for the water which arrived here by the route above described; at Vestbirk itself considerable quantities of water have probably left the ice-edge to flow northwards through the valley and it has even received an affluent through the small Østbirk Valley, a glacier-river valley, which extends along the north-east border of the ice-tongue of the Hansted Strath, and which has been formed by water leaving the ice-edge about 1 Km. south-east of Østbirk.

At Vestbirk the Gudena Valley to some extent changes its character, the form of the surface at the level of the valley becoming different from before to right beyond Silkeborg. At the bottom of the deep valley, namely, we no longer find a continuous glacier-river deposit but the terrace is divided into separate parts with level surfaces and mostly steep slopes. Among these terraces are hollows and long depressions mostly without outlet or lying deeper than the outlet. This condition and also the irregular shape of the hollows exclude the possibility, that they have been formed by erosion after the terrace has been deposited. They must on the contrary be considered as hollows caused by sinking of the ground, at places where the glacier-river has had larger or smaller isolated ice-masses buried under and amongst the material it carried and these masses have later, on the melting of the ice, caused the depressions mentioned. This mode of formation is in itself not without interest, but it is of still greater importance from the information it gives concerning various other conditions. Firstly, it is clear that when so many isolated smaller masses of ice have been able to persist without altogether melting away, the interval between the period when the whole Silkeborg district was covered with ice and the advance of the inland-ice dealt with here, cannot have been very long. Secondly, the presence of such »dead« ice-masses in the valleys proves that the latter have not been formed by the glacier-rivers, which have deposited the terraces, but that they must be older. With regard especially to the part of the Gudena Valley which extends from Vestbirk towards Salten Langsø, everything seems to indicate, that we have here in reality a very old valley, the continuation of which to the south-east is the Hansted Strath, from which it is only separated by a narrow and relatively recent moraine barrier. We are thus led to conclude that at an earlier period a large valley has existed which connected the strath of Salten Aa with Horsens Fjord.

D. The development of the present water-courses in the Horsens district.

(D. Udviklingen af de nuværende Vandløb i Horsens Egnen.)

As shown above, the operations of the Horsens Fjord Glacier have been restricted mainly to a local transformation of the surface and it is only exceptionally that larger hilly ridges have been formed at its margin, and even if the effects of the glacier-rivers are more in evidence, the new valleys formed by these are equal neither in breadth nor depth to the old valley, which extended from Horsens Fjord north-westwards into the Central Jutland highlands. The presence of the ice-edge along the line described has nevertheless had a very important influence on the development of the water-courses, and we can see, how the water still to this day almost everywhere follows the same routes as the old glacier-rivers, in order like the latter to

unite into a single stream and arrive at the sea by the long detour through the Gudena Valley.

The present water-shed between the Gudena and the streams flowing into Horsens Fjord mostly follows the moraine deposits of the ice-edge, and it is thus these deposits which now — instead of the ice-sheet itself at an earlier period — prevent the water from flowing directly into Horsens Fjord. This has been possible, in spite of the small size of the marginal moraines, from the fact that the glacier-rivers along the latter had forced a way which naturally became the passage for the later streams. The only part, where there was originally a deep connection between Horsens Fjord and Central Jutland, namely, through the Hansted Strath to the Gudena Valley north of Vestbirk, is also a place where the conditions would favour an abundant deposit of moraine material in the marginal zone of the ice-sheet, so that the ice-edge has also been able to form a water-shed across this large valley. The result of this was, that the drainage after the ice had melted took place in the same way as when Horsens Fjord was still blocked by the ice-sheet.

Lastly, with regard to the post-glacial erosion, this has been but small in the whole country considered. Some small streams from Horsens Fjord have gradually caused the appearance of some dales in the surrounding country but only a single one of these has succeeded in cutting across the ice-edge line and taken part in the drainage of an area beyond the latter. This is the Gjesager Aa, which from the narrow but deep valley of Bygholm Aa has carved out a winding erosion-cleft through the low area close behind the ice-edge line north-east of Krollerup and farther southwards into the Løsning outwash-plain; it has thus gradually taken over the drainage of the latter and of the neighbouring country to the west as also of a short piece of the Krollerup-Ullum Valley.

III. The inland-ice in the Aarhus district.

(III. Indlandsisen i Aarhus Egnen.)

A. General remarks.

(A. Almindelige Bemærkninger.)

From the district north-west of Horsens the Gudena flows through a large and winding valley northwards through Jutland. Not before the neighbourhood of Viborg does it bend eastwards, and after flowing through Randers Fjord arrive at the Kattegat. It cuts off in this way a large part of the East Jutland highlands which, apart for the moment from the Grenaa Peninsula, can be characterized as a high-lying country with mainly large and regular surface. It is however divided into more or less separate parts by several long depressions and valleys.

To the north of the country described earlier we thus find a distinctly low area with west—east lineation and where the following lakes are found: Salten Langsø, Mossø and Skanderborg Sø. The character of this low country is however not that of a true valley, nor does it extend to the coast, but is interrupted by the country east of Skanderborg Sø rising to a considerable

height, a high region occurring here near the village of Fruering, which runs north-west to south-east to the neighbourhood of Odder. As the height decreases southwards from this, the connection with the highlands north of Horsens Fjord is a little lower.

Northwards Solbjerg Lake and its valley-like prolongations on each side separate the Fruering highlands from an extensive plateau-like area south of the Aarhus Valley. This area is broadest to the east, where it extends right out to the coast, and becomes somewhat narrower westwards in towards the Gudenaa Valley.

From Aarhus the large Aarhus Valley extends W.S.W. into the interior and at Rye Station it arrives at the Gudenaa Valley, the lineation of which from this place to Silkeborg is almost the same. The Aarhus Valley is thus a direct connection between the Kattegat and the Gudenaa Valley and its bottom is only for a short extent a little higher than the level of the Gudenaa. With its even, smooth slopes the appearance of the Aarhus Valley recalls greatly that of the more southern fjord-straths; only farthest to the west its character becomes the same as that of the Gudenaa Valley, the slopes becoming steep and the bottom of the valley gravelly with larger and smaller lakes and peat-filled depressions.

A little north of the Aarhus Valley and almost parallel with it there is another strath though not of so considerable an extent. Its most western part is a narrow valley which traverses the high country a little east of Silkeborg, and through which the Linaa flows to the Gudenaa. Farther to the east the strath widens out to a flat, long, valley-like lowland, through which flows the upper part of the Lygumgaard Aa. At the eastern end of this part the strath bends north-eastwards, and as a narrow dale-like channel forms a connection with the characteristic continuation of the Lilleaa Valley eastwards to Aarhus Bay.

The strath last-mentioned together with the Aarhus Valley and the Gudenaa Valley thus cut off a long, narrow, high country, the middle part of which however is comparatively low. On the other hand, north of the strath of the Lygumgaard Aa, is found an extensive, somewhat homogeneous high-lying country, generally with level, large and regular forms of surface, which is also bounded by the Lilleaa Valley and the Gudenaa Valley.

North-east of this is a beautiful valley through which the Lilleaa runs to join with the Gudenaa at Langaa. It has already been indicated that this valley can be followed beyond the stretch through which the present Lilleaa flows, continuing as a broad strath eastwards to Aarhus Bay and thus, like the Aarhus Valley, affording a natural route of connection between the Kattegat and the Gudenaa Valley.

North-east of the Lilleaa Valley a high country similar to that on the opposite side of the valley is found extending towards the Grenaa Peninsula. The forms of the surface are also here mostly large and evenly rounded, and the plain ridges often have a definite lineation of about N.W. to W.—S.E. to E.

When the inland-ice lay in the southern part of the Kattegat and from there extended far to the west through Horsens Fjord and its western ramifications, it has also advanced a little into the part of East Jutland above described which lies north of the Horsens Fjord. But no large depressions or valleys have been found here, which like Horsens Fjord could assist the

advance of the ice into the country, because the lineation of the Aarhus Valley in E.N.E.—W.S.W. was so different from the main direction of movement of the ice — in this region from south-east to north-west — that this valley has only to a small extent been able to facilitate the advance of the ice here, and the same is the case with the south-eastern end of the Lilleaa Valley north of Aarhus. This is the reason why the ice in the country more to the north has nowhere extended so far west as in the Horsens district, and the boundary of its extension conforms approximately to the coast, in such a way however, that in the north it approaches the latter more and more and finally bends out through the Grenaa Peninsula.

The large depressions and valleys, all of which reach into the Gudenaa Valley, have on the other hand served as routes for the glacier-rivers, which through them united with the river from the south and together with the latter arrived at Randers Fjord through the Gudenaa Valley.

B. Moraine formations.

(B. Morænedannelser.)

In the Aarhus district the ice-edge formations are mostly very few and not very prominent on the landscape; they cannot stand comparison with the marginal moraines in the Horsens district, which are certainly often small but finely developed, or with the extensive marginal moraine landscapes of the Grenaa Peninsula. The reason for this must be sought in the fact, that the ice over large areas has advanced over high-lying country, where its thickness in the marginal zone could only be relatively small. The ice-mass and consequently the quantity of moraine material carried out to the ice-edge was at such places of less importance. In addition to this the level-conditions caused the ice-edge over large areas to have a direction, which deviates appreciably from the perpendicular to the main direction of the movement of the ice, and consequently the sparse moraine material along the ice-edge was still more distributed over a larger area.

In such a country, where the marginal moraine formations are at some places so slightly developed, that it is often doubtful whether the continuation is to be sought for in one or the other direction, it might perhaps seem questionable to speak of a definite, continuous ice-edge line, as there is no guarantee against obtaining a false total picture from combining different marginal moraines not at all from the same time. But if a system of glacier-river formations which unite to a continuous fluvial deposit, is found outside the ice-edge, these formations can give valuable information as to the contemporaneity of detached marginal moraine formations, and something of the kind is just the case in this country. The Gudenaa Valley, through which the great glacier-river coming from the Horsens district flowed in a large curve round the ice-sheet to the ice-free northern part of the Kattegat, has also served as a collecting-channel for the glacier-rivers flowing from the ice farther to the north. That is the reason why glacier-river deposits are found at several places to extend from the gravel terrace in the Gudenaa Valley into the country more to the east, and the upper ends of these deposits thus indicate a series of points on the ice-edge line sought for. These points are found at Skanderborg Lake, in the Aarhus Valley, in the strath of the Lygumgaard Aa and in the Lilleaa Valley. The study of the

moraine deposits will then as a rule give sufficiently accurate information as to the distribution of the ice on the intermediate areas, so that it is possible in this way to determine the position of a continuous ice-edge line through the part of East Jutland considered here.

The different character of the marginal moraine formations in this country indicates a natural division of the marginal line into several sections.

Fig. 2. Sketch-map showing the ice-edge line and the glacier-rivers in the Aarhus district. 1 : 500000.

Farthest to the south a part is found, where the ice-edge has lain almost across the direction of movement of the ice, and as at the same time the country behind cannot have acted as a serious hindrance to the extension of the ice, the ice-edge line is indicated here by fine marginal moraine formations. To these formations belongs the large moraine mound very apparent on the landscape, which extends past Hylke Station northwards down to Skanderborg Lake, and also, after a break at the lake, an extremely stony marginal moraine streak with small hillocks, which from Skaarup at the south-

eastern end of the lake extends in a north-easterly direction up the slope to a little east of Fruering; the appearance of this part is represented on fig. 1 of Plate XI.

At the point last-mentioned the ice-edge line alters its lineation and continues for a distance of about 12 Km. towards the N.N.W. over the high country north-east and north of Skanderborg, past the village of Mesing, west round Björnebjerg and down into the Aarhus Valley south of Höver. The moraine formations of the ice-edge are on the whole of this extent but little evident, as they ordinarily appear only as a hummocky belt directly behind the ice-edge line. The conditions of the soil are somewhat variable with scattered occurrences of moraine-gravel in small hillocks. As a peculiarity in the country behind the ice-edge line a little valley should be mentioned which cuts through the top of the hilly mass Björnebjerg without being continued laterally outside the latter, as will be seen from the profile-drawing fig. 3. The valley must have been formed by a smaller sub-glacial stream, and the fact, that its bottom at the western end is flat and regular as in an ordinary glacier-river valley (Plate XI, fig. 2) would indicate, that the stream has had here an open channel in the ice.

In this northern part the ice-sheet has attained its greatest extension in the Aarhus Valley, and from here the ice-edge line again turns back north-

Fig. 3. Longitudinal profile of the valley through Björnebjerg.

eastwards. Besides the Aarhus Valley it also passes the strath of Lygumgaard Aa going diagonally over the lowest part of the intervening territory. North of Lygumgaard Aa it continues some distance east-north-eastwards almost to Mundelstrup.

In the district mentioned the ice-edge has been at a level, which was considerably lower than the country nearest to the south, and as the Aarhus Valley also afforded a somewhat passable route to a part of the district, considerable moraine deposits have been found in the marginal zone of the ice-sheet here, deposits, which not only form a barrier across the Aarhus Valley, but also appear as a broad uneven belt of mounds or hillocks containing very stony material. Ordinarily the soil consists of till with many large stones, which however have been gradually removed by man from the surface. Fig. 1 on Plate XII thus shows a place in the Aarhus Valley, where a small copse has recently been cleared and the quarrying of the stones is going on. At other places complete moraine-gravel occurs, often containing water-worn material; Plate XII fig. 2 shows a part of a fine section in such gravel at Lillering. This hillocky and very stony belt is fairly broad especially in the Aarhus Valley, and it is the outer boundary of this which indicates the true ice-edge line; the latter is also over large areas the boundary of several deposits due to water from melting-ice.

The ice-edge has probably turned again at Mundelstrup and continued

into the Lilleaa Valley, which it has crossed at the place where the moraine barrier of Söften now forms the water-shed of the valley. From here the ice-edge line retreats a little up the slope towards the high country more to the north-east and can be seen passing this as a distinct boundary between a country with a very hummocky surface behind the ice-edge and the large, smooth ridges beyond (Plate II, fig. 1). The direction here is W.S.W.—E.N.E. out towards the southern part of the Grenaa Peninsula. In the Lilleaa Valley as well as on the area last-mentioned the material in the moraine deposits of the ice-edge is very stony, and some fine small marginal moraine ridges formed by moraine gravel are even found just to the north-east of the Lilleaa Valley. Plate XIII, fig. 1, shows one of these; a very stony surface somewhat farther to the north-east is seen on fig. 2 of the same plate.

C. Glacier-river formations.

(C. Smeltevandsdannelser.)

The ice-edge line indicated connects, as mentioned previously, a row of places, from which various glacier-river deposits extend out towards the Gudenaa Valley. For at every place, where the ice-edge has crossed a valley or appeared in a low region, which was connected with the Gudenaa Valley, the water has streamed down to reach the sea by this route.

The southernmost place, where deposits from glacier-rivers are found, is in the surroundings of Skanderborg Lake. Both east of the lake and especially in the neighbourhood of Skanderborg characteristic terrace formations occur, which extend out to the north-eastern corner of Mossö. From here the water has probably flowed through the little valley in which Vessö lies out to the Gudenaa Valley, whilst the whole of the large Mossö basin and partly also the Skanderborg Lake itself have been filled with «dead» ice-masses.

The next place, where water has streamed from the ice is found in the large Aarhus Valley south of Höver. The character of the valley is from here westwards quite the same as in that part of the Gudenaa Valley, which is its continuation to Silkeborg, and at its bottom we find sand and gravel deposited by the glacier-river, which here has had a free course to the west.

The conditions have been quite different in the strath more to the north, which is now drained by Lygumgaard Aa. The broad part of this strath was only connected by a narrow, somewhat highly situated small dale with the Gudenaa Valley, and, as the ice blocked its eastern end, a large ice-barred lake was formed here in which sand and clay were precipitated. The extension of these kinds of soil proves that the boundary of the lake was for fairly long distances formed by the ice itself and also, that its surface was 47 M. above the present level of the sea, a height which agrees with the height of the pass in the valley to the west.

Both the water which came from the Skanderborg district and that which streamed through the Aarhus Valley, arrived at the Gudenaa Valley near Rye Station and united here with the glacier-river coming from the Horsens district. The united streams followed the Gudenaa Valley further downwards and somewhat below Silkeborg received the water from the ice-barred lake above mentioned. On this tract the Gudenaa Valley has a considerable resemblance to the part in the country a little more to the south, as the

glacier-river deposit in the bottom of the valley is here also interrupted by numerous holes and large depressions, formed at places where »dead« ice has been lying. The depressions here are however mostly filled with water and form lakes; the well-known Silkeborg Lakes are some of these. A long distance now follows on which the Gudenaa Valley has not received any water from the ice-edge more to the east; not before Langaa does the next glacier-river valley, the Lilleaa Valley, open out into it. On the whole of this long section of the Gudenaa Valley the glacier-river has deposited sand and gravel, which now forms a continuous terrace down through the valley. A little to the north where even three terraces appear at several places, the terrace dealt with here is the lowest and most recent.

The northernmost place, where a glacier-river has streamed from the ice-edge, is where the latter stood across the Lilleaa Valley. From this point a fine glacier-river valley with flat gravelly bottom extends north-westwards to the Gudenaa Valley at Langaa. From here the united streams have continued north-eastwards past Randers and through the present Randers Fjord. The Lilleaa Valley forms in a similar manner to the Aarhus Valley a direct connection between the Kattegat and the Gudenaa Valley, and it is also the case here, that only the part of the Valley directed towards Gudenaa is a well-marked glacier-river valley, whilst signs of changes caused by the ice are distinct in the south-eastern end, with its smoothed and levelled sides. The ice has deposited moraine material in the valley bottom inside the ice-edge line, and outside this the water has left its masses of sand and gravel and gradually raised the bottom of the originally deeper, old valley. On the whole of the way northwards a fine glacier-river deposit with flat surface is found, as shown in Plate XIV, fig. 1, with distinct cross-bedding (Plate XIV, fig. 2). The size of the grains varies here also with the breadth of the valley, in such a manner that the gravel is coarsest where the valley is narrowest and vice-versa, as appears from the table on page 143. The glacier-river deposit in the Lilleaa Valley might to some extent be divided into two different parts, because the river a little before it reached the Gudenaa Valley opened out into the large depression at Lerbjerg, in which there must have been a lake at that period. The lowermost part of the Lilleaa Valley, through which the water flowed from this lake, is different from the preceding part in the greater slope of the glacier-river deposit and also in the presence here of fragments of an earlier and higher terrace.

The Lilleaa Valley and the lowermost part of the Gudenaa Valley are the conclusion of that series of formations, which form together the valley-system of the late-glacial Gudenaa. As the descriptions of the single parts of this system are found rather scattered and a general view of them is thus rendered difficult, a summary may be given here of the whole system of valleys and at the same time occasion may be found to discuss some conditions, which have not been mentioned before. A longitudinal profile of the late-glacial Gudenaa and its various tributaries from the ice-edge is shown on Plate III. The heights have been enlarged 250 times in order to show the level-conditions of the main valley somewhat distinctly, although this has caused some of the smaller streams from the ice-edge, on account of their relatively great fall, to be represented by very steep and but slightly perceptible lines. The first thing, which strikes the eye, is the extremely slight fall of the main-river, on an average only a little more than 1:2000. Next, some irregularities are noticeable at the upper end of the valley, where the

fall varies a good deal. The first stretch above Ullum forms an enclosure where the height of the water in Ullum Kær together with the conditions of level at the margin of the Bjerre Herred ice-sheet have been decisive for the fall of the glacier-river deposits. Next follows the valley between Aale and Vestbirk; it is specially characterized by its inconsiderable fall, and not only this condition but also the sudden increase of the fall at Vestbirk must be placed in connection with a pushing forward of the ice into the valley at this place. From Vestbirk downwards on the other hand the glacier-river deposit forms so far as the height is concerned an uninterrupted whole the fall of which is regular and decreases slightly northwards. Its profile forms a slightly depressed line, the curvature of which is somewhat larger at the upper end and decreasing downwards, a form which is often indicated as the normal for erosion-valleys. Longitudinal profiles of quite a similar form are found in the case of many of the tributaries but the curves are as a rule considerably steeper and their curvature more obvious. As a fine example of a valley of this type may be mentioned the glacier-river valley, which cuts through the Nim highland and unites with the Gudenaa Valley between Aale and Vestbirk. But on examining the profile-drawing it will be seen that we also have valleys, the longitudinal profiles of which form lines with the convexity upwards, as is e. g. the case in the uppermost part of the Lilleaa Valley. This condition must stand in relation to the fact, that the streams at such places have chiefly acted in the way of depositing material and have gradually raised the bottom of the valley, whilst the depressed profiles must indicate places where the river certainly has deposited some material but has also in the course of time been able to deepen the valley through which it streamed. Lastly, the study of the levels inside the most recent terrace of the Gudenaa Valley may also give occasion for some observations in quite a different direction. As the fall of the bottom down through the valley and its height at the mouth must be settled by the sea-level, means are present to determine the height of the sea-level at that period, when the inland-ice was still present in South-Eastern Jutland. The continuation of the profile-line sinks to the place, where the valley of Randers Fjord issues from the highland, to ca. 8 M. below the present sea-level and even if the amount cannot be credited with too great a value, still it indicates that at the period considered here the land at the mouth of Randers Fjord has lain somewhat higher in relation to the sea-level than at the present time.

D. The development of the present water-courses.

(D. Udviklingen af de nuværende Vandløb.)

The formation of the part of Jutland described in the preceding was in the main completed before the period, when the margin of the inland-ice lay at the line investigated. Nowhere along the ice-edge line do we find moraine formations specially prominent on the landscape nor have the glacier-rivers coming from the ice-edge caused any great alterations. Consequently we should perhaps be tempted to suppose on superficial consideration that the alterations caused by the presence of the ice-edge in the district dealt with here, have had but small importance on its geographical development. This is however not the case with regard to the developmental history of the water-courses. A glance at the map shows, that the streams

of the present-day for the most part follow the same routes as the glacier-rivers did formerly, and in this regard a striking likeness is thus found with the country west of Horsens described above.

The most striking point is, that the course of the Gudenaa is continuously to the north and this in spite of the presence of a large strath — the Aarhus Valley — which extends directly from the neighbourhood of Silkeborg to Aarhus Bay. The reason must be sought in the fact, that the bottom in the valley mentioned is for a short distance a little higher than the level of the Silkeborg lakes, a moraine barrier extending across the bottom of the valley, so that the water runs from here to both sides, and the valley is traversed by a water-shed. This barrier belongs to the stretch of very stony moraine formations, which are here characteristic of the marginal zone of the ice-sheet, and the deposition of moraine material near the ice-edge has been very considerable just at this place. When it is stated, that the lowest point of the present water-shed in the Aarhus Valley, in spite of the condition just mentioned, is only ca. 14 M. above the level of Gudenaa and it is also mentioned, that the breadth of the intercepting moraine barrier is only ca. 1 Km., it becomes clear, that it is exclusively the presence of the ice-edge in this district, which has directly prevented the drainage of the more central parts of Jutland inside the ice-edge line from finding its way to the Kattegat by this route.

The Lilleaa Valley like the Aarhus Valley is crossed by a water-shed at the place where the ice-edge formerly existed, and the reason has been the same here, viz. that a deposition of material, which has even been very considerable, has taken place in the valley-bottom near the ice-edge. As the deposition both of fluvio-glacial formations and of the moraine material has been the greater the nearer the ice-edge is approached, the present bottom of the valley rises evenly from both sides up towards the ice-edge line. From the highest point of the valley-bottom at the place where the ice-edge formerly existed, the water-courses now follow the natural fall to both sides.

The formation of the moraine barrier in the Aarhus Valley has compelled the Gudenaa to continue its course northwards through the old glacier-river valley and in agreement with this we find a considerable water-shed following the east coast of Jutland and forming the boundary between the tributaries to the Gudenaa and the streams which flow directly into the Kattegat. The moraine barrier in the Lilleaa Valley has caused this water-shed a little to the north to approach the coast and thus to continue out towards the southern part of the Grenaa Peninsula.

If we compare the maps figs. 1 and 2 on Plate I, we see that the water-shed mentioned not only follows the investigated ice-edge line at the places where it crosses the valleys, but the same is the case on large areas over the higher lying country. This agreement cannot however as a rule be explained by an increased deposition in the marginal zone of the ice-sheet, as is the case in the valleys mentioned and ordinarily also in the Horsens region. The reason must rather be sought in the fact, that the original hilly ridges have by their size not only caused the present water-shed to follow them, but also during that early period restricted the movement of the ice so much, that the ice-edge has not as a rule extended very much beyond their crest. At some places, however, the two lines diverge a little from each other. In the country south-east of Skanderborg Lake the ice-edge line has advanced

more than the present water-shed, but this difference is just at a place where the ridge, which is followed by the water-shed behind the ice-edge line, is not specially high and has consequently permitted a further advance of the ice-stream coming from the Odder district. Another difference and a more important one is found in the district directly north of the Aarhus Valley. The water-shed which has come from the south and has passed the valley together with the moraine barrier so often mentioned, bends here abruptly westwards and leaves for some time the ice-edge formations. It extends in a wide curve round the whole of the district where formerly the large ice-barred lake lay in the strath of the Lygumgaard Aa, and not before the neighbourhood of Mundelstrup does it arrive again at the ice-edge line. This form of the water-shed corresponds with the fact, that the territory of the ice-barred lake is no longer drained into the Gudenaa Valley but into the eastern end of the Aarhus Valley and through this directly into the Kattegat. This change however has first taken place during the post-glacial period, since that part of the valley of the Lygumgaard Aa, which as a narrow cleft connects the two large valleys, must be considered as the result of quite recent erosion.

With regard to the post-glacial erosion in this part of Jutland, it may be said that, except in the case above-mentioned, it has not been of any special importance. In the whole district east of the ice-edge line investigated we find small dales and clefts formed by the numerous smaller streams which find their way directly out to the Kattegat. Nor have any significant alterations taken place in the country more to the west during the post-glacial period; as has been mentioned before, the larger of the present streams follow the old glacier-river valleys.

IV. The inland-ice in the Grenaa Peninsula.

(IV. Indlandsisen i Grenaa Halvøen.)

A. General remarks.

(A. Almindelige Bemærkninger.)

The outline of the Grenaa Peninsula of itself indicates, that the country presents very variable conditions within this small district. Corresponding with the regular line of the coast to the north and the east an extensive, rather flat plateau occurs in the northern part of the peninsula, whilst the very deep indentations of the south coast and its whole irregular form give a good idea of the very hilly and high country to the south. These two essentially different parts are separated in the centre of the peninsula by lower-lying flat areas.

The plateau in the northern part of the Peninsula is about half of the whole area. To the west and the south-west it borders on the large valley in which lie Gl. Estrup and Skafø Gaard and on the low sand-plains, by which the valley is continued in the country south of Ryom Gaard. Further eastwards the deep dale Kolindsund is the boundary of the plateau to the

south and separates it from a part similar but smaller and lower found in the country south-west of Grenaa. Southwards the latter comes in contact with a flat and gravelly district, which is the direct continuation of the sand-plain south of Ryom Gaard.

The plateau-like but not very high areas mentioned are, as stated, separated from the ridges of the southern country by a lower-lying belt, which extends through the whole peninsula with main direction north-west to south-east. It consists essentially of flat deposits of sand and gravel and of extensive post-glacial plains, and it is distinctly different from the rest of the district by its well-marked character of a glacier-river formation. This belt consists of the large valley mentioned past Gl. Estrup and Skafö Gaard, the sand-plains south of Ryom Gaard and of the continuation of the latter south-east and eastwards to the north of Stubbe Lake.

The southern highland consists of huge ridges, which surround the creeks in large curves. From the part of the East Jutland highland west of Kalvö Vig an extensive, curved ridge is thus seen to extend to the north of the Vig, and from the eastern end of this ridge another somewhat lower begins, which forms a curve convex eastwards round about Egens Vig and connects the highland first-mentioned with the huge mass of hills, Agri Hills, in the centre of Mols, in comparison with which the peninsula extending to the west together with Helgenæs to the south are but small.

Æbeltoft Vig is also surrounded by a curved ridge. It consists of one chain of elongated hillocks behind the other, and a part of still another curve which extends north-eastwards from the country north of Æbeltoft has quite the same character.

The ice-edge line described in the preceding approaches more and more to the coast northwards and bends out towards the Grenaa Peninsula. The fact is, that the ice-edge has really continued eastwards through the southern part of this peninsula, and it is this condition which has caused the formation of the above-described characteristic and magnificent country round Kalvö Vig and Æbeltoft Vig. The curved ridges mentioned can only be considered as huge formations of the ice-edge formed at the margin of two large ice-tongues which entered through these Vige. The most easterly hillocks in the country north-east and east of Æbeltoft must be considered as a part of a third moraine-curve. Lastly, it may be mentioned that several peculiar features within the region of the glacier-river formations prove, that the ice-edge, at least during an interval, has also here followed the east coast of the peninsula for some way northwards.

B. Moraine formations.

(B. Morænedannelser.)

The ice-edge formations which conform to the ice-tongue of Kalvö Vig, can be followed in a wide curve. The huge ridge itself, which extends to the north of the Vig, must rather be considered as a high and hilly moraine-landscape, formed under the marginal part of the ice-sheet or perhaps partially arising from the material which spread out and covered the surface of the ice in the marginal zone. But along the outer border of the moraine-landscape extends a system of characteristic marginal moraine

ridges, which distinctly indicate the boundary of the extension of the ice-tongue. On a closer examination of the moraine curve round Kalvö Vig we see that it can be divided into three smaller, i. e. the Vosnæs Gaard-Kalvö Curve, the Egens Curve and the Agri Curve. As there is a fairly even transition however between the three curves, so far as the moraine-landscape is

Fig. 4. Sketch-map showing ice-edge lines in the Grenaa Peninsula. 1 : 500000.

concerned, it forms an almost continuous whole. The soil here consists predominantly of till deposited in irregular hillocks. The appearance is shown on fig. 1 of Plate XV. The marginal moraines outside are on the contrary distinctly gravelly. The marginal moraines which belong to the Vosnæs Gaard-Kalvö Curve begin at Hestehave north of Løgten Station, and from here extend as a belt of long gravel hillocks to Faarup. Two of the photographs reproduced here show the appearance of these marginal moraines. On Plate XV, fig. 2 the long ridges E.S.E. of Hornslet are viewed from a little

outwash-plain, which here lies in front of the moraine; fig. 1 on Plate XVI shows the appearance of some of the large marginal moraine ridges west of Faarup, and the high moraine-landscape south of Ommestrup is seen in the background. From Faarup the marginal moraines are seen to extend further eastwards as more scattered hillocks over Ørnerede Bakke and Asbøl Hoved to Rostved. At this place they abruptly turn and the Egens Curve begins — still however only with scattered small marginal moraine hillocks on the first stretch to Felballe. From here they extend southwards and form a splendid marginal moraine landscape, which becomes narrower again farther to the south to form a single row of hillocks which turns back to the west and abuts upon the Agri highland. Finally, this great knot of hills is crowned by a small marginal moraine curve, the Agri Curve, the direction of which is from north to south. The ridges here are the highest marginal moraines in the whole of this district and the outer side of the curve is specially noticeable in the country, as is shown by fig. 1—2 on Plate XVII.

The conditions along the margin of the ice-tongue of Æbeltoft Vig are somewhat different; the whole of the relatively broad hilly region, which surrounds the Vig, must be considered as one row of marginal moraines behind the other formed during the gradual but slow retreat of the ice. It is characteristic, that the outermost rows of hills are considerably shorter than the innermost, for the reason that the ice-tongue of Æbeltoft Vig at an early period advanced far forward so as to touch the middle part of the Egens Curve and later gradually retired so much, that the small Agri Curve was formed as a connection between the two larger moraine curves. In this way arose the marginal moraine landscape, which now surrounds the whole Vig and which especially is very fine on the eastern side of the Mols Peninsula, where huge gravel hillocks covered with heather alternate with deep holes without outlet. Fig. 2 on Plate XVI gives an idea of the character of this landscape.

In the Æbeltoft Peninsula and the nearest district to the north of the latter, the ridges of the curve round Æbeltoft Vig meet with the marginal moraines formed at the edge of the Kattegat Ice itself. The character of these moraines is quite like that of the preceding; the single ridges are however more scattered and their reciprocal distance larger, a condition which indicates a much faster melting of the ice here to the east. The outermost ridge, which must be contemporary with the outermost moraines in the curve round Æbeltoft Vig and in the Egens Curve, extends from the country south of Stubbe Lake over Gratbjerg out towards Rugaard. Plate XVIII fig. 1 shows the steep but somewhat irregular inner-side of Gratbjerg, whilst fig. 2 on the same Plate has been taken nearly from the top of this hillock to show the more evenly sloping and more regular outer-side of the ridge, conditions which have been caused by the brooks flowing down over the ice-edge and depositing a little sand here, which has spread up the slope and so to speak veiled it.

Corresponding with the fact that the ice-sheet in the east has retired faster — a condition seen from this, that the belt over which the marginal moraines spread becomes broader and broader the farther we go eastwards — a ice-edge line is also found in this district which is still more advanced than that indicated by the outermost marginal moraine ridges. It forms the southern boundary of a small oblong outwash-plain, the Tistrup outwash-plain, the direction of which is east—west, and it runs in flat curves corresponding to the moraine curves above-mentioned. As the country behind the

ice-edge line is for long distances lower than the glacier-river deposits outside, this indicates, that the ice must have covered the low region when the glacier-rivers deposited the outwash-plain. Plate XIX, fig. 1, shows the steep slope of the glacier-river deposit down towards the lower land at a place N.N.E. of Tostrup where it is very finely marked as a high, almost even declivity. Lastly, several peculiar conditions among the easternmost glacier-river formations (see below) show, that this outermost ice-edge must have turned northwards here and, at any rate in the beginning, have extended a little inside the east coast of the peninsula northwards to Gjerrild Bay.

C. Glacier-river formations.

(C. Smeltevandsdannelser.)

It has already been shown, that a relatively low and flat belt of glacier-river formations extends right across the Grenaa Peninsula. This the principal glacier-river deposit of the Grenaa Peninsula has probably been formed by a large glacier-river, which came from the eastern parts of the peninsula and sought its way to the west and the north-west out towards the sea at the mouth of Randers Fjord. This is seen not only from the fact, that the surface of the deposit rises constantly towards the east, but also from the distinct increase in the size of the grains when we follow the deposit upwards in the same direction, until in the neighbourhood of Hoed we find unusually coarse, water-worn gravel, of the nature and thickness of which Plate XIX, fig. 2 and Plate XX, fig. 1 give some idea.

The conditions of the levels within this gravel-region show, that the deposit is divided into two different parts, as special conditions in the Hoed district have caused the glacier-river, first to flow to the south of the plateau-like part south-west of Grenaa and later to carve out a valley right through this in order to find a lower route westwards. The distribution of these two deposits in the Hoed district has been shown on the map on Plate IV, where the earliest and highest gravel — »the first terrace« — has been indicated by a reddish yellow colour whilst the colour of the later and lower — »the second terrace« — is indicated by light yellow. It is seen, that the gravel deposits of the second terrace are not only found down through the recent Hoed-Hallendrup Valley, but that they also extend into smaller valleys in the first terrace, and appear here as scattered tongue-shaped terrace-remnants, as in the Rosmos Valley (Plate XX, fig. 2), or cover the whole bottom of the valley as in the little valley now without water-course represented in fig. 1 of Plate XXI.

The fact, that a large glacier-river, which left the ice in the Hoed district, has flowed westwards through the whole Grenaa Peninsula indicates in itself, that the nearest part of the Kattegat must have been blocked by the inland-ice at that period; and we must conclude in fact, that the ice-edge from the district south-west of Hoed has bent northwards and for some time at least continued over the present land as far to the north as to Gjerrild Bay. This last condition is shown not merely in that the route through Kolindsund must also have been blocked by the ice, when the large glacier-river above-mentioned flowed north-westwards, but also in the fact that there is another glacier-river formation, which is joined on to this eastern ice-edge. We find, namely, a distinct glacier-river deposit, which extends from Kirial W.N.W.

of Grenaa up towards Gjerild Bay, in the valley now drained by the Skærvad Aa and Veggerslev Aa. The gravel in the uppermost end of the glacier-river deposit is also here rather coarse, as is seen from fig. 2 of Plate XXI.

Whilst the course of the glacier-river last-mentioned thus shows, that the part of the Kattegat north of the Grenaa Peninsula has had no inland-ice barrier, the ice farther to the south has forced the large glacier-river mentioned to flow over the land. Passing the Grenaa Peninsula this river has deposited gravel and sand and at some places given rise to characteristic terrace formations. The water first flowed along the above-indicated, outermost ice-edge line north of Æbeltoft Vig, and here it deposited the small outwash-plain mentioned. Further on it passed over the terrace-landscape now partly destroyed south of Ryom Gaard and arrived at the large Skafø Gaard-Gl. Estrup Valley, and through the latter out to the sea.

Later the glacier-river coming from the Hoed district forced, as mentioned above, a new route, the Hoed-Hallendrup Valley, right through the high country south-west of Grenaa to the western end of Kolindsund. From here however the river still flowed for some time westwards past Ryom Gaard to the Skafø Gaard-Gl. Estrup Valley and further through the latter; but after the lapse of some time the barrier at Kolindsund must have been removed and then the water could flow out by this route. The most important stages of this development are indicated in the map-sketches on Plate V.

As the river-bed became gradually lower, quite a system of small valleys were formed in the originally continuous sand-plain south of Ryom Gaard, and the local water from the ice-edge to the south contributed in no small degree to destroy the deposit of a slightly earlier period, so that only larger and smaller scattered terrace-fragments are now to be found in this district.

Finally, it may be mentioned, that in the western part of the Grenaa Peninsula a rather considerable lake existed in the depression at Rosenholm during the period here considered. This lake received tributaries from the ice-edge to the south, and the water flowed from it to the valley of the present Alling Aa and through this to the Skafø Gaard-Gl. Estrup Valley.

D. The development of the present water-courses in the Grenaa Peninsula.

(D. Udviklingen af Grenaa Halvøens nuværende Vandløb.)

In contrast to the districts described in the preceding chapters, a country is found in the southern part of the Grenaa Peninsula, where the moraine formations of the ice-edge are of very great importance in landscape regards, and it cannot be denied that the large ridges which now surround the Vige, must also be of principal importance for the system of water-courses, since they prevent the drainage of the central parts of the peninsula from flowing to its south coast and thus force the larger rivers northwards or eastwards.

A closer study of the present water-courses shows, that it is not only the chains of ridges to the south which are important with regard to the drainage, but also, that the distribution of the streams even in details is exactly conditioned by the development of the glacier-river formations described above, as the water also during the post-glacial period has almost

everywhere continued to follow the same routes as at the conclusion of the period of development dealt with here, when the ice-edge still remained along the south coast of the Grenaa Peninsula. The not very common condition, that both the Skafö Gaard-Gl. Estrup Valley and the Tistrup outwash-plain are crossed by water-sheds, can thus be explained on the account given above.

The fact, that the lowest-lying areas have for some time been sunk below the level of the sea has naturally caused no change in the distribution of the streams. On the other hand, the post-glacial erosion has at a few points somewhat changed the conditions of drainage. This is for example the case in the Hoed district, where a water-course has carved its way from the coast into the old glacier-river formations and has taken over the drainage not only of several small valleys in the Hoed district but also by and by of more and more of the Hoed-Hallendrup Valley, so that this valley is now also crossed by a water-shed. The course of things has been quite similar in the southern end of the glacier-river valley at Kirial, where a water-course from Kolindsund has cut a passage up to the valley and now leads the water from a part of it southwards, whilst the drainage from its northern end still goes to the north.

V. Conclusion.

(V. Slutning.)

In the preceding chapters descriptions have been given of the surface formations, which are connected in their origin with the ice-edge mentioned, and the question now arises, in what relation do these formations stand to the other glacial phenomena known in Denmark. Although this question does not as a matter of fact directly touch on the present theme, it seems to be of so much interest that a short study of the matter may not be out of place here.

The ice-sheet, at the margin of which the surface-formations investigated were formed, must have been the last ice to arrive at these parts of Jutland. Further, it can be considered as certain, that the formations of the ice-edge described are older than similar formations on Funen and Sealand, and later than the ice-edge line investigated by USSING, which is found farther westwards in Jutland along the margin of the Karup outwash-plain, and also than the stages of retreat of a little later period, indicated by the same author, which correspond with the flow of glacier-rivers through the Falborg and the Skalsaa Valleys. The relation to the ice-edge formations in Vendsyssel described by JESSEN, on the other hand, does not directly appear from its situation, but the very rapid retreat of the easternmost part of the ice-edge investigated here clearly indicates, that the Kattegat has already at that period had salt water and consequently had an open connection with the sea. As this could only be the case after Vendsyssel had become ice-free, the moraines in the southern part of the Grenaa Peninsula must be considered as later than the ridges of Vendsyssel.

It seems to me, that the question, whether the ice-edge line investigated

can be considered as a stagnation-line during the retreat of the more westerly ice-edge along the Karup outwash-plain, must be answered in the negative. The whole course and direction of the two lines are so different, that a direct retreat from one position to the other seems impossible. On the other hand, there are conditions which clearly indicate, that a long interval has not existed between the period, when the whole East Jutland was covered by the inland-ice, and the period dealt with here. I may refer here to the considerable dead ice-masses, which still existed at several places, when the glacier-rivers coming from the ice-edge deposited their sand and gravel masses, and which later on melting have caused the formation of a number of larger and smaller depressions within the region of the glacier-river formations. It may however be stated, that such conditions have only been found at places, where deep valleys could favour the occurrence of such isolated masses of ice during its melting, and later could also protect it somewhat against rapid melting.

It is probable, that when the ice advanced again to the districts dealt with here, it has been supplied by a glacier through the Baltic. The whole course of the ice-edge line discovered is not alone evidence of this, but we have also the condition that everywhere in the moraine deposits of the ice-edge boulders of Baltic rocks have been found, which are as a rule present in even large numbers.

The thickness of the ice, when it advanced again has probably been but relatively small. This seems to be indicated by the distinct dependence of the ice-edge line on the original form of the country, a condition which is shown in its advance at lower places and retreat where it has met with high land. Further, the slight deposition of moraine material at places where the marginal part of the ice-sheet has advanced over highly situated land indicates the same.

We might perhaps be tempted to regard the ordinarily not very prominent ice-edge formations and the generally inconsiderable influence of the ice on the levels as evidence that the ice-edge has only persisted in this country during a relatively short period. This conclusion is however not correct. The fact alone, that in the country investigated by far the largest and most considerable marginal moraines have been found in the southern part of the Grenaa Peninsula, where the ice-edge has occupied different positions in the course of the period considered here, proves distinctly, that no connection exists between the size of the moraine deposits and the length of their period of formation. A study of the glacier-river formations also indicates the contrary. Even if the period, during which the ice-edge existed in East Jutland, is not to be compared with the time of the formation of the Karup outwash-plain, yet the different glacier-river formations indicate, that their period of development was not very short. The conditions of the levels in the lower terrace of the Gudena Valley show, that a valley bottom is found here which, on account of its slightly concave and almost horizontal longitudinal profile, must be considered as the result of far-advanced erosion; further, the many developmental stages displayed by the different glacier-river formations in the Grenaa Peninsula also indicate a relatively long period of formation.

The relative duration of different parts of the Glacial Period can however never be definitely settled, and another and a better method of evaluating the relative importance of the positions of the ice-edge might well be de-

sired. There is no other mode of proceeding than to investigate how great has been the influence on the present conditions of the earlier presence of the ice-edge at the different places. As the ice-edge has a distinct tendency to form water-sheds, the distribution of the water-courses is specially significant in this respect. Just as a well-marked water-shed between streams flowing to the Kattegat and to the North Sea corresponds with the Central Jutland outwash-plain border, the ice-edge line described here also has its water-shed, though less important, which together with the first mentioned marks the boundaries of an extensive north to south area lying somewhat inside the Kattegat coast. It is not only the large features of the distribution of the streams but also a number of details, which show that the phenomena of the ice-edge described here have had a very great influence on the development of the present streams in this country. How great the importance of the ice-edge has been is perhaps seen most distinctly, when we consider how the drainage conditions of the district mentioned between the two water-sheds would have developed, if the ice had not barred the way to the east by depositing moraine-material in the valleys running eastwards, and if the erosion caused by the glacier-rivers had not favoured the drainage to the north, as now takes place through the Gudena. Fig. 3 on Plate I is an endeavour to illustrate this. Streams are here indicated as flowing directly to the Kattegat through all the valleys now blocked by the moraine deposits of the marginal zone of the ice-sheet; and if we compare it with fig. 1 on the same Plate, which gives the conditions as they are now, the comparison shows better than words how great has been the importance of the ice-edge, along the marginal line discovered, for the development of the present systems of water-courses. Through such considerations the result is obtained that the line discovered must be one of the most considerable ice-edge lines in our country.

Explanation of the Plates.

- Plate I. Level-map of the central parts of East Jutland.
fig. 1. The water-shed between streams flowing to the northern and the southern part of the Kattegat together with the present water-courses.
fig. 2. An ice-edge line and the connected glacier-rivers.
fig. 3. The natural drainage of the country.
- Plate II. fig. 1. Surface-map of the district between the Lilleaa Valley and Kalvø Vig.
fig. 2. Løsning outwash-plain.
- Plate III. Longitudinal profile of the late-glacial Gudenaa and its affluents.
- Plate IV. Map showing the glacier-river deposits in the Hoed district.
- Plate V. The development of the glacier-river deposits in the Grenaa Peninsula during the retreat of the easternmost part of the ice-edge.
- Plate VI. fig. 1. The Torpshøje marginal moraine seen from the Løsning outwash-plain.
fig. 2. Moraine-gravel. Gravel-pit at Sebberup.
- Plate VII. fig. 1. Moraine-gravel. Gravel-pit in Trindbjerg.
fig. 2. Marginal moraine at Hvirring Church seen from the inner-side.
- Plate VIII. fig. 1. Marginal moraine hillock 900 meters W.N.W. of Tamdrup Mill.
fig. 2. Detail of the surface of the same hillock.
- Plate IX. fig. 1. Mound-shaped marginal moraine $1\frac{1}{2}$ km. north-west of Tamdrup Mill.
fig. 2. Moraine-landscape. View from Møgelbjerg north-eastwards.
- Plate X. fig. 1. The Engom Valley north of Engom seen from its western side.
fig. 2. Glacier-river valley south-west of Nim seen from its southern side.
- Plate XI. fig. 1. Portion of the very stony marginal zone of the ice-sheet south-east of Fruering.
fig. 2. The western end of the valley through Bjørnebjerg, looking east-south-east.
- Plate XII. fig. 1. Stony surface. The Aarhus Valley north-west of Tostrup Lake.
fig. 2. Moraine-gravel. Gravel-pit at Lillering.

- Plate XIII. fig. 1. Marginal moraine mound at Vestermølle.
fig. 2. Stony surface. The marginal zone of the ice-sheet S.S.W. of Petersminde.
- Plate XIV. fig. 1. Terrace-level. The Lilleaa Valley between Hinderup and Hadsten.
fig. 2. Sand from glacier-rivers. The terrace of the Lilleaa Valley south of Hadsten Station.
- Plate XV. fig. 1. Moraine-landscape east of Kalvø.
fig. 2. Marginal moraines E.S.E. of Hornslet, viewed from a small outwash-plain outside.
- Plate XVI. fig. 1. Marginal moraine hillocks west of Faarup.
fig. 2. Marginal moraine landscape. Mols hills east of Agri.
- Plate XVII. fig. 1. Marginal moraine hillocks. The central part of the Agri curve from the outer-side.
fig. 2. Marginal moraine hillocks. The southernmost part of the Agri curve from the outer-side.
- Plate XVIII. fig. 1. Gratbjerg from the inner-side.
fig. 2. The outer-side of Gratbjerg marginal moraine, from Gratbjerg towards W.S.W.
- Plate XIX. fig. 1. The steep slope of the Tistrup outwash-plain towards the south-west in the country N.N.E. of Tostrup.
fig. 2. Gravel from glacier-rivers. The easternmost lime-pit at Glatved Strand.
- Plate XX. fig. 1. Gravel from glacier-rivers. Part of the easternmost lime-pit at Glatved Strand.
fig. 2. Terrace-tongue in the Rosmos Valley immediately north-east of Rosmos.
- Plate XXI. fig. 1. Glacier-river valley south-west of Hoed.
fig. 2. Gravel from glacier-rivers. Lime-pit at Kirial.
-

Nr. 2.	K. RØRDAM. Saltvandsalluviet i det nordostlige Sjælland. 1892	Pris 3,00 Kr.
- 3.	K. RØRDAM. Geologisk-agronomiske Undersøgelser ved Lyngby Landboskole og Brede Ladegaard. 1894.....	— 1,00 -
- 4.	HENR. J. POSSELT. Brachiopoderne i den danske Kridtformation. 1894.....	— 1,25 -
- 5.	K. RØRDAM. Beretning om en geologisk Undersøgelse paa Frænnemark ved Svaneke paa Bornholm. 1895	— 0,75 -
- 6.	K. RØRDAM. Kridtformationen i Sjælland i Terrænet mellem København og Kjøge, og paa Saltholm. 1897	— 1,50 -
- 7.	K. RØRDAM og C. BARTHOLIN. Om Forekomsten af Juraforsteninger i løse Blokke i Moræneler ved København. 1897	— 0,75 -
- 8.	ETHEL G. SKEAT and VICTOR MADSEN. On Jurassic, Neocomian and Gault boulders found in Denmark. 1898	— 4,00 -
- 9.	N. HARTZ og E. ØSTRUP. Danske Diatoméjords Aflejringer og deres Diatoméer. 1899....	— 1,25 -
- 10.	Bidrag til Bornholms Geologi I. — K. A. GRÖNWALL: Bemærkninger om Bornholms sedimentære Dannelser og deres tektoniske Forhold. J. P. J. RAVN: Trilobitfaunaen i den bornholmske Trinucleusskifer. A. HJORTH: Om Vellengsbyleret og dets Flora. N. V. USSING: Sandstengange i Granit paa Bornholm. 1899	— 1,75 -
- 11.	N. HARTZ. Bidrag til Danmarks senglaciale Flora og Fauna. 1902	— 2,00 -
- 12.	N. V. USSING. Mineralproduktionen i Danmark ved Aaret 1900. 1902	— 2,00 -
- 13.	KARL A. GRÖNWALL. Bornholms Paradoxideslag og deres Fauna. 1902	— 6,00 -
- 14.	VICTOR MADSEN. Om den glaciale, isdæmmede Sø ved Stenstrup paa Fyn samt om Dannelsen af Teglværksleret i Stenstrup-Eggen. 1903	— 2,00 -
- 15.	KARL A. GRÖNWALL. Forsteningsførende Blokke fra Langeland, Sydfyn og Ærø samt Bemærkninger om de ældre Tertiærdannelser i det baltiske Omraade. 1904.....	— 1,75 -

- Nr. 16. N. STEENBERG og POUL HARDER. Undersøgelser over nogle danske Sandsorters tekniske Anvendelighed. 1905 Pris 0,35 Kr.
- 18. KARL A. GRÖNWALL og POUL HARDER. Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. 1907 — 2,50 -
- 19. POUL HARDER. En østjydsk Israndslinje og dens Indflydelse paa Vandløbene. 1908 — 6,00 -

III. Række.

Populære Fremstillinger.

- Nr. 1. Oversigt over de af Danmarks geologiske Undersøgelse indtil Foraaret 1895 udførte Arbejder. 1896. (Udsolgt) — 1,00 -
- 2. N. V. USSING. Danmarks Geologi i almenfatte- ligt Omrids. Anden Udgave 1904 — 4,50 -
- 3. V. MILTHERS. Foreløbig Beretning om en geo- logisk Rejse i det nordøstlige Tyskland og russisk Polen, foretaget i Forsommeren 1901. 1902 — 0,25 -
- 4. V. MILTHERS. Grundvand og vandførende Lag i Danmark, særlig med Henblik paa For- syningen af Brønde. 1903 — 1,50 -
- 5. V. NORDMANN. Danmarks Pattedyr i Fortiden. 1905 — 2,00 -
- 6. Oversigt over de af Danmarks geologiske Under- søgelse i Aarene 1895—1904 udførte Ar- bejder, udgivet af Kommissionen for Dan- marks geologiske Undersøgelse paa Grund- lag af Indberetninger fra Geologerne. 1905 — 1,00 -